



SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 82

Rozeslána dne 15. června 2005

Cena Kč 121,50

O B S A H:

225. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

225

VYHLÁŠKA

ze dne 1. června 2005,

kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 589/2004 Sb.

Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely

| Číslo řádku vyhlášky | Označení ATC a V06XX | Název léčivé látky | Cesta podání | Množství | Název jedn. | Úhrada v Kč | Omezení |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Stomatologika |
|---|----------------------|

1.1 A01AA01 fluorid sodný p.o. 1.10 MG 0.88

46265 ZYMAFLUOR 1/4 MG portblnob200x0.25mg

64958 ZYMAFLUOR 1/4 MG portblnob200x0.25mg NCH CH

1.2 A01AB10 natamycin lok. 20.00 MG 7.48

1.3 A01AB03 chlorhexidin lok. 1 000.00 ML 178.70 H

1.4 A01AC01 triamcinolon lok. 1.00 GM 13.69 L/DER,STO, ORL

1.5 A01AC02 dexametason lok. 1.00 GM 11.68 L/DER,STO, ORL

2 adsorbční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 2.1 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3.40 | |
| 2.2 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3.40 | |
| 2.3 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3.40 | |
| 2.4 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3.40 | |
| 2.5 | A02AD04 | hydrotalcit (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3.40 | |
| 2.6 | A02AD04 | hydrotalcit (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3.40 | |
| 2.7 | A02BA01 | cimetidin | p.o. | 0.80 | GM | 3.40 | |
| 2.8 | A02BA02 | ranitidin nad 75 mg v 1tbl | p.o. | 0.30 | GM | 3.40 | |

12346 HISTAC 150

tbl obd 20x150mg

RXY IND

| | | | | | | | |
|-------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------|----|-------|--|
| 2.9 | A02BA03 | famotidin 20 mg a výše v 1 tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 3.40 | |
| 47863 | FAMOSAN 40 MG | | por tbl frm100x40mg | PMP | CZ | | |
| 59596 | FAMOSAN 40 MG | | por tbl frm 50x40mg | PMP | CZ | | |
| 2.10 | A02BA04 | nizatidin | p.o. | 0.30 | GM | 3.40 | |
| 2.11 | A02BA06 | roxatidin | p.o. | 0.15 | GM | 3.40 | |
| 2.12 | A02BA07 | ranitidin bismut citrát | p.o. | 0.80 | GM | 28.50 | |

3 protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 3.1 | A02BA01 | cimetidin | parent. | 0.80 | GM | 32.06 | H |
| 3.2 | A02BA02 | ranitidin | parent. | 0.30 | GM | 68.43 | H |
| 3.3 | A02BA03 | famotidin | parent. | 40.00 | MG | 68.43 | H |
| 3.4 | A02BB01 | misoprostol | p.o. | 0.80 | MG | 47.36 | Z |
| 3.5 | A02BC01 | omeprazol | parent. | 20.00 | MG | 170.00 | H |
| 3.6 | A02BC01 | omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 15.50 | |

32174 OMERA 10

por cps etd 14x10mg

SLO SK

32175 OMERA 10

por cps etd 28x10mg

SLO SK

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 3.7 | A02BC01 | omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce) | p.o. | 20.00 | MG | 9.28 | |
|-----|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|------------|---------------------|-----|-----|
| 98330 | OMEPROL 20 | por tbl ent 7x20mg | SFS | D |
| 98331 | OMEPROL 20 | por tbl ent 14x20mg | SFS | D |
| 98332 | OMEPROL 20 | por tbl ent 28x20mg | SFS | D |
| 03076 | LOMAC | cps 28x20mg | CIA | IND |
| 03077 | LOMAC | cps 56x20mg | CIA | IND |

| | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|-----|
| 10245 | OMEPRAZOL AL 20 | por cps etd 30x20mg | APA | D |
| 12507 | GASEC-20 | por cps dur 14x20mg | MHA | P |
| 15555 | APO-OME 20 | por cps etd 14x20mg | CMG | IRL |
| 15556 | APO-OME 20 | por cps etd 28x20mg | CMG | IRL |
| 15558 | APO-OME 20 | por cps etd100x20mg | CMG | IRL |
| 16003 | LOMAC | por cps dur 14x20mg | SDD | CZ |
| 16004 | LOMAC | por cps dur 28x20mg | SDD | CZ |
| 16005 | LOMAC | por cps dur 56x20mg | SDD | CZ |
| 17946 | APO-OME 20 | por cps etd 14x20mg | KAT | NL |
| 17947 | APO-OME 20 | por cps etd 28x20mg | KAT | NL |
| 17949 | APO-OME 20 | por cps etd100x20mg | KAT | NL |
| 31511 | OMEPIREX 20 MG | por cps etd 28x20mg | LOT | E |
| 31512 | OMEPIREX 20 MG | por cps etd 56x20mg | LOT | E |
| 44060 | APO-OME 20 | por cps etd 14x20mg | APT | CND |
| 44061 | APO-OME 20 | por cps etd 28x20mg | APT | CND |
| 44063 | APO-OME 20 | por cps etd100x20mg | APT | CND |
| 47473 | GASEC-20 | por cps dur 56x20mg | MHA | P |
| 49747 | APO-OME 20 | por cps etd 14x20mg | TOP | CND |
| 49748 | APO-OME 20 | por cps etd 28x20mg | TOP | CND |
| 49750 | APO-OME 20 | por cps etd100x20mg | TOP | CND |
| 53346 | GASEC-20 | por cps dur 28x20mg | MHA | P |
| 56500 | HELICID 20 | cps 14x20mg | ZEH | CZ |
| 58202 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 30x20mg | SFS | D |
| 58203 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 60x20mg | SFS | D |
| 58225 | OMEPRAZOL-E | cps ent 14x20mg | EGI | H |
| 58226 | OMEPRAZOL-E | cps ent 28x20mg | EGI | H |
| 59897 | HELICID 20 | cps 28x20mg | ZEH | CZ |
| 60160 | ULTOP | cps 14x20mg | KRK | SLO |
| 70933 | ORTANOL | por cps dur 28x20mg | LEK | SLO |
| 75166 | ORTANOL | por cps dur 14x20mg | LEK | SLO |
| 75974 | LOMAC | cps 14x20mg | CIA | IND |
| 94361 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 30x20mg | IIS | TR |
| 94362 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 60x20mg | IIS | TR |
| 94476 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 14x20mg | SFS | D |
| 94477 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 14x20mg | IIS | TR |
| 94478 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 28x20mg | IIS | TR |
| 94479 | OMEPROL 20 MG | por cps etd 28x20mg | SFS | D |
| 98625 | OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG | por cps etd 15x20mg | MCK | D |
| 98626 | OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG | por cps etd 30x20mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|----|--------|---------------|
| 3.8 | A02BC02 | pantoprazol | p.o. | 40.00 | MG | 9.50 | |
| 3.9 | A02BC02 | pantoprazol | parent. | 40.00 | MG | 170.00 | H |
| 3.10 | A02BC03 | lansoprazol | p.o. | 30.00 | MG | 9.28 | |
| 3.11 | A02BC05 | esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | L/GIT,INT,GER |
| 3.12 | A02BC05 | esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce) | p.o. | 20.00 | MG | 6.67 | L/GIT,INT,GER |
| 3.13 | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat) | p.o. | 3.00 | DF | 22.29 | |
| 3.14 | A02BX02 | sukralfát | p.o. | 4.00 | GM | 9.28 | |

91217 VENTER

tbl 50x1gm

KRK SLO

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 3.15 | A02BX03 | pirenzepin | p.o. | 0.10 | GM | 8.55 | |
| 3.16 | A02BX03 | pirenzepin | parent. | 20.00 | MG | 105.58 | H |
| 3.17 | A02BX05 | zásaditý citronan bismutitý | p.o. | 0.48 | GM | 23.07 | |

4 spasmolytika, perorální podání

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|------|-------|----|-------|--|
| 4.1 | A03AA04 | mebeverin | p.o. | 0.30 | GM | 4.94 | |
| 4.2 | A03AA05 | trimebutin | p.o. | 0.30 | GM | 4.94 | |
| 4.3 | A03AB03 | oxyfenon | p.o. | 25.00 | MG | 2.30 | |
| 4.4 | A03AB06 | otilonium bromid | p.o. | 0.12 | GM | 12.42 | |
| 4.5 | A03AB11 | poldin | p.o. | 12.00 | MG | 2.30 | |
| 4.6 | A03AD01 | papaverin | p.o. | 0.10 | GM | 0.68 | |
| 4.7 | A03AD02 | drotaverin | p.o. | 0.10 | GM | 4.88 | |
| 4.8 | A03BA01 | atropin | p.o. | 1.50 | MG | 0.49 | |
| 4.9 | A03BB01 | butylskopolamin | p.o. | 60.00 | MG | 14.21 | |

01317 BUSCOPAN

por tbl obd 20x10mg

BOE D

5 spasmolytika, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|---------|------|----|-------|--|
| 5.1 | A03AD01 | papaverin | parent. | 0.10 | GM | 17.94 | |
| 5.2 | A03AD02 | drotaverin | parent. | 0.10 | GM | 25.55 | |

02552 NO-SPA

inj 5x2ml/40mg

CHN H

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|-------|----|-------|--|
| 5.3 | A03BA01 | atropin (1 mg a více v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 7.83 | |
| 5.4 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 15.15 | |
| 5.5 | A03BB01 | butylskopolamin | p.rect. | 60.00 | MG | 14.66 | |
| 5.6 | A03BB01 | butylskopolamin | parent. | 60.00 | MG | 37.62 | |

6 anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 6.1 | A03DA | syntetická anticholinergika v komb. | p.o. | 2.00 | DF | 3.96 | |
| 6.2 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | p.rect. | 2.00 | DF | 13.60 | |

91517 ALGIFEN SUP

rct sup 5

LEX CZ

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|------|----|-------|--|
| 6.3 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent. | 2.00 | DF | 44.25 | |
| 6.4 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | DF | 4.11 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|------|------|----|------|--|--|
| 6.5 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 5.82 | | |
|-----|---------|--|------|------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|------|----|-------|--|--|
| 6.6 | A03EA | antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. | p.rect. | 2.00 | DF | 12.72 | | |
|-----|-------|---|---------|------|----|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | prokinetika, antiflatulencia, perorální podání | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|--|
| 7.1 | A03AE02 | tegaserod | p.o. | 12.00 | MG | 30.00 | | |
|-----|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|--|
| 7.2 | A03AX13 | silikony (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 10.91 | | |
|-----|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|--|
| 7.3 | A03AX13 | silikony (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 18.57 | | |
|-----|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|--|

93500 SAB SIMPLEX sus 1x30ml PDA D

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|--|
| 7.4 | A03AX58 | alverin (kombinace se silikony) | p.o. | 0.18 | GM | 7.90 | | |
|-----|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------|------|----|-------|---------------|--|
| 7.5 | A03FA | itoprid | p.o. | 0.15 | GM | 26.60 | L/GIT,INT,PED | |
|-----|-------|---------|------|------|----|-------|---------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------|------|-------|----|------|--|--|
| 7.6 | A03FA01 | metoclopramid hydrochlorid | p.o. | 30.00 | MG | 3.96 | | |
|-----|---------|----------------------------|------|-------|----|------|--|--|

56696 MCP HEXAL 10 tbl 100x10mg SFS D

96974 CERUCAL por tbl nob 50x10mg AWD D

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|------|-------|----|-------|-------------------------|--|
| 7.7 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 22.50 | L/GIT,INT,PED, PSY, GER | |
|-----|---------|--|------|-------|----|-------|-------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|-------|-------------------------|--|
| 7.8 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg dop. 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 26.00 | L/GIT,INT,PED, PSY, GER | |
|-----|---------|---|------|-------|----|-------|-------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|-------|-------------------------|--|
| 7.9 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy dělené sáčky) | p.o. | 30.00 | MG | 26.00 | L/GIT,INT,PED, PSY, GER | |
|-----|---------|---|------|-------|----|-------|-------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|-------------------------|--|
| 7.10 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml | p.o. | 30.00 | MG | 57.18 | L/GIT,INT,PED, PSY, GER | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|-------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|--|
| 7.11 | A03FA03 | domperidon | p.o. | 30.00 | MG | 3.96 | | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|--|
| 7.12 | A03FA05 | alizaprid | p.o. | 0.15 | GM | 3.96 | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | prokinetika, ostatní cesty aplikace | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|--|--|
| 8.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.rect. | 30.00 | MG | 41.50 | | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|---|--|
| 8.2 | A03FA01 | metoclopramid | parent. | 30.00 | MG | 21.28 | O | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|---|--|

93105 DEGAN inj 50x2ml/10mg LEK SLO

| | | | | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-------|----|-------|--|--|
| 8.3 | A03FA02 | cisaprid | p.rect. | 30.00 | MG | 47.57 | | |
|-----|---------|----------|---------|-------|----|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|---------|------|----|-------|--|--|
| 8.4 | A03FA03 | domperidon | p.rect. | 0.12 | GM | 41.50 | | |
|-----|---------|------------|---------|------|----|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|--|
| 8.5 | A03FA05 | alizaprid | parent. | 0.15 | GM | 16.47 | O | |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | antiemetika, perorální podání | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|--------|---|--|
| 9.1 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16.00 | MG | 535.50 | P | |
|-----|---------|---|------|-------|----|--------|---|--|

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-----|-----|
| 15829 | EMESET- 4 | por tbl film 6x4mg | SDD | CZ |
| 15830 | EMESET- 4 | por tbl film 60x4mg | SDD | CZ |
| 84744 | EMESET- 4 | tbl obd 6x4mg | CIA | IND |
| 84794 | EMESET- 4 | tbl obd (10x6)x4mg | CIA | IND |

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|------|--------|----|--------|---|
| 9.2 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16.00 | MG | 396.90 | P |
| 9.3 | A04AA01 | ondansetron (rychle rozpustné pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16.00 | MG | 562.30 | P |
| 9.4 | A04AA01 | ondansetron ((rychle rozpustné pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16.00 | MG | 416.70 | P |
| 9.5 | A04AA01 | ondansetron (tekuté lékové formy) | p.o. | 16.00 | MG | 754.65 | P |
| 9.6 | A04AA02 | granisetron | p.o. | 2.00 | MG | 396.90 | P |
| 9.7 | A04AA03 | tropisetron | p.o. | 5.00 | MG | 396.90 | P |
| 9.8 | A04AA04 | dolasetron | p.o. | 200.00 | MG | 396.90 | P |

Ondasetron, granisetron, tropisetron a dolasetron jsou indikovány u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|-------|----|------|--|
| 9.9 | A04AD | různá antiemetika (meklozin) | p.o. | 50.00 | MG | 3.31 | |
| 9.10 | A04AD | různá antiemetika (theoklát embraminu) | p.o. | 50.00 | MG | 3.31 | |
| 9.11 | A04AD | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.o. | 0.10 | GM | 3.31 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10 | antiemetika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 10.1 | A04AA01 | ondansetron (léková forma čípků) | p.rect. | 16.00 | MG | 648.93 | P |
|------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|--------|------------|-----|---|
| 56742 | ZOFRAN | sup 1x16mg | GWE | F |
| 70533 | ZOFRAN | sup 1x16mg | GWH | F |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 10.2 | A04AA01 | ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 16.00 | MG | 895.70 | P |
|------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|--------|-------------------|-----|-----|
| 84441 | EMESET | inj 5x2ml/4mg | CIA | IND |
| 15827 | EMESET | inj sol 5x2ml/4mg | SDD | CZ |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 10.3 | A04AA01 | ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli) | parent. | 16.00 | MG | 722.40 | P |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 10.4 | A04AA02 | granisetron | parent. | 3.00 | MG | 474.20 | P |
|------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 10.5 | A04AA03 | tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 816.20 | P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 10.6 | A04AA03 | tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 474.20 | P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|--------|----|--------|---|
| 10.7 | A04AA04 | dolasetron | parent. | 100.00 | MG | 474.20 | P |
|------|---------|------------|---------|--------|----|--------|---|

Ondasetron, granisetron, tropisetron a dolasetron jsou indikovány u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 10.8 | A04AD01 | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.rect. | 0.10 | GM | 9.38 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------|-------|----|----------|----------------------------|--|
| 11 | hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra | | | | | | | |
| 11.1 | A05AA01 | kyselina chenodeoxycholová | p.o. | 1.00 | GM | 21.46 | L/GIT,INF | |
| 11.2 | A05AA02 | kyselina ursodeoxycholová | p.o. | 0.75 | GM | 23.74 | L/GIT,INF | |
| 91017 URSOFALK cps 100x250mg FAK D | | | | | | | | |
| 11.3 | A05AX | jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol) | p.o. | 3.00 | DF | 1.62 | | |
| 11.4 | A05AX02 | hymekromon | p.o. | 1.20 | GM | 5.96 | | |
| 11.5 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | p.o. | 4.00 | DF | 11.73 | | |
| 11.6 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | parent. | 1.00 | DF | 42.72 | H | |
| 11.7 | A05BA | léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci) | p.o. | 0.21 | GM | 5.51 | | |
| 11.8 | A05BA03 | silymarin | parent. | 0.35 | GM | 2 345.13 | H | |
| 11.9 | A05BA03 | silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 5.51 | | |
| 01147 | SILYMARIN AL 50 | drg 100x50mg | APA | D | | | | |
| 76762 | SILYMARIN AL 50 | drg 30x50mg | APA | D | | | | |
| 11.10 | A05BA03 | silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 4.40 | | |
| 12 | laxativa a další léčiva k očištění střeva | | | | | | | |
| 12.1 | A06AD10 | kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku) | p.o. | 4.00 | DF | 242.70 | | |
| 12.2 | A06AD11 | laktulóza | p.o. | 6.70 | GM | 4.50 | L/GIT,INT,GER,PED,CHI, ONK | |
| 42547 | LACTULOSE AL SIRUP | por sir 1x500ml | APA | D | | | | |
| 12.3 | A06AD12 | laktitol | p.o. | 10.00 | GM | 3.71 | L/GIT,INT,GER,CHI | |
| 12.4 | A06AD15 | macrogol | p.o. | 4.00 | DF | 242.70 | | |
| 12.5 | A06AG10 | sorbitol v kombinaci s kont. laxativem | p.rect. | 2.00 | DF | 174.01 | | |
| 92489 | YAL | sol 10x67.5ml | TRM | D | | | | |
| 13 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání | | | | | | | |
| 13.1 | A07AA01 | neomycin | p.o. | 5.00 | GM | 609.91 | H | |
| 13.2 | A07AA02 | nystatin | p.o. | 1.50 | MU | 5.96 | | |
| 13.3 | A07AA03 | natamycin | p.o. | 0.30 | GM | 41.01 | | |
| 13.4 | A07AA11 | rifaximin | p.o. | 0.80 | GM | 85.00 | P | |

Rifaximin je indikován k použití u:
1) hepatální encefalopatie,

- 2) profylaxe v kolorektální chirurgii,
 3) pseudomembranosní kolitidě,
 4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin,
 5) prokázané divertikulitidě tráčníku citlivé na rifaximin.

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|--------|------------|
| 13.5 | A07BC05 | diosmectit (plv. susp.) | p.o. | 1.00 | DF | 3.86 | L/PED, INF |
| 13.6 | A07EA06 | budesonid | p.o. | 9.00 | MG | 103.80 | P |

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

| | | | | |
|-------|------------|-----------------|-----|---|
| 64786 | BUDENOFALK | cps ent 50x3mg | FAK | D |
| 64787 | BUDENOFALK | cps ent 100x3mg | FAK | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|------|--------|----|-------|---|
| 13.7 | A07EB01 | natrium kromoglykát | p.o. | 800.00 | MG | 73.58 | P |
|------|---------|---------------------|------|--------|----|-------|---|

Léčbu natrium kromoglykátem indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protištítek a při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|------|----|-------|--------------------|
| 13.8 | A07EC01 | sulfasalazin | p.o. | 2.00 | GM | 15.14 | L/GIT,INT,REV, GER |
|------|---------|--------------|------|------|----|-------|--------------------|

| | | | | |
|-------|-------------------|----------------------|-----|-----|
| 02159 | SULFASALAZIN K | por tbl flm50x500mg | KRK | SLO |
| 04304 | SULFASALAZIN K-EN | por tblient100x500mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 13.9 | A07EC02 | mesalazin (léková forma - sáčky) | p.o. | 1.50 | GM | 44.12 | P |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|

Mesalazin per os – léková forma-sáčky: je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u dětí do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku; zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|---------------|
| 13.10 | A07EC02 | mesalazin (potahované tablety) | p.o. | 1.50 | GM | 23.08 | L/GIT,INT,GER |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|---------------|

| | | | | |
|-------|--------------|---------------------|-----|---|
| 75567 | SALOFALK 500 | tbl obdent100x500mg | FAK | D |
| 93235 | SALOFALK 250 | tbl ent 100x250mg | FAK | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 13.11 | A07EC02 | mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním) | p.o. | 1.50 | GM | 44.12 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním: je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|---|
| 13.12 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek | p.o. | 2.00 | DF | 25.14 | P |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|---|

Přípravek je indikován k udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů.

| | | | | |
|-------|---------------|-----------------|-----|---|
| 66065 | MUTAFLOR 20MG | cps ent 20x20mg | ARP | D |
|-------|---------------|-----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|------------|
| 13.13 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy | p.o. | 1.00 | DF | 43.99 | L/PED, INF |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--------------------|
| 13.14 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy | p.o. | 4.00 | DF | 3.86 | L/PED,GIT,GER, INF |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--------------------|
| 13.15 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy | p.o. | 2.00 | ML | 3.55 | L/PED,GIT,GER, INF |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | |
|-------|-------------|-------------|-----|---|
| 09159 | HYLAK FORTE | sol 1x100ml | MCK | D |
|-------|-------------|-------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------|------------|-----|---|
| 09158 | HYLAK FORTE | sol 1x30ml | MCK | D |
|-------|-------------|------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|---|
| 13.16 | A07FA02 | saccharomyces boulardii sicatus | p.o. | 1.00 | DF | 5.50 | P |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|---|

Přípravky s obsahem *saccharomyces boulardii* jsou indikovány k léčbě infekčních průjmu, k profylaxi a léčbě průjmu u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy. Nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro profylaxi a léčbu cestovatelských průjmu.

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 14 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---------------|
| 14.1 | A07EA06 | budesonid | p.rect. | 2.00 | MG | 250.00 | L/GIT,INT,GER |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---------------|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 14.2 | A07EC | paraaminosalicylát sodný | p.rect. | 2.00 | GM | 46.20 | L/GIT |
|------|-------|--------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 14.3 | A07EC02 | mesalazin (čípky do 250 mg včetně) | p.rect. | 1.50 | GM | 117.19 | L/GIT |
|------|---------|------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

13489 SALOFALK 250 rct sup 30x250mg FAK D

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 14.4 | A07EC02 | mesalazin (čípky nad 250 mg) | p.rect. | 1.50 | GM | 101.11 | L/GIT |
|------|---------|------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

75568 SALOFALK 500 sup 10x500mg FAK D

75569 SALOFALK 500 sup 30x500mg FAK D

76704 ASACOL sup 20x500mg TLT CH

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 14.5 | A07EC02 | mesalazin (enm.) | p.rect. | 1.50 | GM | 68.28 | L/GIT |
|------|---------|------------------|---------|------|----|-------|-------|

93770 SALOFALK 4 GM enm 7x60ml/4gm FAK D

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 15 | digestiva včetně enzymových přípravků | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|----------|---|------|--|
| 15.1 | A09AA | enzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|-------|--|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|--|
| 15.2 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000U včetně v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|----------|---|------|--|
| 15.3 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|---------|---|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|---|
| 15.4 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 1.41 | P |
|------|---------|--|------|----------|---|------|---|

Multienzymy ve formě enterosolventních tablet s obsahem lipázy 20 000U jsou indikovány u pacientů s prokázanou algickou formou chronické pankreatitidy (průkaz musí být doložen ERCP anebo CT).

40379 PANZYNORM FORTE-N por TBL FLM 100 KRK SLO

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|---|
| 15.5 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) – formy mikropelet | p.o. | 5 000.00 | U | 1.95 | P |
|------|---------|--|------|----------|---|------|---|

Multienzymy ve formě mikropelet jsou indikovány u pacientů s cystickou fibrózou a prokázanou chronickou pankreatitidou (průkaz musí být doložen ERCP anebo CT).

54534 PANZYTRAT 25 000 por cps dur 50- sklo NOA D

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|--|
| 15.6 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|
| 15.7 | A09AC01 | pepsin a kyselinotvorné látky | p.o. | 2.00 | DF | 0.10 | |
|------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | insuliny krátkodobě působící | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 16.1 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

92608 HUMULIN R CARTIDGE

inj sol 5x3ml/300ut

LIL F

| | | | | | | | |
|------|---------|--|--|-------|---|-------|---|
| 16.2 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, parent. cartridge v jednorázovém aplikátoru | | 40.00 | U | 28.00 | P |
|------|---------|--|--|-------|---|-------|---|

Diabetes mellitus léčený inzulínem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí a prokazatelně nemůže v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 16.3 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

44576 HUMULIN R 100 M.J./ML

inj 1x10ml/1ku

LIL F

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 16.4 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující - cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 16.5 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.48 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | |
|----|--|
| 17 | insuliny střednědobě působící včetně kombinací |
|----|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|
| 17.1 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge | parent. | 40.00 | U | 21.60 | L/DIA |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|--|
| 17.2 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 11.99 | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 17.3 | A10AC03 | insulin vepřový středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12.64 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 17.4 | A10AC30 | insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12.64 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 17.5 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

92605 HUMULIN M3 (30/70) CARTIDGE inj sus 5x3ml/300ut LIL F

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 17.6 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 28.00 | P |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

Diabetes mellitus léčený inzulínem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí a prokazatelně nemůže v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 17.7 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

40878 INSULIN-HM MIX 30 inj 1x10ml/1ku LEX CZ

| | |
|----|------------------------------|
| 18 | insuliny dlouhodobě působící |
|----|------------------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 18.1 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

92607 HUMULIN N (NPH) CARTIDGE inj sus 5x3ml/300ut LIL F

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 18.2 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 28.00 | P |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

Diabetes mellitus léčený inzulínem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí a prokazatelně nemůže v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---|----------------|-------|----|-------|-------|
| 18.3 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
| 40875 | INSULIN-HM NPH | | inj 1x10ml/1ku | LEX | CZ | | |
| 44567 | HUMULIN N 100 M.J./ML | | inj 1x10ml/1ku | LIL | F | | |
| 18.4 | A10AE01 | insulin lidský dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
| 18.5 | A10AE02 | insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 11.99 | |
| 18.6 | A10AE30 | insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 12.64 | |
| 18.7 | A10AE04 | insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv. | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
| 18.8 | A10AE04 | insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridge | parent. | 40.00 | U | 49.00 | P |
| 18.9 | A10AE05 | insulin detemir, dlouhodobě účinný, cartridge | parent. | 40.00 | U | 49.00 | P |

Analogu inzulínů s dlouhodobým účinkem jsou indikována jen u nemocných léčených v diabetologických centrech nebo ambulantními diabetology na doporučení diabetologického centra, u nichž je indikována léčba inzulinovou pumpou (opakováne hypoglykémie, rozkolísaný diabetes s neuspokojivou kompenzací, nutnost podávat dlouhodobě účinný inzulín vícekrát denně).

| | | | | | | | |
|------|---|---|---------|-------|---|-------|---|
| 19 | analogu insulinů a insulinu používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy | | | | | | |
| 19.1 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 30.49 | P |
| 19.2 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 28.28 | |
| 19.3 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 30.49 | P |
| 19.4 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 28.28 | |
| 19.5 | A10AB06 | insulin glulisin, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 30.49 | P |

Inzuliny v patronách (cartridge) jsou indikovány u pacientů s diabetes mellitus všech typů, kde není možná kompenzace jiným způsobem:

- a) mladistvých do 18 let léčených s dvěma a více jak dávkami inzulinu denně,
- b) léčených intenzivně inzulinem čtyřmi a více dávkami,
- c) pacientů, kterých celkový zdravotní stav znemožňuje aplikaci inzulinu stříkačkou (např. porucha zraku, nemohoucnost, onemocnění nervového systému s třesem horních končetin).

Inzulinová analoga (insulin aspart, insulin lispro, insulin glulisin) jsou indikována u pacientů, kde vedou k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu v porovnání s klasickými humánními inzuliny, tj. kde podmiňují pokles průměrné hodnoty HbA1c aspoň o 10 % a vedou tudíž i ke zlepšení glykemických profilů včetně snížení frekvence hypoglykémie.

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|----------------------|-------|----|-------|-------|
| 19.6 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump | parent. | 40.00 | U | 28.24 | L/DIA |
| 28001 | VELOSULIN 100 IU/ML | | inj sol 1x10ml/1ku | NOO | DK | | |
| 81496 | VELOSULIN HM (GE) | | inj sol 1x10ml/100ut | NOO | DK | | |
| 19.7 | A10AD05 | insulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridge | parent. | 40.00 | U | 30.49 | L/DIA |

| | | | | | | | |
|------|---|------------------------|------|------|----|------|--|
| 20 | perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů | | | | | | |
| 20.1 | A10BA02 | metformin hydrochlorid | p.o. | 2.00 | GM | 6.12 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|---|------|------|----|-------|---|--|
| 30356 | METFORMIN AL 500 | por tbl flm60x500mg | APA | D | | | | |
| 41506 | METFIREX 850 MG | por tblflm120x850mg | CHN | H | | | | |
| 20.2 | A10BA03 | buformin | p.o. | 0.20 | GM | 3.47 | | |
| 20.3 | A10BD02 | metformin a glibenklamid - kombinace | p.o. | 3.00 | DF | 4.95 | | |
| 20.4 | A10BD03 | metformin a rosiglitazon v kombinaci 500 mg a 1 mg | p.o. | 1.00 | DF | 10.55 | P | |
| 20.5 | A10BD03 | metformin a rosiglitazon v kombinaci 500 mg a 2 mg | p.o. | 1.00 | DF | 19.60 | P | |
| 20.6 | A10BD03 | metformin a rosiglitazon v kombinaci 1000 mg a 2 mg | p.o. | 1.00 | DF | 21.10 | P | |

Metformin a rosiglitazon v kombinaci je indikován pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu a nadváhou (BMI vyšší než 25 kg/m²) a nedostatečnou kompenzací dosavadní léčbou metforminem v dávce alespoň 2g denně (glykémie nalačno vyšší než 7,0 mmol/l, HbA1c vyšší než 6,0 %/dle IFC/).

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|--|
| 20.7 | A10BF01 | akarboza | p.o. | 0.30 | GM | 10.26 | | |
| 20.8 | A10BG02 | rosiglitazon s obsahem 4 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 36.20 | P | |
| 20.9 | A10BG03 | pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 32.00 | P | |
| 20.10 | A10BG03 | pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 41.60 | P | |

Deriváty thiazolidindionů jsou indikovány k léčbě pacientů s diabetem 2. typu a nadváhou (BMI vyšší než 25 kg/m²) s vyjádřenou inzulínovou rezistencí. Indikovaný jsou v kombinaci s jinými PAD; v monoterapii pouze při kontraindikaci či nesnášenlivosti metforminu (průjem, zvracení) a jiných PAD, za podmínek nedostatečné kompenzací dosavadní léčbou (glykémie nalačno vyšší než 7,0 mmol, HbA_{1c} vyšší než 6,0 %/dle IFC/). Denní dávka hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 1tbl (s obsahem 4 mg) rosiglitazonu nebo 1tbl (s obsahem 15 mg nebo 30mg) pioglitazonu.

| | | | | | | | | |
|------|--|---|------|-------|----|------|--|--|
| 21 | perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika | | | | | | | |
| 21.1 | A10BB01 | glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 2.30 | | |
| 21.2 | A10BB01 | glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.86 | | |
| 21.3 | A10BB01 | glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 7.00 | MG | 1.37 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|------|-------|----|------|--|--|
| 94523 | GLUCOBENE 1.75 MG | tbl 120x1.75mg | MCK | D | | | | |
| 21.4 | A10BB01 | glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě) | p.o. | 7.00 | MG | 0.86 | | |
| 94525 | GLUCOBENE 3.5 MG | tbl 120x3.5mg | MCK | D | | | | |
| 21.5 | A10BB02 | chlorpropamid | p.o. | 0.37 | GM | 0.78 | | |
| 21.6 | A10BB03 | tolbutamid | p.o. | 1.50 | GM | 2.32 | | |
| 21.7 | A10BB04 | glibornurid | p.o. | 38.00 | MG | 4.79 | | |
| 21.8 | A10BB05 | tolazamid | p.o. | 1.00 | GM | 2.49 | | |
| 21.9 | A10BB07 | glipizid | p.o. | 10.00 | MG | 3.80 | | |

87110 ANTIDIAB

tbl 30x5mg

KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|-------|
| 21.10 | A10BB08 | gliquidon | p.o. | 60.00 | MG | 5.65 | |
| 21.11 | A10BB09 | gliklazid | p.o. | 0.16 | GM | 5.90 | |
| 21.12 | A10BB09 | gliklazid, retardované lékové formy | p.o. | 2.00 | DF | 5.90 | |
| 21.13 | A10BB12 | glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | MG | 5.90 | |
| 21.14 | A10BB12 | glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.00 | MG | 4.90 | |
| 21.15 | A10BX02 | repaglinid | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | L/DIA |
| 21.16 | A10BX03 | nateglinid | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | L/DIA |

22 vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 22.1 | A11CA01 | retinol (vitamin A) | p.o. | 50.00 | KU | 1.12 | |
| 22.2 | A11CC01 | ergocalciferol (pevné lékové formy) | p.o. | 6.00 | KU | 0.54 | |

00353 VITAMIN D SLOVAKOFARMA

cps 1x300ku

SLO SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 22.3 | A11CC01 | ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně) | p.o. | 6.00 | KU | 13.10 | |
| 22.4 | A11CC01 | ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml) | p.o. | 6.00 | KU | 0.78 | |

00716 INFADIN

gtt 1x10ml /100mg

SLO SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 22.5 | A11CC02 | dihydrotachysterol | p.o. | 1.00 | MG | 17.13 | |
| 22.6 | A11CC03 | alfakalcidol do 0,50 rg včetně | p.o. | 1.00 | RG | 18.60 | P |
| 22.7 | A11CC03 | alfakalcidol nad 0,50 rg | p.o. | 1.00 | RG | 17.55 | P |
| 22.8 | A11CC04 | kalcitriol | p.o. | 1.00 | RG | 35.10 | P |

Léčbu p.o. alfabalcidolem a kalcitriolem indikuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. S osteoporózou:

a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,

b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,

c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. K léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. S křivici rezistentní na vitamin D.

4. S osteomalacií rezistentní na vitamin D.

5. S hypoparathyreózou nebo pseudohypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 22.9 | A11CC05 | cholecalciferol - pevné lékové formy | p.o. | 0.50 | MG | 1.04 | |
| 22.10 | A11CC05 | cholecalciferol – tekuté lékové formy | p.o. | 0.50 | MG | 3.84 | |

12023 VIGANTOL

por gtt sol 1x10ml

MEC D

23 vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|---------|-------|----|-------|--|
| 23.1 | A11CA01 | retinol (vitamin A) | parent. | 50.00 | KU | 10.40 | |
|------|---------|---------------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|---------|------|----|--------|-----|
| 23.2 | A11CC | paricalcitolum | parent. | 2.50 | RG | 385.00 | O/P |
|------|-------|----------------|---------|------|----|--------|-----|

Léčba parikalcitolem je indikována pokud:

- a) je koncentrace PHT v séru vyšší než 400pg/ml i přes léčbu kalcitriolem, trvající 3 měsíce,
- b) selhává léčba kalcitriolem (hyperkalcémie při léčbě kalcitolem – vyšší než 2,7 mmol/l a hyperfosfatémie vyšší než 2,5 mmol/l; fosfokalciový součin je vyšší než 6,5),
- c) extraoseální kalcifikace při pokročilé hyperparathyreóze).

Podmínkou léčby je:

- a) sonograficky prokázaná zvětšená přeštitná tělíska,
- b) ověřená účinnost hemodialýzy (Kt/V vyšší než 1,2),
- c) compliance pacienta s opatřeními regulujícími koncentraci fosforu v séru (dietoterapie, účinná dialýza, proskripce vazačů fosfátů v GIT).

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|---------|------|----|------|--|
| 23.3 | A11CC01 | ergokalciferol | parent. | 6.00 | KU | 0.72 | |
|------|---------|----------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 23.4 | A11CC04 | kalcitriol | parent. | 1.00 | RG | 174.20 | P |
|------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

Léčbu parenterálním kalcitriolem, ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. S osteoporózou:

- a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,
- b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,
- c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. K léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. S křivici rezistentní na vitamin D.

4. S osteomalací rezistentní na vitamin D.

5. S hypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|---------|------|----|------|--|
| 23.5 | A11CC05 | cholekalciiferol | parent. | 1.00 | KU | 0.94 | |
|------|---------|------------------|---------|------|----|------|--|

11093 VIGANTOL 50000 inj 5x1ml/1.25mg MEC D

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 24 | soli vápníku, perorální podání | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 24.1 | A12AA03 | glukonát vápenatý (na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 0.59 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 24.2 | A12AA04 | uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tablety | p.o. | 0.50 | GM | 2.34 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

70536 TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM portblnob1000x0.5gm MVM CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 24.3 | A12AA04 | uhličitan vápenatý (na obsah vápníku),léková forma šumivé tablety | p.o. | 0.50 | GM | 2.34 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 24.4 | A12AA04 | uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) léková forma prášky | p.o. | 0.50 | GM | 2.34 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 24.5 | A12AA07 | chlorid vápenatý (na obsah vápníku),tekuté lékové formy, | p.o. | 0.20 | GM | 0.64 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 24.6 | A12AA12 | octan vápenatý (na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 10.00 | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 | kombinace solí vápníku, perorální podání | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 25.1 | A12AA20 | vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 2.54 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 25.2 | A12AX | uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciiferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 5 mg cholekalciiferolu v 1 dávce včetně | p.o. | 1.00 | DF | 3.26 | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|------------------------|--|
| 25.3 | A12AX | uhličitan vápenatý v kombinaci s p.o. cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce | | 1.00 | DF | 4.00 | | |
| 25.4 | A12AX | uhličitan vápenatý v kombinaci s p.o. cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 600 mg vápníku v 1 dávce | | 1.00 | DF | 6.51 | | |
| 25.5 | A12AX | vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný) | p.o. | 1.00 | DF | 5.38 | L/INT,GYN,ORT, REV,GER | |
| 25.6 | A12AX | vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat) | p.o. | 1.00 | DF | 4.01 | L/INT,GYN,ORT, REV,GER | |
| 25.7 | A12CX | jiné minerální produkty (na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 1.19 | | |

99808 BIOMIN H plv 60x3gm(sáčky) BMN SK

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|------|----|-------|--|--|
| 26 | soli vápníku, ostatní cesty aplikace | | | | | | | |
| 26.1 | A12AA03 | glukonát vápenatý (na obsah vápníku) | parent. | 3.00 | GM | 59.16 | | |
| 26.2 | A12AA07 | chlorid vápenatý (na obsah vápníku) | parent. | 0.20 | GM | 2.98 | | |

00409 CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|------|------|----|------|--|--|
| 27 | soli draslíku, perorální podání | | | | | | | |
| 27.1 | A12BA | draslík (na obsah draslíku) | p.o. | 1.50 | GM | 2.44 | | |
| 27.2 | A12BA | draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku) | p.o. | 1.00 | GM | 9.78 | | |
| 27.3 | A12BA01 | chlorid draselný (na obsah chloridu draselného) | p.o. | 3.00 | GM | 2.37 | | |

13715 KALNORMIN por tbl pro 30x1gm ICN H

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|---------|------|----|-------|---|--|
| 28 | soli draslíku, ostatní cesty aplikace | | | | | | | |
| 28.1 | A12BA | draslík v kombinaci s hořčíkem | parent. | 1.00 | DF | 13.20 | O | |

02132 CARDILAN inj 10x10ml HBS SK

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|--|
| 28.2 | A12BA | draslík v kombinaci s hořčíkem, léková forma infuzí | parent. | 250.00 | ML | 86.00 | O | |
| 28.3 | A12BA01 | chlorid draselný (na obsah chloridu draselného) | parent. | 3.00 | GM | 53.45 | O | |

02486 KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------|------|----|-------|------------------------|--|
| 29 | soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání | | | | | | | |
| 29.1 | A12CC03 | glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY, GYN,GER | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---------------------------|
| 29.2 | A12CC04 | citronan hořčnatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY, GYN,GER |
| 29.3 | A12CC05 | aspartat hořčnatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY, GYN,GER |
| 29.4 | A12CC06 | mléčnan hořčnatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY, GYN,GER |
| 29.5 | A12CC09 | orotat hořčnatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY, GYN,GER |
| 29.6 | A12CC30 | kombinace hořčnatých solí (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY, GYN,GER |

99891 MAGNESIUM 250 MG PHARMAVIT

por tbl eff 20

CPW H

30 soli hořčíku, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 30.1 | A12CC02 | síran hořčnatý (koncentrace do 10 % včetně) | parent. | 1.00 | GM | 19.72 | O |
| 30.2 | A12CC02 | síran hořčnatý (koncentrace nad 10%) | parent. | 1.00 | GM | 9.28 | O |

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.20%

inj 5x10ml 20%

HBS SK

31 soli fluoru, perorální podání

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|-------|----|------|---|
| 31.1 | A12CD01 | fluorid sodný | p.o. | 88.00 | MG | 4.06 | P |
|------|---------|---------------|------|-------|----|------|---|

09495 OSSIN RETARD

tbl obd 100x40mg

GRU D

32 ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 32.1 | A08AA10 | sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 15.00 | MG | 90.80 | P |
| 32.2 | A08AA10 | sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletě | p.o. | 15.00 | MG | 68.40 | P |

Sibutramin předepisuje diabetolog pacientům s nedostatečně kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu (glykohemoglobin vyšší než 6% /dle IFC/) a současně s BMI vyšším než 35 kg/m², u nichž je diagnostikována diabetická dyslipidémie vyžadující farmakologickou léčbu. Kontraindikací je ICHS nebo krevní tlak vyšší než 145/90. Sibutramin lze předepsat pouze těm pacientům, kteří sníží svou hmotnost o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance musí být vyhodnocena každých 14 dnů od zahájení léčby (krevní tlak a tepová frekvence) po dobu 3 měsíců, účinnost po 3 měsících léčby sibutraminem. Kritériem účinnosti léčby sibutraminem je pokles hmotnosti nejméně o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie nalačno nebo pokles HbA1c o alespoň 0,5%). Není – li léčba účinná, je podávání sibutraminu po 3 měsících ukončeno. Léčba sibutraminem je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|--------|----|-------|---|
| 32.3 | A08AB01 | orlistat | p.o. | 360.00 | MG | 68.40 | P |
|------|---------|----------|------|--------|----|-------|---|

Diabetolog indikuje orlistat k léčbě obézních pacientů s diabetem 2. typu a BMI nad 35 kg/m² se současně diagnostikovanou arteriální hypertenzí a/nebo dyslipidémií a/nebo ischemickou chorobou srdeční, u nichž není diabetes uspokojivě kompenzovan (HbA1c vyšší než 6,0% /IFC/) při stávající antidiabetické medikaci. Účinnost terapie orlistatem je kontrolovaná po 3 měsících, kritériem je zlepšení kompenzace diabetu (glykémie nalačno a/nebo pokles HbA1c o alespoň 0,5% v absolutním vyjádření) a pokles hmotnosti nejméně o 5% původní tělesné hmotnosti. Není – li léčba účinná, je podávání orlistatu po 3 měsících ukončeno. Léčba je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 32.4 | A11GA01 | kyselina askorbová (vitamin C) | parent. | 0.20 | GM | 3.32 | H |
| 32.5 | A14AB01 | nandrolon phenpropionát | parent. | 2.00 | MG | 3.11 | |
| 32.6 | A16AA01 | levokarnitin | parent. | 2.00 | GM | 356.82 | O |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 32.7 | A16AA02 | ademetionin | p.o. | 1.00 | GM | 59.83 | Z |
|------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 32.8 | A16AA02 | ademetionin | parent. | 0.50 | GM | 94.66 | Z |
|------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

12319 TRANSMETIL 500 MG INJEKCE inj pso lqf 5x500mg HOL I

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|--------|---|-----------|---|
| 32.9 | A16AB02 | imiglucerasa | parent. | 200.00 | U | 40 341.80 | Z |
|------|---------|--------------|---------|--------|---|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|
| 32.10 | A16AB03 | agalsidáza alfa | parent. | 1.00 | MG | 17 700.00 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|
| 32.11 | A16AB04 | agalsidáza beta | parent. | 5.00 | MG | 17 700.00 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-----------|---|
| 32.12 | A16AB05 | laronidáza | parent. | 1.00 | DF | 33 264.00 | Z |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-----------|---|

13206 ALDURAZYME inf cnc sol 1x5ml GBZ GB

13207 ALDURAZYME inf cnc sol 10x5ml GBZ GB

13208 ALDURAZYME inf cnc sol 25x5ml GBZ GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|------|----|-------|---|
| 32.13 | A16AX01 | kyselina tioktová | parent. | 0.20 | GM | 81.09 | O |
|-------|---------|-------------------|---------|------|----|-------|---|

55380 THIOGAMMA 600 INJECT inj 20x20ml/600mg SLH D

84378 THIOGAMMA 600 INJECT inj 5x20ml/600mg SLH D

84379 THIOGAMMA 600 INJECT inj 10x20ml/600mg SLH D

55381 THIOGAMMA 600 INJECT inj 500x20ml/600mg SLH D

84380 THIOGAMMA 600 INJECT inj 50x20ml/600mg SLH D

84381 THIOGAMMA 600 INJECT inj 100x20ml/600mg SLH D

84382 THIOGAMMA 600 INJECT inj 1000x20ml/600mg SLH D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|----------|---|
| 32.14 | A16AX06 | miglustat | p.o. | 0.30 | GM | 9 734.00 | Z |
|-------|---------|-----------|------|------|----|----------|---|

33 antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 33.1 | B01AA03 | warfarin | p.o. | 7.50 | MG | 3.22 | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|

58161 LAWARIN 2 tbl 50x2mg PVL CZ

58162 LAWARIN 5 tbl 50x5mg PVL CZ

94114 WARFARIN ORION 5 MG tbl 100x5mg ORN SF

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 33.2 | B01AA08 | ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 3.60 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 33.3 | B01AA08 | ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 4.30 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

34 antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-------|----|-------|---|
| 34.1 | B01AB01 | heparin | parent. | 10.00 | KU | 13.32 | O |
|------|---------|---------|---------|-------|----|-------|---|

13319 HEPARIN SANDOZ 25000 IU/5ML inj sol100x5ml/25ku BCA A

74999 HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT inj 100x5ml/25ku BCA A

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|------|----|-----------|---|
| 34.2 | B01AB02 | antithrombin | parent. | 2.10 | KU | 24 250.00 | U |
|------|---------|--------------|---------|------|----|-----------|---|

93174 ANTITHROMBIN III IMMUNO inj pso lqf 1x1ku BXG A

35 antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 35.1 | B01AB | certoparin | parent. | 3.00 | KU | 76.79 | P |
|------|-------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|------------------|--|-------------------|------|-----|-------|---|
| 31316 | TROPARIN AMPOULE | | inj 10x0.5ml/32mg | | BCA | A | |
| 35.2 | B01AB04 | dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.3 | B01AB04 | dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| 35.4 | B01AB04 | dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 49.60 | P |
| 35.5 | B01AB05 | enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.6 | B01AB05 | enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| 35.7 | B01AB05 | enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 59.74 | P |
| 35.8 | B01AB05 | enoxaparin nad 80 mg do 100 mg v jedné ampuli včetně | parent. | 3.00 | KU | 49.60 | P |
| 35.9 | B01AB05 | enoxaparin nad 100 mg v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 39.60 | P |
| 35.10 | B01AB06 | nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.11 | B01AB06 | nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| 35.12 | B01AB06 | nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 59.74 | P |
| 35.13 | B01AB06 | nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně | parent. | 3.00 | KU | 49.60 | P |
| 35.14 | B01AB06 | nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 39.60 | P |
| 35.15 | B01AB07 | parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.16 | B01AB07 | parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| 35.17 | B01AB07 | parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 59.74 | P |
| 35.18 | B01AB08 | reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.19 | B01AB08 | reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |

Nízkomolekulární hepariny jsou při poskytování ambulantní péče indikovány:

- 1) k léčbě hluboké žilní trombózy potvrzené doplerovským vyšetřením,
- 2) k léčbě stavů vyžadujících antikoagulační léčbu v průběhu gravidity,
- 3) v období před plánovanou srdeční transplantací,
- 4) k prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat potřebné, snížené hladiny koagulačních faktorů perorálními antikoagulantii, či s nemožností podat tato antikoagulancia,
- 5) k převedení pacienta z perorálních antikoagulantii krátkodobě (nejdále 5 dnů) před plánovanou operací na nízkomolekulární hepariny.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|--------|---|-------|---------------------------|
| 35.20 | B01AB11 | sulodexid | parent. | 600.00 | U | 63.44 | O |
| 35.21 | B01AB11 | sulodexid | p.o. | 250.00 | U | 10.60 | L/OPH,INT,NEU, DIA,GER |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|------|-------|----|-------|---|--|
| 36 | antiagregancia kromě heparinu | | | | | | | |
| 36.1 | B01AC | lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce) | p.o. | 1.00 | DF | 0.68 | | |
| 36.2 | B01AC | lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce) | p.o. | 1.00 | DF | 0.64 | | |
| 36.3 | B01AC04 | klopidogrel | p.o. | 75.00 | MG | 49.00 | P | |

Léčbu klopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) v prevenci recidiv koronární příhody u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevace ST (nestabilní angina pectoris či infarkt myokardu bez elevace ST) po dobu 6 měsíců,
- b) po intravaskulárních intervencích s vysokým rizikem trombózy (implantace stentu, rotablace, aterektomie, přímá koronární angioplastika) obvykle v kombinaci s k. acetylsalicylovou po dobu jednoho měsíce či u tzv. „potahovaných“ stentů uvolňujících sirolimus či paclitaxel po dobu 1 měsíce.

| | | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|-------|---|--|
| 36.4 | B01AC05 | ticlopidin | p.o. | 0.50 | GM | 20.70 | P | |
|------|---------|------------|------|------|----|-------|---|--|

Léčbu ticlopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) u alergie a prokazatelné intolerance k. acetylsalicylové či při nectitivosti na k. acetylsalicylovou prokázanou aggregometricky v indikaci snížení rizika kardiovaskulárních příhod u nemocných po ischemické mozkové příhodě (včetně TIA), u nemocných s ischemickou chorobou srdeční či s ischemickou chorobou dolních končetin,
- b) v prevenci recidiv mozkové příhody u nemocných po ischemické mozkové příhodě (včetně TIA), která se objevila při léčbě kys. acetylsalicylovou,
- c) v prevenci opakující se trombózy v arterio-venózní spojce u hemodialyzovaných nemocných při léčbě k.acetylsalicylovou.

66938 TAGREN tbl 30x250mg KRK SLO

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|--|
| 36.5 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová | parent. | 3.00 | GM | 36.30 | O | |
| 36.6 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 0.51 | | |
| 36.7 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 0.98 | | |
| 36.8 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 0.51 | | |
| 36.9 | B01AC07 | dipyridamol | p.o. | 400.00 | MG | 8.65 | P | |

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|--|
| 36.10 | B01AC07 | dipyridamol | parent. | 0.20 | GM | 224.45 | H | |
| 36.11 | B01AC09 | epoprostenol | parent. | 0.50 | MG | 4 213.00 | X | |
| 36.12 | B01AC10 | indobufen | p.o. | 0.30 | GM | 8.40 | P | |

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog u pacientů, u kterých je potřebné zajistit pouze krátkodobě antiagregační účinek (např. před chirurgickým výkonem).

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|---------|---|--|
| 36.13 | B01AC10 | indobufen | parent. | 0.30 | GM | 89.35 | H | |
| 36.14 | B01AC11 | iloprost | parent. | 50.00 | RG | 660.60 | X | |
| 36.15 | B01AC11 | iloprost | inhal. | 50.00 | RG | 1765.00 | X | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|---|
| 36.16 | B01AC30 | dipyridamol a kyselina acetylosalicylová p.o. v kombinaci | | 2.00 | DF | 12.00 | P |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|---|

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky k. acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

| | |
|----|-----------------------|
| 37 | fibrinolytické enzymy |
|----|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|
| 37.1 | B01AC13 | abciximab | parent. | 1.00 | DF | 10 018.00 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 37.2 | B01AC14 | anagrelid | parent. | 1.00 | DF | 140.00 | X |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|
| 37.3 | B01AD01 | streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce) | parent. | 1.50 | MU | 3 384.60 | U |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|

10937 STREPTASE inj sic 1x750ku AVN D

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|
| 37.4 | B01AD01 | streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce) | parent. | 1.50 | MU | 3 314.67 | U |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|

62461 STREPTASE inj sic 1x1.5mu AVN D

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.5 | B01AD02 | alteplaza | parent. | 0.10 | GM | 41 101.00 | U/P |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.6 | B01AD04 | urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně) | parent. | 3.00 | MU | 53 928.40 | U/P |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.7 | B01AD04 | urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně) | parent. | 3.00 | MU | 45 346.56 | U/P |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.8 | B01AD04 | urokináza (nad 500 KU v jedné dávce) | parent. | 3.00 | MU | 42 565.93 | U/P |
|------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|---|-----------|-----|
| 37.9 | B01AD07 | retepláza | parent. | 20.00 | U | 43 265.44 | U/P |
|------|---------|-----------|---------|-------|---|-----------|-----|

Alteplaza, urokináza, tenektepláza a retepláza jsou indikovány k léčbě:

a) akutního infarktu myokardu, u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Alteplaza je dále indikována při léčbě ischemické cévní mozkové příhody (léčbu je nutno zahájit do 3 hodin od vzniku příznaků ischemické cévní mozkové příhody a po vyloučení intrakraniálního krvácení vhodnou zobrazovací metodou).

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou jsou alteplaza, urokináza, tenektepláza a retepláza indikovány k:

- a) intrakoronární trombolýze,
- b) trombolýze akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|----------|---|
| 37.10 | B01AD10 | drotrecogin alfa (aktivovaný) | parent. | 5.00 | MG | 6 882.00 | X |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|
| 37.11 | B01AD11 | tenekteplaza do 40 mg včetně | parent. | 40.00 | MG | 47 508.00 | U/P |
|-------|---------|------------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|
| 37.12 | B01AD11 | tenekteplaza nad 40 mg | parent. | 40.00 | MG | 39 905.00 | U/P |
|-------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----|
| 37.13 | B01AD12 | protein C | parent. | 1.00 | IU | 65.38 | U/P |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----|

Léčbu proteinem C ordinuje hematolog v centru pro vrozené a získané poruchy hemostázy u nemocných s prokázaným vrozeným deficitem proteinu C.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 37.14 | B01AX03 | lepirudin | parent. | 1.00 | DF | 2 300.00 | H |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|---|
| 37.15 | B01AX05 | fondaparinux | parent. | 1.00 | DF | 95.00 | H |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|---|

| | |
|----|-------------------------------------|
| 38 | antifibrinolytika, perorální podání |
|----|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 38.1 | B02AA01 | kyselina aminokaproová | p.o. | 16.00 | GM | 38.86 | |
|------|---------|------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 38.2 | B02AA02 | kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 2.00 | GM | 40.72 | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 38.3 | B02AA02 | kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě) | p.o. | 2.00 | GM | 38.57 | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|

42613 EXACYL por tblfilm20x500mg SXQ P

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 38.4 | B02AA03 | kyselina aminomethylbenzoová | p.o. | 0.25 | GM | 19.13 | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|

02123 PAMBA tbl 10x250mg ABP D

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 39 | antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|---------|------|----|----------|---|
| 39.1 | B01AC16 | eptifibatide infuze | parent. | 1.00 | DF | 2 930.36 | H |
|------|---------|---------------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|---------|------|----|--------|---|
| 39.2 | B01AC16 | eptifibatide injekce | parent. | 1.00 | DF | 930.27 | H |
|------|---------|----------------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 39.3 | B01AC17 | tirofiban | parent. | 1.00 | DF | 5 437.00 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|---------|-------|----|-------|--|
| 39.4 | B02AA01 | kyselina aminokaproová | parent. | 16.00 | GM | 65.01 | |
|------|---------|------------------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|---------|------|----|-------|--|
| 39.5 | B02AA02 | kyselina tranexámová | parent. | 2.00 | GM | 64.32 | |
|------|---------|----------------------|---------|------|----|-------|--|

97411 EXACYL inj 5x5ml/500mg SWI F

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|---------|------|----|--------|--|
| 39.6 | B02AA03 | kyselina aminomethylbenzoová | parent. | 0.25 | GM | 186.61 | |
|------|---------|------------------------------|---------|------|----|--------|--|

42630 PAMBA inj sol 5x5ml/50mg AKZ D

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|--------|----|--------|---|
| 39.7 | B02AB01 | aprotinin | parent. | 500.00 | KU | 664.66 | H |
|------|---------|-----------|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 40 | vitamin K a jiná hemostatika | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------|---------|-------|----|-------|--|
| 40.1 | B02BA | menadiolfosfat sodná sůl | parent. | 10.00 | MG | 14.27 | |
|------|-------|--------------------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|-------|----|-------|--|
| 40.2 | B02BA01 | fytomenadion | p.o. | 20.00 | MG | 10.38 | |
|------|---------|--------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|-------|----|-------|--|
| 40.3 | B02BA01 | fytomenadion | parent. | 20.00 | MG | 15.68 | |
|------|---------|--------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------|------|----|-----------|---|
| 40.4 | B02BB01 | lidský fibrinogen | parent. | 5.00 | GM | 24 234,20 | U |
|------|---------|-------------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|--|
| 40.5 | B02BC | lokální hemostatika – karboxycelulosalok. (zásyп) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 40.6 | B02BC | lokální hemostatika (pěna) | lok. | 1.00 | C2 | 1.47 | |
|------|-------|----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 40.7 | B02BC | lokální hemostatika (rektaльní lékové formy) | lok. | 1.00 | DF | 7.19 | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 40.8 | B02BC01 | absorbovatelná želatinová houba | lok. | 1.00 | C2 | 2.69 | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|------|------|----|-------|--|
| 40.9 | B02BC06 | thrombin (houba) | lok. | 1.00 | DF | 56.80 | |
|------|---------|------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------------------|
| 40.10 | B02BX01 | etamsylat | p.o. | 0.75 | GM | 11.30 | L/OPH,HEM, ORL |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 40.11 | B02BX01 | etamsylat | parent. | 0.75 | GM | 80.51 | O |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

02213 DICYNONE 250 inj 100x2ml/250mg OMR CH

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--------|---|----------|-----|
| 41 | koagulační faktory (koagulační faktor VIII) | | | | | | |
| 41.1 | B02BD02 | koagulační faktor VIII (středně čištěný) | parent. | 500.00 | U | 5 083.42 | B/P |
| 41.2 | B02BD02 | koagulační faktor VIII (vysoce čištěný) | parent. | 500.00 | U | 5 818.70 | B/P |
| 53359 | ANTIHEM.F.(LIDSKÝ)HEMOFIL M | inj sic 1x500ut+sol | BXI | B | | | |
| 53360 | ANTIHEM.F.(LIDSKÝ)HEMOFIL M | inj sic 1x1000ut+so | BXI | B | | | |
| 41.3 | B02BD02 | koagulační faktor VIII (rekombinantní) | parent. | 500.00 | U | 5 818.70 | B/P |
| 41.4 | B02BD02 | koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem | parent. | 500.00 | U | 7 820.64 | B/P |
| 41.5 | B02BD02 | koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem | parent. | 500.00 | U | 9 263.30 | B/P |

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog: a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII, b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek), c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII, d) u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru VIII, je indikován koagulační faktor VIII rekombinantní.

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-----|---|
| 88335 | HAEMATE P | inj sic 1x250ut+sol | AVN | D |
| 88336 | HAEMATE P | inj sic 1x500ut+sol | AVN | D |
| 88337 | HAEMATE P | inj sic 1x1ku+solv. | AVN | D |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--------|---|----------|-----|
| 42 | koagulační faktory (koagulační faktor IX) | | | | | | |
| 42.1 | B02BD04 | koagulační faktor IX (středně čištěný) | parent. | 350.00 | U | 3 284.67 | B/P |
| 42.2 | B02BD04 | koagulační faktor IX (vysoce čištěný) | parent. | 350.00 | U | 4 285.96 | B/P |
| 75079 | IMMUNINE 600 I.E. | inj sic 1x600ut+5ml | BXG | A | | | |
| 75080 | IMMUNINE 1200 I.E. | inj sic 1.2ku+10ml | BXG | A | | | |
| 42.3 | B02BD04 | koagulační faktor IX (rekombinantní) | parent. | 350 | U | 4 285.96 | B/P |

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog k prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, anebo u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII; u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru IX, je indikován koagulační faktor IX rekombinantní.

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|---------|--------|----|------------|-----|
| 3 | ostatní koagulační faktory | | | | | | |
| 43.1 | B02BD | srážecí faktory | parent. | 350.00 | U | 2 975.02 | X |
| 43.2 | B02BD01 | kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X | parent. | 350.00 | U | 3 091.66 | B/P |
| 75634 | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600I.U | injpsolqf 1x600ut+s | BXG | A | | | |
| 86657 | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 200I.U | injpsolqf 1x200ut+s | BXG | A | | | |
| 43.3 | B02BD03 | aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII | parent. | 10.00 | KU | 274 092.00 | B/P |

Léčbu aktivitu obcházejícího faktoru VIII ordinuje hematolog k léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

| | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|-----|---|
| 85676 | FEIBA TIM 4 500 J. | inf pso lqf 1x500ut | BXG | A |
| 85677 | FEIBA TIM 4 1000 J. | inf pso lqf 1x1ku | BXG | A |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|---------|--------|----|-----------|---|
| 43.4 | B02BD05 | koagulační faktor VII | parent. | 6.00 | KU | 87 982.20 | X |
| 43.5 | B02BD07 | koagulační faktor XIII | parent. | 350.00 | U | 2 975.02 | X |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------|---------|------|----|--------------|-----|
| 43.6 | B02BD08 | eptakog alfa (aktivovaný) | parent. | 2.50 | MU | 1 357 785.42 | B/P |
|------|---------|---------------------------|---------|------|----|--------------|-----|

Léčbu eptakogem alfa ordinuje hematolog k léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, které není prokazatelně zvládnutelné jiným léčivým přípravkem jakož i u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 44 | soli železa, perorální podání | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 44.1 | B03AA02 | fumarát železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 44.2 | B03AA02 | fumarát železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 2.98 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

00677 FERRONAT sus 1x100ml/3gm GNO CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 44.3 | B03AA03 | glukonát železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 44.4 | B03AA03 | glukonát železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 44.5 | B03AA05 | chlorid železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 44.6 | B03AA05 | chlorid železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 44.7 | B03AA07 | síran železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 44.8 | B03AA07 | síran železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 44.9 | B03AB | soli trojmocného železa (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 44.10 | B03AB02 | polymaltosum ferricum (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 2,28 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 44.11 | B03AB02 | polymaltosum ferricum (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 10.80 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

02946 MALTOFER por gtt sol 30 ml VII CH

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 45 | soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|
| 45.1 | B03AD | glukonat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
|------|-------|-------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|
| 45.2 | B03AD | chlorid železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
|------|-------|------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|
| 45.3 | B03AD02 | fumarat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|

89140 FERRETAB COMP. cps 30 LAR A

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--------------------|
| 45.4 | B03AD03 | síran železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--------------------|
| 45.5 | B03AD04 | polymaltosum ferricum /kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
|------|---------|---|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|--|
| 45.6 | B03AE01 | dvojnocné soli železa/kyselina | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|--|
| 45.7 | B03AE02 | dvojnocné soli železa/kyselina | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 45.8 | B03AE10 | fumarat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.9 | B03AE10 | glukonat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.10 | B03AE10 | chlorid železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.11 | B03AE10 | různé kombinace bez kyseliny listové | p.o. | 0.10 | GM | 2.30 | |

97402 SORBIFER DURULES tbl obd 50x100mg EGI H

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 45.12 | B03AE10 | síran železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.13 | B03AE10 | síran železnatý/serin -pevné lékové formy | p.o. | 0.10 | GM | 2.30 | |
| 45.14 | B03AE10 | síran železnatý/serin -tekuté lékové formy | p.o. | 0.10 | GM | 10.80 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 46 | soli železa, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 46.1 | B03AC02 | hydroxid železitý se sacharózou | parent. | 0.10 | GM | 31.47 | O |
|------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|

04084 FERRUM LEK I.M. inj sol50x2ml/100mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 46.2 | B03AC03 | komplex železo-sorbitol-citronová kyselina | parent. | 0.10 | GM | 25.56 | O |
| 46.3 | B03AC07 | glukonát železito-sodný | parent. | 0.10 | GM | 41.25 | O |

70425 FERRLECIT inj sol5x5ml/62.5mg AVT GB

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 47 | vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 47.1 | B03BA01 | cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.02 | MG | 0.51 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 47.2 | B03BA01 | cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.02 | MG | 0.20 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

92503 NEUROBENE inj 6x1ml/1000rg MCK D

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|------|-------|----|------|--|
| 47.3 | B03BB01 | kyselina listová | p.o. | 10.00 | MG | 1.39 | |
|------|---------|------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 48 | erythropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|-----|
| 48.1 | B03XA01 | erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetně | parent. | 1.00 | KU | 493.27 | K/P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|-----|

64814 NEORECORMON 500 IU inj sol6x0.3ml/500ut ROC D

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 48.2 | B03XA01 | erythropoetin více než 500 IU do 10 KU v jedné ampuli včetně | parent. | 1.00 | KU | 409.50 | K/P |
| 48.3 | B03XA01 | erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli | parent. | 1.00 | KU | 387.00 | K/P |

26714 NEORECORMON 60 000 IU inj pso lqf 3x1mldv RRG GB

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 48.4 | B03XA02 | darbepoetin do 50 mikrogramů v ampuli včetně | parent. | 5.00 | RG | 409.50 | K/P |
| 48.5 | B03XA02 | darbepoetin nad 50 mikrogramů v ampuli | parent. | 5.00 | RG | 387.00 | K/P |

Léčbu erythropoetinem a darbepoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr k:

- a) léčbě klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
 b) k léčbě anémie u nemocných s aplastickou anémii, erythroblastofytou, myelodysplastickým syndromem a anémii po transplantaci kostní dřeně,
 c) k léčbě těžké anémie nezralých dětí.

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 49 | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-------|----|----------|---|
| 49.1 | B05AA01 | albumin | parent. | 20.00 | GM | 1 883.29 | B |
|------|---------|---------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|-----|---|
| 42144 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% | inf sol 1x10ml | GFO | E |
| 62470 | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO | inf sol 1x50ml 20% | BXG | A |
| 62471 | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO | inf sol 1x100ml 20% | BXG | A |
| 62472 | HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO | inj 1x250ml 5% | BXG | A |
| 97907 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% | inf sol 1x250ml | GFO | E |
| 97908 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% | inf sol 1x500ml | GFO | E |
| 97909 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% | inf sol 1x50ml | GFO | E |
| 97910 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% | inf sol 1x100ml | GFO | E |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 50 | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 50.1 | B05AA02 | ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady | parent. | 100.00 | ML | 952.16 | B |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------|---------|--------|----|--------|---|
| 50.2 | B05AA05 | dextran (koncentrace 10%) | parent. | 500.00 | ML | 185.84 | O |
|------|---------|---------------------------|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|---------|--------|----|--------|---|
| 50.3 | B05AA05 | dextran (koncentrace 6%) | parent. | 500.00 | ML | 108.80 | O |
|------|---------|--------------------------|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 50.4 | B05AA05 | dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku) | parent. | 500.00 | ML | 123.86 | O |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|---------|--------|----|--------|---|
| 50.5 | B05AA06 | želatinové přípravky | parent. | 500.00 | ML | 168.71 | O |
|------|---------|----------------------|---------|--------|----|--------|---|

56412 GELOFUSINE inf 1x500ml BME CH

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|--------|----|--------|---|
| 50.6 | B05AA07 | hydroxyethyl škrob | parent. | 500.00 | ML | 286.90 | O |
|------|---------|--------------------|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|----------------|---------------------|-----|---|
| 44431 | HEMOHES 6% | inf sol 1x500ml-pe | BMM | D |
| 55897 | HEMOHES 6% | inf sol10x500ml-pe | BMM | D |
| 01798 | SERAG-HAES 6% | inf sol1x500ml/30gm | SWS | D |
| 01894 | SERAG-HAES 10% | inf sol1x500ml/50gm | SWS | D |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 51 | parenterální výživa | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.1 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 38.76 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

31989 CLINIMIX N9G20E inf sol 4x2000ml BXF GB
 98240 AMINOPLASMAL 5% E inf 1x500ml BME D

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.2 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 47.42 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

31985 CLINIMIX N14G30E inf sol 4x2000ml BXF GB

31987 CLINIMIX N17G35E inf sol 4x2000ml BXF GB

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 51.3 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 70.48 | H |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

55971 SALVIAMIN 12.5 E

inf 1x1000ml

CTT F

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.4 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace nad 14%) | parent. | 100.00 | ML | 63.44 | H |
|------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

75521 AMINOPLASMAL 15% E

inf 1x1000ml

BME D

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 51.5 | B05BA02 | tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 173.20 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|

31526 SOYACAL 10%

inf eml 20x100ml

GFL E

49970 INTRALIPID 10 %

inf 1x100ml-sklo

FRK A

49956 INTRALIPID 10 %

inf 12x100ml-sklo

FRK A

49959 INTRALIPID 10 %

inf 1x100ml-vak

FRK A

49960 INTRALIPID 10 %

inf 10x100ml-vak

FRK A

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.6 | B05BA02 | tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 53.83 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

59154 IVELIP 10%

inf 6x1000ml

CTT F

49962 INTRALIPID 10 %

inf 12x500ml-vak

FRK A

49973 INTRALIPID 10 %

inf 12x500ml-sklo

FRK A

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 51.7 | B05BA02 | tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 196.40 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|

31529 SOYACAL 20%

inf eml 20x100ml

GFL E

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.8 | B05BA02 | tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 67.58 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

49971 INTRALIPID 20 %

inf 1x1000ml-sklo

FRK A

49972 INTRALIPID 20 %

inf 6x1000ml-sklo

FRK A

57247 INTRALIPID 20 %

inf 6x1000ml-sklo

FRK S

59157 IVELIP 20%

inf 12x500ml

CTT F

59158 IVELIP 20%

inf 6x1000ml

CTT F

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.9 | B05BA03 | fruktóza (koncentrace do 5% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 14.47 | H |
|------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 51.10 | B05BA03 | fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 15.54 | H |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.11 | B05BA03 | fruktóza (koncentrace nad 10%) | parent. | 100.00 | ML | 17.74 | H |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.12 | B05BA03 | glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 28.00 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

03433 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS

inf sol 20x100ml-sk

FKI I

31430 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS

inf sol 1x100ml-skl

FKI I

31431 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS

inf sol 49x100ml-sk

FKI I

43918 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA

inf 49x100ml-sklo

SFR I

59432 GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE

inf 1x100ml(vak)

BFF I

59436 GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE

inf 1x100ml(vak)

BFH E

92530 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA

inf 1x100ml-sklo

SFR I

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.13 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 12.71 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

31432 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS

inf sol 1x250ml-skl

FKI I

31433 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS

inf sol 16x250ml-sk

FKI I

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|---|
| 43919 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 16x250ml-sklo | SFR | I |
| 59433 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 59437 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 92531 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x250ml-sklo | SFR | I |
| 97735 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.14 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 6.04 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 47000 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | E |
| 47017 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | CH |
| 59419 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 71735 | INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 96877 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BMM | D |
| 97736 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 97737 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.15 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 5.82 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 31436 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-sk | FKI | I |
| 31439 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-pp | FKI | I |
| 31440 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol12x1000ml-pp | FKI | I |
| 31447 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-va | FKI | I |
| 31449 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x2000ml-va | FKI | I |
| 31450 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 4x2000ml-va | FKI | I |
| 43922 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 12x1000ml-pp | SFR | I |
| 47001 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x1000ml-pe | BME | E |
| 47018 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x1000ml-pe | BME | CH |
| 59434 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFF | I |
| 59438 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 92533 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x1000ml-sklo | SFR | I |
| 92535 | 10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x1000ml-pp | SFR | I |
| 92772 | INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 96878 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x1000ml-pe | BMM | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.16 | B05BA03 | glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 29.10 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|----------------------------|-------------|-----|---|
| 57750 | GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN | inf 1x100ml | HUA | H |
|-------|----------------------------|-------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.17 | B05BA03 | glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 6.46 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---|
| 59421 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 59422 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 86054 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 97738 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 51.18 | B05BA03 | glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 27.76 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| 03432 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x100ml-sk | FKI | I |
| 31451 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x100ml-skl | FKI | I |
| 31452 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 49x100ml-sk | FKI | I |
| 31462 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x100ml-vak | FKI | I |
| 31463 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 40x100ml-va | FKI | I |
| 43928 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 49x100ml-sklo | SFR | I |
| 46994 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-sklo | BME | E |
| 47011 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-sklo | BME | CH |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|---|
| 59413 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(vak) | BFH | E |
| 92519 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x100ml-sklo | SFR | I |
| 96871 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-sklo | BMM | D |
| 97728 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(sklo) | BFF | I |
| 97731 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(vak) | BFF | I |
| 98886 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 50x100ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 51.19 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 12.90 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----|----|
| 31453 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x250ml-skl | FKI | I |
| 31454 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 16x250ml-sk | FKI | I |
| 31464 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x250ml-vak | FKI | I |
| 31465 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 30x250ml-va | FKI | I |
| 43929 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 16x250ml-sklo | SFR | I |
| 46995 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x250ml-pe | BME | E |
| 47012 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x250ml-pe | BME | CH |
| 59414 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 62372 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | inf 1x250ml(sklo) | IMA | SK |
| 66866 | INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA | inf sol 1x250ml-sklo | IHO | CZ |
| 92520 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x250ml-sklo | SFR | I |
| 96872 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x250ml-pe | BMM | D |
| 97729 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |
| 97732 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 98893 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 35x150ml | BFH | E |
| 98894 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 30x250ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.20 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 6.89 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| 31455 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-skl | FKI | I |
| 31456 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 12x500ml-sk | FKI | I |
| 31458 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-pp | FKI | I |
| 31459 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x500ml-pp | FKI | I |
| 31466 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-vak | FKI | I |
| 31467 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x500ml-va | FKI | I |
| 43930 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 12x500ml-sklo | SFR | I |
| 43931 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 20x500ml-pp | SFR | I |
| 46996 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | E |
| 47013 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | CH |
| 59415 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 71734 | INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 92521 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x500ml-sklo | SFR | I |
| 92523 | 5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA | inf 1x500ml-pp | SFR | I |
| 96873 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BMM | D |
| 97730 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 97733 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 98901 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 20x500ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.21 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 3.96 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|---|
| 31470 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x2000ml-va | FKI | I |
| 31471 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 4x2000ml-va | FKI | I |
| 59416 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 97734 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFF | I |
| 98902 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 10x1000ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.22 | B05BA03 | glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | ML | 23.90 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

47241 GLUKÓZA 5 BRAUN inf 20x10ml-pla.amp BMM D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.23 | B05BA03 | glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | ML | 83.15 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

02587 GLUKÓZA 40 BRAUN inf 20x10ml-pla.amp BMM D

02588 GLUKÓZA 40 BRAUN inf 20x10ml-pla.amp BME E

02589 GLUKÓZA 40 BRAUN inf 20x10ml-pla.amp BME CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.24 | B05BA03 | glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | ML | 98.74 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.25 | B05BA03 | glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 31.97 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

55628 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x100ml IMA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.26 | B05BA03 | glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 18.18 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

55630 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x250ml IMA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.27 | B05BA03 | glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 8.26 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|------|---|
| 51.28 | B05BA03 | sorbitol (koncentrace do 5% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 7.66 | H |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.29 | B05BA03 | sorbitol (koncentrace nad 10%) | parent. | 100.00 | ML | 11.10 | H |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.30 | B05BA03 | sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 8.14 | H |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.31 | B05BA03 | xylitol (koncentrace do 5% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 16.62 | H |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.32 | B05BA03 | xylitol (koncentrace nad 5%) | parent. | 100.00 | ML | 22.83 | H |
|-------|---------|------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.33 | B05BA10 | kombinace bez obsahu aminokyselin | parent. | 100.00 | ML | 13.20 | H |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.34 | B05BA10 | kombinace s obsahem aminokyselin | parent. | 100.00 | ML | 55.76 | H |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

02452 NUTRIFLEX SPECIAL inf 5x1000ml BMB CH

02453 NUTRIFLEX SPECIAL inf 5x1500ml BMB CH

02454 NUTRIFLEX PERI inf 5x1000ml BMB CH

02455 NUTRIFLEX PERI inf 5x2000ml BMB CH

02458 NUTRIFLEX PLUS inf 5x1000ml BMB CH

02459 NUTRIFLEX PLUS inf 5x2000ml BMB CH

02460 NUTRIFLEX BASAL inf 5x1000ml BMB CH

02461 NUTRIFLEX BASAL inf 5x2000ml BMB CH

32599 OLICLINOMEL N4-550E inf eml 4x2000ml BXI B

40178 AMINOPLASMAL 10% E inf 1x1000ml BME D

42557 OLICLINOMEL N5-800E inf eml 6x1000ml BXI B

46804 CLINOMEL N4-550 inf 4x2000ml pe vak CTT F

46805 CLINOMEL N4-550 inf 4x1500ml pe vak CTT F

46807 CLINOMEL N5-800 inf 4x2000ml pe vak CTT F

46808 CLINOMEL N5-800 inf 4x1500ml pe vak CTT F

46810 CLINOMEL N6-900 inf 4x2000ml pe vak CTT F

46811 CLINOMEL N6-900 inf 4x1500ml pe vak CTT F

46813 CLINOMEL N7-1000 inf 4x2000ml pe vak CTT F

46814 CLINOMEL N7-1000 inf 4x1500ml pe vak CTT F

| | | | | |
|-------|----------------------|---------------------|-----|---|
| 47479 | CLINOMEL N5-800 | inf 2x2500ml pe vak | CTT | F |
| 47480 | CLINOMEL N7-1000 | inf 2x2500ml pe vak | CTT | F |
| 47481 | CLINOMEL N6-900 | inf 2x2500ml pe vak | CTT | F |
| 47482 | CLINOMEL N4-550 | inf 2x2500ml pe vak | CTT | F |
| 95637 | NUTRIFLEX LIPID PLUS | inf eml 5x1875ml | BMM | D |
| 95638 | NUTRIFLEX LIPID PLUS | inf eml 5x2500ml | BMM | D |
| 95640 | NUTRIFLEX LIPID PERI | inf eml 5x1875ml | BMM | D |
| 95641 | NUTRIFLEX LIPID PERI | inf eml 5x2500ml | BMM | D |
| 98053 | OLICLINOMEL N4-550E | inf eml 4x2000ml | CTT | F |
| 98055 | OLICLINOMEL N5-800E | inf eml 6x1000ml | CTT | F |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 52 | intravenozní roztoky fysiologického roztoku | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 52.1 | B05BB | roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů | parent. | 100.00 | ML | 10.46 | H |
|------|-------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|--------|----|------|---|
| 52.2 | B05BB01 | elektrolyty | parent. | 100.00 | ML | 8.07 | H |
|------|---------|-------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 05860 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x3000ml(vak) | INK | CZ |
| 05869 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x5000ml(vak) | INK | CZ |
| 05870 | INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1 | inf 1x5000ml(vak) | INK | CZ |
| 11222 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x1000ml-vak | FKI | I |
| 11305 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 10x1000ml-vak | FKI | I |
| 11323 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x500ml-sklo | FKI | I |
| 11328 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x1000ml-sklo | FKI | I |
| 11376 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 12x500ml-sklo | FKI | I |
| 11380 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 12x1000ml-sklo | FKI | I |
| 21291 | INFUSIO DARROWI INFUSIA | inf 1x1000ml-vak | IHO | CZ |
| 21329 | INFUSIO HARTMANNI INFUSIA | inf 1x1000ml-vak | IHO | CZ |
| 44100 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 1x500ml-plast | BMM | D |
| 44101 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 1x1000ml-plast | BMM | D |
| 44102 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 10x500ml-plast | BMM | D |
| 44103 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 10x1000ml-plast | BMM | D |
| 49995 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol10x1000ml | FRE | D |
| 49996 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 10x1000 ml | FRE | D |
| 55616 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 55617 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 59357 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x500ml(Idpe) | BMM | D |
| 59358 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x1000ml(Idpe) | BMM | D |
| 59361 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x500ml(Idpe) | BME | E |
| 59362 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x1000ml(Idpe) | BME | E |
| 59365 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x500ml(Idpe) | BME | CH |
| 59366 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x1000ml(Idpe) | BME | CH |
| 59374 | RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 66833 | PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL. | inf 1x1000ml | BXF | GB |
| 69235 | RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 70524 | INFUSIO HARTMANNI MEDICAM.H1/1 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 70527 | INFUSIO DARROWI MEDICAMEN.D1/1 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 70529 | INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAR1/1 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 70530 | INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 72793 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |
| 83946 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x500ml(vak) | INK | CZ |
| 85578 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 89861 | INFUSIO RINGERI INFUSIA | inf 1x500ml-sklo | IHO | CZ |
| 89864 | INFUSIO RINGERI INFUSIA | inf 1x1000ml-vak | IHO | CZ |
| 92580 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 92581 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 92775 | INFUSIO DARROWI MEDIEKOS D1/1 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 92777 | INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1 | inf 1x1000ml(vak) | INK | CZ |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 92778 | INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 92801 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x1000ml(vak) | INK | CZ |
| 92802 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 93527 | ARDEAELYTOSOL R 1/1 | inf 1x500ml | ARD | CZ |
| 95569 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x1000ml-pe | FKI | I |
| 95571 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 12x1000ml-pe | FKI | I |
| 95758 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 6x1000ml | FRF | F |
| 95782 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol20x500ml | FRE | D |
| 95787 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol1x1000ml | FRE | D |
| 95788 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol1x1000ml | FRE | D |
| 95789 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FRE | D |
| 95790 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FRE | D |
| 95791 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol1x1000ml | FRF | F |
| 95792 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FRF | F |
| 95793 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FKI | I |
| 95794 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 6x1000ml | FKI | I |
| 95795 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol10x1000ml | FRF | F |
| 95796 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol10x1000ml | FRE | D |
| 95797 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol10x1000ml | FRE | D |
| 95798 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 8x1000ml | FRE | D |
| 95799 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol8x1000ml | FRE | D |
| 99168 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 52.3 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | ML | 39.65 | O |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.4 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (do 100 ml včetně v balení) | parent. | 100.00 | ML | 21.08 | O |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 46065 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | inf sol 1x100ml-sk | BMR | E |
| 46075 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | inf sol1x100ml-skl | BME | CH |
| 50973 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN | inf sol1x100mlpelah | BMR | E |
| 51246 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN | infsol1x100ml-pelah | BME | CH |
| 51365 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN | infsol1x100ml-pelah | BMM | D |
| 57681 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x100ml(vak ii) | BFH | E |
| 96882 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | inf sol 1x100ml-sk | BMM | D |
| 97748 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x100ml(sklo) | BFF | I |
| 97751 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x100ml(vak ii) | BFF | I |
| 98864 | FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO | inf sol 50x100ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 52.5 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně) | parent. | 100.00 | ML | 7.40 | O |
|------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 57683 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(vak ii) | BFH | E |
| 97749 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |
| 97752 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(vak ii) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 52.6 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení) | parent. | 100.00 | ML | 3.77 | O |
|------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----|----|
| 03122 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak i) | BFH | E |
| 03124 | SODIUM CHLORIDE 0.9%WV I.V.INF | inf 1x1500ml(vak i) | BFF | I |
| 03126 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak i) | BFH | E |
| 03127 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak i) | BFF | I |
| 31500 | 0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS | inf sol1x2000ml-vak | FKI | I |
| 31501 | 0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS | inf sol4x2000ml-vak | FKI | I |
| 46067 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x1000mlpelah | BMR | E |
| 46077 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x1000mlpelah | BME | CH |
| 57672 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1500ml(vak ii) | BFH | E |
| 57673 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak ii) | BFH | E |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----|----|
| 57685 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x500ml(vak ii) | BFH | E |
| 57687 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak ii) | BFH | E |
| 69180 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1500ml(vak ii) | BFF | I |
| 69181 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak ii) | BFF | I |
| 75611 | 0.9% SODIUM CHLOR.I.V.BP BAXTER | inf 1x1000ml(vak) | BXF | GB |
| 92585 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 96885 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x1000mlpelah | BMM | D |
| 97753 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x500ml(vak ii) | BFF | I |
| 97754 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak ii) | BFF | I |
| 98880 | FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO | inf sol 10x1000ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|---------|--------|----|------|---|
| 52.7 | B05BB02 | elektrolyty se sacharidy | parent. | 100.00 | ML | 9.04 | H |
|------|---------|--------------------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 56702 | INFUSIO F 1/2 INFUSIA | inf 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 56706 | INFUSIO R 1/2 INFUSIA | inf 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 62369 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |
| 69660 | ARDEAELYTOSOL F 1/2 | inf 1x500ml | ARD | CZ |
| 71732 | INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 71733 | INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 85566 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 92624 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 92625 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---|
| 52.8 | B05BB03 | trometamol | parent. | 100.00 | ML | 23.02 | H |
|------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 52.9 | B05BC01 | mannitol (koncentrace do 10% včetně, doplněná na 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 19.31 | H |
|------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|-----|----|
| 46026 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 74983 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 80494 | INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM | inf sol 1x250ml | MVM | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 52.10 | B05BC01 | mannitol (koncentrace do 10% včetně, doplněná nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 12.17 | H |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|----|
| 46027 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 71727 | INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 74984 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 75517 | INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.11 | B05BC01 | mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 21.70 | H |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 31475 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 1x250ml-sklo | FKI | I |
| 31476 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 16x250ml-sklo | FKI | I |
| 59741 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 59742 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 80497 | INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM | inf sol 1x250ml | MVM | CZ |
| 97745 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.12 | B05BC01 | mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 13.78 | H |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 31477 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 1x500ml-sklo | FKI | I |
| 31478 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 12x500ml-sklo | FKI | I |
| 31479 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 1x1000ml-sklo | FKI | I |
| 31480 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 6x1000ml-sklo | FKI | I |
| 46025 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 59743 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 71728 | INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|---|
| 97746 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 97747 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|
| 52.13 | B05BC02 | karbamid | parent. | 90.00 | GM | 1 133.11 | H |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 53 | ostatní intravenezní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|----------|----|-------|---|
| 53.1 | B05CB01 | chlorid sodný | lok. | 1 000.00 | ML | 37.29 | H |
|------|---------|---------------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|----------|----|-------|---|
| 53.2 | B05CX02 | sorbitol | lok. | 1 000.00 | ML | 37.29 | H |
|------|---------|----------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|------|----------|----|-------|---|
| 53.3 | B05CX03 | glycin | lok. | 1 000.00 | ML | 54.04 | H |
|------|---------|--------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|------|----------|----|-------|---|
| 53.4 | B05CX10 | kombinované roztoky k irrigaci | lok. | 1 000.00 | ML | 54.04 | H |
|------|---------|--------------------------------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|---------|----------|----|--------|---|
| 53.5 | B05DA | přípravky pro peritoneální dialýzu isotonické | parent. | 1 000.00 | ML | 138.04 | H |
|------|-------|--|---------|----------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|---------|----------|----|--------|---|
| 53.6 | B05DB | přípravky pro peritoneální dialýzu hypertonické | parent. | 1 000.00 | ML | 138.04 | H |
|------|-------|--|---------|----------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 01184 | GAMBROSOL TRIO 10 | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 01186 | GAMBROSOL TRIO 10 | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 01215 | GAMBROSOL TRIO 40 | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 01218 | GAMBROSOL TRIO 40 | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 03208 | CAPD/DPCA 17 | sol1x2000ml-stay | FMC | D |
| 03209 | CAPD/DPCA 18 | sol1x2000ml-stay | FMC | D |
| 03210 | CAPD/DPCA 19 | sol1x2000ml-stay | FMC | D |
| 21574 | CAPD/DPCA 2 | sol 6x1500ml-stay | FMC | D |
| 21577 | CAPD/DPCA 3 | sol 6x1500ml-stay | FMC | D |
| 21582 | CAPD/DPCA 4 | sol 6x1500ml-stay | FMC | D |
| 30828 | CAPD/DPCA 2 BALANCE | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 30848 | CAPD/DPCA 3 BALANCE | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 30852 | CAPD/DPCA 4 BALANCE | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 45632 | GAMBROSOL 10 H | sol 6x1500ml(sy10) | BJS | I |
| 45638 | GAMBROSOL 10 H | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 45640 | GAMBROSOL 10 H | sol 2x4500ml(sy10) | BJS | I |
| 45645 | GAMBROSOL 10 H | sol 4x2500ml(ge10) | BJS | I |
| 45668 | GAMBROSOL 10 M | sol 6x1500ml(sy10) | BJS | I |
| 45672 | GAMBROSOL 10 M | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 45674 | GAMBROSOL 10 M | sol 2x4500ml(sy10) | BJS | I |
| 45677 | GAMBROSOL 10 M | sol 4x2500ml(ge10) | BJS | I |
| 45700 | GAMBROSOL 10 L | sol 6x1500ml(sy10) | BJS | I |
| 45704 | GAMBROSOL 10 L | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 45706 | GAMBROSOL 10 L | sol 2x4500ml(sy10) | BJS | I |
| 45711 | GAMBROSOL 10 L | sol 4x2500ml(ge10) | BJS | I |
| 46906 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46907 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46909 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46914 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46916 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46918 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46924 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46925 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46927 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 47900 | CAPD/DPCA 19 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 47908 | CAPD/DPCA 18 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 47941 | CAPD/DPCA 17 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 52992 | PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA | sol 4x2000ml | BFF | I |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 52993 | PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA | sol 4x2500ml | BFF | I |
| 52994 | PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA | sol 4x2000ml(vak) | BFF | I |
| 52995 | PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA | sol 4x2500ml(vak) | BFF | I |
| 59059 | NUTRINEAL PD4 WITH 1.1%AMINOAC. | dip prn sol4x2500ml | BXI | IRL |
| 65936 | GAMBROSOL 10 M | sol 3x3000ml(ge10) | BJS | I |
| 65937 | GAMBROSOL 10 M | sol 5x2000ml(ge10) | BJS | I |
| 65946 | GAMBROSOL 10 M | sol 3x3000ml(sy10) | BJS | I |
| 65949 | GAMBROSOL 10 M | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I |
| 65950 | GAMBROSOL 10 M | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 65956 | GAMBROSOL 10 L | sol 3x3000ml(sy10) | BJS | I |
| 65959 | GAMBROSOL 10 L | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 65962 | GAMBROSOL 10 L | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I |
| 65963 | GAMBROSOL 10 L | sol 5x2000ml(ge10) | BJS | I |
| 65967 | GAMBROSOL 10 L | sol 3x3000ml(ge10) | BJS | I |
| 68321 | GAMBROSOL 10 H | sol 3x3000ml(sy10) | BJS | I |
| 68460 | GAMBROSOL 10 H | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I |
| 68515 | GAMBROSOL 10 H | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 69183 | PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 1.5% | sol 5000ml(vak-Šr.) | BFF | I |
| 69304 | GAMBROSOL 10 H | sol 5x2000ml(ge10) | BJS | I |
| 69318 | GAMBROSOL 10 H | sol 3x3000ml(ge10) | BJS | I |
| 76613 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76614 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 76616 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76622 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76623 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 76625 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76631 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76632 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 76634 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 81204 | CAPD/DPCA 2 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 81337 | CAPD/DPCA 4 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 85924 | PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF 2.5% | sol 5000ml(vak-Šr.) | BFF | I |
| 85926 | PERITON.DIAL.SOL+DEXT.BFF4.25% | sol 5000ml(vak-Šr.) | BFF | I |
| 95424 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 95425 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 95426 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95427 | CAPD/DPCA 2 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95428 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x1500ml-stand | FMC | D |
| 95429 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x2000ml-stand | FMC | D |
| 95430 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x2500ml-stand | FMC | D |
| 95431 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x5000ml-stand | FMC | D |
| 95432 | CAPD/DPCA 3 | sol 2x5000ml-stand | FMC | D |
| 95433 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2000ml-stand | FMC | D |
| 95435 | CAPD/DPCA 3 | sol 6x1500ml-stand | FMC | D |
| 95437 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x2000ml-andy | FMC | D |
| 95438 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x2500ml-andy | FMC | D |
| 95442 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2000ml-andy | FMC | D |
| 95443 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2500ml-andy | FMC | D |
| 95445 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x2000ml-stay | FMC | D |
| 95446 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x2500ml-stay | FMC | D |
| 95447 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x3000ml-stay | FMC | D |
| 95487 | CAPD/DPCA 3 | sol 3x3000ml-stay | FMC | D |
| 95489 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 95490 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 95491 | CAPD/DPCA 3 | sol 1x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95492 | CAPD/DPCA 3 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95494 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x2000ml-stand | FMC | D |
| 95495 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x2500ml-stand | FMC | D |

| | | | | |
|-------|---------------------|--------------------|-----|---|
| 95496 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x5000ml-stand | FMC | D |
| 95497 | CAPD/DPCA 4 | sol 2x5000ml-stand | FMC | D |
| 95498 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2000ml-stand | FMC | D |
| 95499 | CAPD/DPCA 4 | sol 6x1500ml-stand | FMC | D |
| 95501 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x2000ml-andy | FMC | D |
| 95502 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x2500ml-andy | FMC | D |
| 95506 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2000ml-andy | FMC | D |
| 95507 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2500ml-andy | FMC | D |
| 95509 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x2000ml-stay | FMC | D |
| 95510 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x2500ml-stay | FMC | D |
| 95511 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x3000ml-stay | FMC | D |
| 95512 | CAPD/DPCA 4 | sol 3x3000ml-stay | FMC | D |
| 95514 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 95515 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 95516 | CAPD/DPCA 4 | sol 1x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95517 | CAPD/DPCA 4 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 96072 | CAPD/DPCA 3 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 97353 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x2000ml-stand | FMC | D |
| 97355 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x5000ml-stand | FMC | D |
| 97356 | CAPD/DPCA 2 | sol 2x5000ml-stand | FMC | D |
| 97357 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2000ml-stand | FMC | D |
| 97359 | CAPD/DPCA 2 | sol 6x1500ml-stand | FMC | D |
| 97361 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x2000ml-andy | FMC | D |
| 97362 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x2500ml-andy | FMC | D |
| 97366 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2000ml-andy | FMC | D |
| 97367 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2500ml-andy | FMC | D |
| 97369 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x2000ml-stay | FMC | D |
| 97370 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x2500ml-stay | FMC | D |
| 97371 | CAPD/DPCA 2 | sol 1x3000ml-stay | FMC | D |
| 97372 | CAPD/DPCA 2 | sol 3x3000ml-stay | FMC | D |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 54 | aditiva k intravenezným roztokům | | | | | | |
| 54.1 | B05XA01 | chlorid draselný (koncentrace 7,45%) | parent. | 100.00 | ML | 17.40 | H |
| 54.2 | B05XA02 | hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | ML | 124.74 | O |
| 54.3 | B05XA02 | hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | ML | 10.65 | O |
| 54.4 | B05XA03 | chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně) | parent | 100.00 | ML | 20.30 | H |
| 44171 | CHLORID SODNY 5.85% BRAUN | inf 1x100ml | | BME | D | | |
| 54.5 | B05XA03 | chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%) | parent. | 100.00 | ML | 18.55 | H |
| 54.6 | B05XA04 | chlorid amonný | parent. | 100.00 | ML | 11.68 | H |
| 54.7 | B05XA06 | fosforečnan draselný, vč. kombinací | parent. | 100.00 | ML | 52.35 | H |
| 54.8 | B05XA30 | kombinace elektrolytů (stopové prvky) | parent. | 10.00 | ML | 12.46 | H |
| 10285 | UNIEL INFUSIA | inf sol 100ml | | IHO | CZ | | |
| 10286 | UNIEL INFUSIA | inf sol 250ml | | IHO | CZ | | |
| 54.9 | B05XA31 | elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy | parent. | 100.00 | ML | 33.26 | H |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|--------|---|
| 54.10 | B05XB01 | chlorid argininu (koncentrace 21%) | parent. | 100.00 | ML | 233.08 | H |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|--------|---|

86797 ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21% inf 1x200ml ARD CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|------|---|
| 54.11 | B05XB02 | alanylglutamin | parent. | 1.00 | ML | 4.39 | H |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|------|----|-------|---|
| 54.12 | B05XC | vitaminy | parent. | 1.00 | DF | 43.99 | H |
|-------|-------|----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|---------|--------|----|------|---|
| 54.13 | B05XX | ostatní i.v. roztoky | parent. | 100.00 | ML | 7.63 | H |
|-------|-------|----------------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------------|------|----------|----|-------|---|
| 55.1 | B05Z | hemodialytika a hemofiltráty | lok. | 1 000.00 | ML | 94.50 | H |
|------|------|------------------------------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------|------|----------|----|--------|---|
| 55.2 | B05ZA | hemodialytika, koncentráty | lok. | 1 000.00 | ML | 125.72 | H |
|------|-------|----------------------------|------|----------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|------|----------|----|-------|---|
| 55.3 | B05ZB | hemofiltráty | lok. | 1 000.00 | ML | 94.50 | H |
|------|-------|--------------|------|----------|----|-------|---|

89174 SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 sol 1x5000ml BFF I

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 56 | srdeční glykosidy | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 56.1 | C01AA02 | acetyldigoxin | p.o. | 0.50 | MG | 1.03 | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 56.2 | C01AA04 | digitoxin | p.o. | 0.10 | MG | 1.03 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|------|------|----|------|--|
| 56.3 | C01AA05 | digoxin | p.o. | 0.25 | MG | 1.27 | |
|------|---------|---------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|-----|--|----|--|--|
| 03542 | DIGOXIN 0.250 LÉČIVA | tbl 30x0.25mg | ZEH | | CZ | | |
|-------|----------------------|---------------|-----|--|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------------|-----|--|----|--|--|
| 00705 | DIGOXIN-GALENA | porgttsol1x10ml/5mg | IVX | | CZ | | |
|-------|----------------|---------------------|-----|--|----|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|------|----|------|--|
| 56.4 | C01AA05 | digoxin | parent. | 0.25 | MG | 7.32 | |
|------|---------|---------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 56.5 | C01AA08 | metildigoxin | p.o. | 0.20 | MG | 1.03 | |
|------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|------|----|------|--|
| 56.6 | C01AA08 | metildigoxin | parent. | 0.20 | MG | 6.99 | |
|------|---------|--------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|------|----|-------|--|
| 56.7 | C01AC01 | g-strofantin | parent. | 0.25 | MG | 23.46 | |
|------|---------|--------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 57 | antiarytmika třída I a III, perorální podání | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|------|-------|----|-------|--|
| 57.1 | C01BA | detajmii bitartras | p.o. | 75.00 | MG | 13.64 | |
|------|-------|--------------------|------|-------|----|-------|--|

23113 TACHMALCOR por tbl obd 50x25mg AWD D

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 57.2 | C01BA01 | chinidin (neretardované lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 10.80 | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 57.3 | C01BA01 | chinidin (retardované lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 17.40 | |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 57.4 | C01BA02 | prokainamid | p.o. | 3.00 | GM | 38.61 | |
|------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 57.5 | C01BA03 | disopyramid | p.o. | 0.40 | GM | 12.37 | |
|------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|
| 57.6 | C01BA08 | prajmalin | p.o. | 30.00 | MG | 10.80 | |
|------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 57.7 | C01BB02 | mexiletin | p.o. | 0.80 | GM | 9.41 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 57.8 | C01BB03 | tocainid | p.o. | 1.20 | GM | 10.22 | |
|------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 57.9 | C01BC03 | propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 17.16 | |
| 57.10 | C01BC03 | propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 5.40 | |
| 57.11 | C01BC03 | propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 6.40 | |
| 57.12 | C01BD01 | amiodaron | p.o. | 0.20 | GM | 4.00 | |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|-----|---|
| 59285 | AMIOHEXAL 200 | tbl 50x200mg | SFS | D |
| 59284 | AMIOHEXAL 200 | tbl 20x200mg | SFS | D |
| 59286 | AMIOHEXAL 200 | tbl 100x200mg | SFS | D |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 58 | antiarytmika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---------------|
| 58.1 | C01B | ipratropium | parent. | 3.00 | MG | 782.94 | O |
| 58.2 | C01BA02 | prokainamid | parent. | 3.00 | GM | 251.87 | O |
| 58.3 | C01BA03 | disopyramid | parent. | 0.40 | GM | 251.87 | O |
| 58.4 | C01BA05 | ajmalin | parent. | 0.30 | GM | 251.87 | O |
| 58.5 | C01BB01 | lidokain | parent. | 1.00 | ML | 1.22 | O/INT,KAR,GER |
| 58.6 | C01BB02 | mexiletin | parent. | 0.80 | GM | 351.64 | O/INT,KAR,GER |
| 58.7 | C01BB03 | tocainid | parent. | 1.20 | GM | 351.64 | O/INT,KAR,GER |
| 58.8 | C01BC03 | propafenon | parent. | 0.30 | GM | 174.00 | O/INT,KAR,GER |
| 58.9 | C01BC07 | lorcainid | parent. | 0.20 | GM | 139.01 | O/INT,KAR,GER |
| 58.10 | C01BD01 | amiodaron | parent. | 0.20 | GM | 19.28 | O/INT,KAR,GER |

59659 AMIOKORDIN inj sol 5x3ml/150mg KRK SLO
 96600 SEDACORON inj sol 5x3ml/150mg EBP A

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|--------|----|--------|---------------|
| 58.11 | C01BD02 | bretylum tosilát | parent. | 100.00 | MG | 139.01 | O/INT,KAR,GER |
|-------|---------|------------------|---------|--------|----|--------|---------------|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 59 | adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 59.1 | C01CA | ipratropium | p.o. | 30.00 | MG | 53.77 | |
| 59.2 | C01CA02 | isoprenalin | parent. | 90.00 | MG | 15 620.16 | H |
| 59.3 | C01CA03 | norepinefrin | parent. | 6.00 | MG | 80.34 | O |

00536 NORADRENALIN LÉČIVA inj 5x1ml/1mg LEX CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|
| 59.4 | C01CA04 | dopamin | parent. | 0.50 | GM | 114.50 | O |
| 59.5 | C01CA05 | norfenefrin | parent. | 25.00 | MG | 23.76 | H |
| 59.6 | C01CA07 | dobutamin | parent. | 0.50 | GM | 324.00 | H |
| 59.7 | C01CA09 | metaraminol | parent. | 50.00 | MG | 191.26 | H |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|----------|---|
| 59.8 | C01CA10 | metoxamin | parent. | 30.00 | MG | 40.91 | H |
| 59.9 | C01CA11 | mepentermin | parent. | 30.00 | MG | 101.67 | H |
| 59.10 | C01CA14 | dopexamin | parent. | 500.00 | MG | 109.39 | H |
| 59.11 | C01CA17 | midodrin | parent. | 7.50 | MG | 83.44 | H |
| 59.12 | C01CA24 | epinefrin | parent. | 0.50 | MG | 4.50 | O |
| 59.13 | C01CA24 | epinefrin (lékové formy autoinjektoru) | parent. | 1.00 | DF | 1 300.00 | P |

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog, klinický imunolog a pediatr u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergii na hmyzí bodnutí.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|
| 59.14 | C01CE01 | amrinon | parent. | 0.50 | GM | 4 059.95 | H |
| 59.15 | C01CE02 | milrinon | parent. | 50.00 | MG | 3 980.00 | H |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 60 | vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.1 | C01DA02 | glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě p.o. včetně, lékové formy tablet) | p.o. | 5.00 | MG | 2.00 | |
| 60.2 | C01DA02 | glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě p.o. včetně, lékové formy tobolky s peletami) | p.o. | 5.00 | MG | 3.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|--|--|----------------------|-----|--|----|
| 13467 | NITROPELET 2.5 | | | por cps pro 30x2.5mg | ZEH | | SK |
| 13468 | NITROPELET 2.5 | | | por cps pro 30x2.5mg | ZEH | | SK |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.3 | C01DA02 | glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 5.00 | MG | 2.12 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.4 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 60.00 | MG | 3.50 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

47758 ISOPELET 20 por cps pro 30x20mg SLO SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.5 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy | p.o. | 60.00 | MG | 1.25 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.6 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy | p.o. | 60.00 | MG | 2.50 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|---------------------|-----|--|----|
| 47762 | ISOPELET 40 | | | por cps pro 30x40mg | ZEH | | SK |
| 47765 | ISOPELET 60 | | | por cps pro 20x60mg | ZEH | | SK |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.7 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě) | p.o. | 60.00 | MG | 4.20 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|--|------------------|-----|--|---|
| 91591 | CARDIKET RETARD 120 | | | cps ret 20x120mg | SWP | | D |
|-------|---------------------|--|--|------------------|-----|--|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 60.8 | C01DA14 | isosorbid mononitrát do 20 mg včetně | p.o. | 40.00 | MG | 2.44 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|---------------------|-----|--|---|
| 47687 | ISMIN AL 20 | | | por tbl nob100x20mg | APA | | D |
| 47686 | ISMIN AL 20 | | | por tbl nob 60x20mg | APA | | D |
| 47685 | ISMIN AL 20 | | | por tbl nob 30x20mg | APA | | D |
| 92568 | ISMN AL 20 | | | por tbl nob 60x20mg | APA | | D |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------------|-----|----|
| 59898 | ISMN AL 20 | por tbl nob 30x20mg | APA | D |
| 23305 | MONOSAN 20 MG | por tbl nob100x20mg | PMP | CZ |
| 96187 | MONOSAN 20 MG | por tbl nob 50x20mg | PMP | CZ |
| 76402 | SORBIMON 20 MG | tbl 100x20mg | MCK | D |
| 76401 | SORBIMON 20 MG | tbl 50x20mg | MCK | D |
| 76400 | SORBIMON 20 MG | tbl 20x20mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.9 | C01DA14 | isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 1.77 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|----------------|----------------------|-----|----|
| 21793 | MONOTAB SR | por tbl pro20x100mg | SLO | SK |
| 21794 | MONOTAB SR | por tbl pro50x100mg | SLO | SK |
| 21795 | MONOTAB SR | por tbl pro100x100mg | SLO | SK |
| 23306 | MONOSAN 40 MG | por tbl nob100x40mg | PMP | CZ |
| 47688 | ISMN AL 40 | por tbl nob 30x40mg | APA | D |
| 47689 | ISMN AL 40 | por tbl nob 60x40mg | APA | D |
| 47690 | ISMN AL 40 | por tbl nob100x40mg | APA | D |
| 59899 | ISMN AL 40 | por tbl nob 30x40mg | APA | D |
| 61469 | ISMN AL 40 | por tbl nob100x40mg | APA | D |
| 76403 | SORBIMON 40 MG | tbl 20x40mg | MCK | D |
| 76404 | SORBIMON 40 MG | tbl 50x40mg | MCK | D |
| 76405 | SORBIMON 40 MG | tbl 100x40mg | MCK | D |
| 92569 | ISMN AL 40 | por tbl nob 60x40mg | APA | D |
| 96188 | MONOSAN 40 MG | por tbl nob 50x40mg | PMP | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 60.10 | C01DX03 | oxifedrin | p.o. | 40.00 | MG | 4.79 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.11 | C01DX12 | molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 6.00 | MG | 4.25 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------|-----|---|
| 49553 | MOLSIHEXAL 2 MG | tbl 100x2mg | SFS | D |
|-------|-----------------|-------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.12 | C01DX12 | molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 6.00 | MG | 2.59 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------|-----|---|
| 49554 | MOLSIHEXAL 4 MG | tbl 100x4mg | SFS | D |
|-------|-----------------|-------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 60.13 | C01DX12 | molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 6.00 | MG | 1.48 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----|---|
| 49560 | MOLSIHEXAL RETARD | tbl ret 30x8mg | SFS | D |
|-------|-------------------|----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-----|---|
| 49559 | MOLSIHEXAL RETARD | tbl ret 100x8mg | SFS | D |
|-------|-------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 61 | vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 61.1 | C01DA02 | glycerol trinitrát | spr. | 5.00 | DF | 2.44 | |
|------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----|---|
| 60032 | MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY | ormspsprlg1x11.8gm | PDA | D |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|----------|------|----|------|--|
| 61.2 | C01DA02 | glycerol trinitrát | subling. | 2.50 | MG | 5.93 | |
|------|---------|--------------------|----------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|----------|-------|----|------|--|
| 61.3 | C01DA08 | isosorbid dinitrát | subling. | 20.00 | MG | 3.03 | |
|------|---------|--------------------|----------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 61.4 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci) | spr. | 20.00 | MG | 8.80 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 62 | prostaglandiny a jiná kardiaka | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|
| 62.1 | C01EA01 | alprostadil | parent. | 0.50 | MG | 2 800.00 | X |
|------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----|----------------------|
| 44169 | ALPROSTAPINT 500 MCG/ML | | | inf cnc sol 5x1ml | BGD | D |
| 62.2 | C01EA01 | alprostadil (vázaný na cyklodextrin) | parent. | 20.00 | RG | 570.85 X |
| 62.3 | C01EB10 | adenosin | parent. | 15.00 | MG | 679.10 O/INT,KAR,GER |
| 62.4 | C01EB15 | trimetazidin | p.o. | 40.00 | MG | 5.80 P |

Léčba trimetazidinem je indikována u nemocných s anginou pectoris, u kterých nevedla monoterapie nebo kombinace β -blokátorů s blokátory kalciového kanálu či s nitráty k uspokojivé kontrole výskytu stenokardii nebo u nemocných, u kterých nelze β -blokátor nebo vazodilatancia použít.

| | | | | | | |
|------|--|---|------|-------|----|-------|
| 63 | antihypertenziva – antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. Kombinaci s diuretiky, perorální podání | | | | | |
| 63.1 | C02AB01 | methyldopa (levotočivá) | p.o. | 1.00 | GM | 5.80 |
| 63.2 | C02AC01 | klonidin | p.o. | 0.45 | MG | 5.53 |
| 63.3 | C02AC02 | guanfacin | p.o. | 3.00 | MG | 5.53 |
| 63.4 | C02AC05 | moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně | p.o. | 0.30 | MG | 6.13 |
| 63.5 | C02AC05 | moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě | p.o. | 0.30 | MG | 5.53 |
| 63.6 | C02AC06 | rilmenidin | p.o. | 1.00 | MG | 5.53 |
| 63.7 | C02CA | metazosin | p.o. | 20.00 | MG | 5.53 |
| 63.8 | C02CA01 | prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 5.00 | MG | 12.59 |
| 63.9 | C02CA01 | prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě) | p.o. | 5.00 | MG | 3.35 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---|------|------------|-----|----------------------|
| 88173 | DEPRAZOLIN | | | tbl 30x2mg | LEX | CZ |
| 63.10 | C02CA06 | urapidil | p.o. | 50.00 | MG | 6.89 |
| 63.11 | C02DB01 | dihydralazin | p.o. | 75.00 | MG | 2.00 |
| 63.12 | C02DB03 | endralazin | p.o. | 10.00 | MG | 9.43 |
| 63.13 | C02DC01 | minoxidil | p.o. | 20.00 | MG | 20.14 L/INT,KAR, GER |
| 63.14 | C02LA51 | reserpin a diureтика | p.o. | 1.00 | DF | 1.63 |
| 63.15 | C02LB01 | methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | DF | 4.94 |
| 63.16 | C02LB01 | methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 2.00 | DF | 3.42 |
| 63.17 | C02KX01 | bosentan | p.o. | 250.00 | MG | 3 278.00 X |

| | | | | | | |
|-------|---|----------|---------|------------------|-----|----------|
| 64 | antihypertenziva, ostatní cesty aplikace | | | | | |
| 64.1 | C02AC01 | klonidin | parent. | 0.45 | MG | 70.66 H |
| 11823 | CATAPRESAN | | | inj 5x1ml/0.15mg | BOE | E |
| 64.2 | C02CA06 | urapidil | parent. | 50.00 | MG | 217.84 O |

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|---|
| 90763 | EBRANTIL I.V. 25 | inj sol 5x5ml/25mg | AKZ | D |
| 90765 | EBRANTIL I.V. 50 | inj sol 5x10ml/50mg | AKZ | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------|--------|----|--------|---|
| 64.3 | C02DA01 | diazoxid | parent. | 300.00 | MG | 214.62 | H |
| 64.4 | C02DB01 | dihydralazin | parent. | 25.00 | MG | 29.88 | H |
| 64.5 | C02DD01 | nitroprusid sodný | parent. | 50.00 | MG | 263.31 | H |

21221 NIPRUSS inf plv sol 5x60mg SWP D

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------|------|-------|----|------|--|
| 65 | diureтика s nižším diuretickým účinkem | | | | | | |
| 65.1 | C03AA03 | hydrochlorothiazid | p.o. | 25.00 | MG | 0.94 | |
| 65.2 | C03B | cikletanin | p.o. | 50.00 | MG | 1.03 | |
| 65.3 | C03BA | metipamid | p.o. | 2.50 | MG | 1.03 | |
| 65.4 | C03BA04 | chlortalidon | p.o. | 25.00 | MG | 0.61 | |
| 65.5 | C03BA10 | xipamid | p.o. | 20.00 | MG | 1.03 | |
| 65.6 | C03BA11 | indapamid | p.o. | 2.50 | MG | 1.12 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 46635 | INDAPAMID HF | tbl obd 30x2.5mg | HMF | YU | | | |
| 65.7 | C03BA11 | indapamid s řízeným uvolňováním | p.o. | 1.50 | MG | 1.12 | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|------|-------|----|------|--|
| 66 | diureтика s vysokým účinkem, perorální podání | | | | | | |
| 66.1 | C03CA01 | furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě) | p.o. | 40.00 | MG | 0.86 | |

| | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|-----|-----|
| 02079 | FUROSEMID-SLOVAKOFARMA | tbl 20x40mg | SLO | SK |
| 56347 | APO-FUROSEMIDE 40MG | tbl 100x40mg | APT | CND |
| 56802 | FURORESE 40 | tbl 20x40mg | FST | D |
| 56804 | FURORESE 40 | tbl 50x40mg | FST | D |
| 56805 | FURORESE 40 | tbl 100x40mg | FST | D |
| 96738 | APO-FUROSEMIDE 80MG | tbl 100x80mg | APT | CND |
| 98219 | FURON 40 MG | por tbl nob 50x40mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 66.2 | C03CA01 | furosemid (125 mg a více v jedné tabletě) | p.o. | 40.00 | MG | 0.68 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|-----|---|
| 56812 | FURORESE 250 | por tbl nob 100x250mg | FST | D |
| 56811 | FURORESE 250 | por tbl nob 50x250mg | FST | D |
| 56815 | FURORESE 500 | tbl 100x500mg | FST | D |
| 81498 | FUROSEMID AL 500 | por tbl nob 50x500mg | APA | D |
| 81499 | FUROSEMID AL 500 | por tbl nob 100x500mg | APA | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 66.3 | C03CA04 | torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 15.00 | MG | 0.88 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 66.4 | C03CA04 | torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 15.00 | MG | 0.68 | |
|------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 67 | diureтика s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 67.1 | C03C | kyselina etakrynová | parent. | 50.00 | MG | 543.63 | O |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|--------|-----|-------|---|
| 67.2 | C03CA01 | furosemid (125 mg a více v jedné ampuli) | parent. | 40.00 | MG | 7.36 | O |
| 56820 | FURORESE ROZTOK | | inf 25x25ml/250mg | PHH | | D | |
| 56819 | FURORESE ROZTOK | | inf 5x25ml/250mg | PHH | | D | |
| 67.3 | C03CA01 | furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli) | parent. | 40.00 | MG | 15.04 | O |
| 56818 | FURORESE 20 INJEKT | | inj 25x2ml/20mg | PHH | | D | |
| 56817 | FURORESE 20 INJEKT | | inj 5x2ml/20mg | PHH | | D | |
| 67.4 | C03CA04 | torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | MG | 16.03 | O |
| 67.5 | C03CA04 | torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | MG | 7.72 | O |
| 68 | diureтика šetřící draslík | | | | | | |
| 68.1 | C03DA01 | spironolakton | p.o. | 75.00 | MG | 4.60 | |
| 68.2 | C03DB01 | amilorid | p.o. | 10.00 | MG | 1.57 | |
| 87662 | AMICLARAN | | tbl 50x5mg | | SLO | SK | |
| 68.3 | C03DB02 | triamteren | p.o. | 100.00 | MG | 1.22 | |
| 69 | kombinace diuretik | | | | | | |
| 69.1 | C03EA01 | hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky | p.o. | 0.50 | DF | 0.50 | |
| 83718 | AMILORID/HCT AL | | tbl 50 | | APA | D | |
| 83718 | AMILORID/HCT AL | | tbl 100 | | APA | D | |
| 69.2 | C03EA06 | chlorthalidon a kalium šetřící látky | p.o. | 1.00 | DF | 1.10 | |
| 69.3 | C03EA14 | spironolakton/butizid | p.o. | 1.00 | DF | 9.78 | |
| 70 | periferní vazodilatancia, perorální podání | | | | | | |
| 70.1 | C04AC01 | kyselina nikotinová | p.o. | 0.20 | GM | 0.44 | |
| 70.2 | C04AD02 | xantinol nikotinát | p.o. | 0.90 | GM | 4.30 | |
| 70.3 | C04AD03 | pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 4.30 | |
| 70.4 | C04AD03 | pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 5.30 | |
| 47085 | PENTOMER RETARD 400 mg | | tbl ret 100x400 | | MCK | D | |
| 70.5 | C04AD03 | pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | GM | 6.00 | |
| 97702 | PENTOMER RETARD 600 mg | | tbl ret 100x400 | | MCK | D | |
| 70.6 | C04AD04 | etophyllin nikotinát | p.o. | 0.30 | GM | 1.65 | |
| 70.7 | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | p.o. | 3.00 | MG | 2.13 | |

91032 SECATOXIN FORTE

por gtt sol 1x25ml

IVX CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 70.8 | C04AE02 | nicergolin | p.o. | 30.00 | MG | 8.50 | |
| 70.9 | C04AE54 | dihydroergokristin, kombinace | p.o. | 2.00 | ML | 1.87 | |
| 70.10 | C04AX | jiná periferní vasodilatancia | p.o. | 3.00 | DF | 5.38 | |
| 70.11 | C04AX02 | fenoxybenzamin | p.o. | 30.00 | MG | 14.76 | |
| 70.12 | C04AX19 | sulkotidil | p.o. | 0.30 | GM | 5.38 | |
| 70.13 | C04AX20 | buflomedil | p.o. | 0.60 | GM | 5.38 | |
| 70.14 | C04AX21 | naftidofuryl | p.o. | 0.20 | GM | 4.73 | |

71 periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 71.1 | C04AC | olamin nikotinát | parent. | 0.90 | GM | 20.04 | |
| 71.2 | C04AB01 | fentolamin | parent. | 10.00 | MG | 20.82 | O |
| 71.3 | C04AB02 | tolazolin | parent. | 75.00 | MG | 87.00 | O |
| 71.4 | C04AD | etophyllin/theophyllin | parent. | 0.30 | GM | 11.11 | |

57351 OXANTIL

inj 5x2ml

HBS SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|------|----|-------|--|
| 71.5 | C04AD02 | xantinol nikotinát | parent. | 0.90 | GM | 4.25 | |
| 71.6 | C04AD03 | pentoxifylin | parent. | 0.30 | GM | 25.33 | |

| | | | | |
|-------|----------------------------|-------------------|-----|-----|
| 53200 | AGAPURIN | inj 5x5ml/100mg | ZEH | SK |
| 69241 | PENTILIN INJEKCE 100MG/5ML | inj 5x5ml/100mg | KRK | SLO |
| 43709 | TRENTAL | inf 10x15ml/300mg | HBS | SK |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 71.7 | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | parent. | 3.00 | MG | 69.21 | |
| 71.8 | C04AX | jiná periferní vasodilatancia | parent. | 2.00 | DF | 14.86 | |
| 71.9 | C04AX11 | bencyklan | parent. | 0.60 | GM | 51.52 | |
| 71.10 | C04AX21 | naftidofuryl | parent. | 0.20 | GM | 53.95 | |

72 vazoprotektiva a venofarmaka

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 72.1 | C05AD | přípravky obsahující lokální anestetikál (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.2 | C05AD | přípravky obsahující lokální anestetikál (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.81 | |
| 72.3 | C05AD01 | lidokain (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.4 | C05AD01 | lidokain (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.81 | |
| 72.5 | C05AD04 | cinchokain (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.6 | C05AD04 | cinchokain (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.84 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 72.7 | C05AX02 | bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 72.8 | C05AX02 | bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.78 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 72.9 | C05AX03 | jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 72.10 | C05AX03 | jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.78 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 72.11 | C05BA01 | organo-heparinoidy | lok. | 1.00 | GM | 0.87 | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|------|----|------|--|
| 72.12 | C05BA03 | heparin k zevnímu použití | lok. | 1.00 | GM | 0.87 | |
|-------|---------|---------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|-----|---|
| 86044 | HEPARIN AL GEL 30000 | gel 1x100gm | APA | D |
| 86042 | HEPARIN AL MAST 30000 | ung 1x100gm | APA | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 72.13 | C05BA53 | heparin, kombinace k zevnímu použití | lok. | 1.00 | GM | 0.87 | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 72.14 | C05BB02 | polidokanol (do 0,5% včetně) | parent. | 1.00 | ML | 13.96 | O |
|-------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------|------------|-----|---|
| 08512 | AETHOXYSKLEROL 0.5% | inj 1x30ml | KRS | D |
|-------|---------------------|------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 72.15 | C05BB02 | polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně) | parent. | 1.00 | ML | 16.06 | O |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|------------|-----|---|
| 20034 | AETHOXYSKLEROL 1% | inj 1x30ml | KRS | D |
|-------|-------------------|------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----|---|
| 20033 | AETHOXYSKLEROL 1% | inj 5x2ml | KRS | D |
|-------|-------------------|-----------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 72.16 | C05BB02 | polidokanol (nad 1% do 3 % včetně) | parent. | 1.00 | ML | 17.89 | O |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----|---|
| 08511 | AETHOXYSKLEROL 2% | inj 5x2ml | KRS | D |
| 02529 | AETHOXYSKLEROL 3% | inj 5x2ml | KRS | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 72.17 | C05BB02 | polidokanol (více než 3 %) | parent. | 1.00 | ML | 19.35 | O |
|-------|---------|----------------------------|---------|------|----|-------|---|

90799 AETHOXYSKLEROL 4% inj 5x2ml KRS D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 72.18 | C05BB04 | natrium tetradecyl sulfat (koncentrace do 1% včetně) | parent. | 1.00 | ML | 13.96 | O |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 72.19 | C05BB04 | natrium tetradecyl sulfat (koncentrace nad 1%) | parent. | 1.00 | ML | 19.64 | O |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 72.20 | C05BX01 | dobesilat vápenatý | p.o. | 0.75 | GM | 4.50 | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 72.21 | C05CA04 | troxerutin | p.o. | 3.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 72.22 | C05CA51 | rutosidy (kombinace, pevné lékové formy) | p.o. | 3.00 | DF | 1.30 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 72.23 | C05CA51 | rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 3.03 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 72.24 | C05CA53 | diosmin, kombinace | p.o. | 2.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 72.25 | C05CA54 | troxerutin, kombinace | p.o. | 2.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|-------|----|------|--|
| 72.26 | C05CX | jiné kapiláry stabilizující látky (escin) | p.o. | 60.00 | MG | 4,50 | |
|-------|-------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|-------|---|
| 72.27 | C05CX | jiné kapiláry stabilizující látky (escin) | parent. | 5.00 | MG | 54.26 | H |
|-------|-------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 72.28 | C05CX01 | tribenosid | p.o. | 0.80 | GM | 4.50 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 73 | neselektivní beta-blokátory, perorální podání | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|-------|----|------|--|
| 73.1 | C07AA | metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.78 | |
|------|-------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 73.2 | C07AA | metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.29 | |
|------|-------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|-------|----|------|--|
| 73.3 | C07AA | metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.66 | |
|------|-------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 73.4 | C07AA02 | oxprenolol | p.o. | 0.10 | GM | 2.74 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|-------|----|------|--|
| 73.5 | C07AA03 | pindolol | p.o. | 15.00 | MG | 2.74 | |
|------|---------|----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 73.6 | C07AA05 | propranolol | p.o. | 0.16 | GM | 2.74 | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|------|------|----|------|-----------------|
| 73.7 | C07AA07 | sotalol | p.o. | 0.16 | GM | 4.75 | L/KAR, INT, GER |
|------|---------|---------|------|------|----|------|-----------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-----|---|--|--|--|
| 83481 | SOTAHEXAL 160 | tbl 20x160mg | HEX | D | | | |
| 83670 | SOTAHEXAL 160 | tbl 50x160mg | HEX | D | | | |
| 83480 | SOTAHEXAL 80 | tbl 20x80mg | HEX | D | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|------|------|----|------|--|
| 73.8 | C07AA12 | nadolol | p.o. | 0.16 | GM | 2.74 | |
|------|---------|---------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 73.9 | C07AA16 | tertatolol | p.o. | 5.00 | MG | 2.74 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 73.10 | C07AA17 | bopindolol | p.o. | 1.00 | MG | 2.74 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 73.11 | C07AA23 | penbutolol | p.o. | 40.00 | MG | 2.74 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 73.12 | C07AA27 | kloranolol | p.o. | 20.00 | MG | 2.74 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 74 | selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorální podání | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 74.1 | C07AB02 | metoprolol - retardované lékové formy | p.o. | 0.15 | GM | 3.00 | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|---|--|--|--|
| 32673 | METOPROLOL AL 200 RETARD | por tbl pro50x200mg | APA | D | | | |
| 47501 | METOPROLOL AL 200 RETARD | por tbipro100x200mg | APA | D | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 74.2 | C07AB02 | metoprolol (do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 2.64 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------------|-----|-----|--|--|--|
| 15336 | APO-METOPROLOL 50 | Tbl 100x50mg | CMG | IRL | | | |
| 96753 | APO-METOPROLOL 50 | Tbl 100x50mg | CMG | IRL | | | |
| 19431 | APO-METOPROLOL 50 | tbl 100x50mg | KAT | NL | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 74.3 | C07AB02 | metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.15 | GM | 18.40 | P |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|

Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce jsou hrazeny tablety s obsahem 100 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmii a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 74.4 | C07AB02 | metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.15 | GM | 8.00 | P |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 74.5 | C07AB02 | metoprolol (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 2.59 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

32675 METOPROLOL AL 100 por tbl nob100x100mg SDB D
 47673 METOPROLOL AL 100 por tbl nob20x100mg APA D
 47674 METOPROLOL AL 100 por tbl nob60x100mg APA D
 47675 METOPROLOL AL 100 por tbl nob100x100mg APA D

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 74.6 | C07AB03 | atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 75.00 | MG | 2.95 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

42457 ATEHEXAL 50 por tbl flm 50x50mg SFS D
 42458 ATEHEXAL 50 por tbl flm100x50mg SFS D
 83643 ATEHEXAL 50 por tbl flm 50x50mg HEX D
 83644 ATEHEXAL 50 por tbl flm100x50mg HEX D

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 74.7 | C07AB03 | atenolol nad 50 mg v jedné tabletě | p.o. | 75.00 | MG | 2.30 | |
|------|---------|------------------------------------|------|-------|----|------|--|

42461 ATEHEXAL 100 por tbflim100x100mg SFS D
 83648 ATEHEXAL 100 por tbflim100x100mg HEX D

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 74.8 | C07AB04 | acebutolol | p.o. | 0.40 | GM | 3.52 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 74.9 | C07AB05 | betaxolol | p.o. | 20.00 | MG | 3.52 | |
|------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------------------|-----|--|----|--|
| 95402 | BETAXA 20 | | por tbl flm100x20mg | ZEH | | SK | |
| 95401 | BETAXA 20 | | por tbl flm 60x20mg | ZEH | | SK | |
| 95400 | BETAXA 20 | | por tbl flm 30x20mg | ZEH | | SK | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 74.10 | C07AB07 | bisoprolol | p.o. | 10.00 | MG | 3.52 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

32963 BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG por tbl nob 30x5mg MCK D
 32967 BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG por tbl nob 100x5mg MCK D
 32970 BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG por tbl nob 30x10mg MCK D
 32974 BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG por tbl nob100x10mg MCK D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|---|
| 74.11 | C07AB07 | bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 10.00 | MG | 13.37 | P |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|---|

Bisoprolol je ordinován u léčby srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě je bisoprolol hrázen v tabletách s obsahem 10 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmii a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojistění.

03801 CONCOR COR 2.5 MG tbl obd 28x2.5mg MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|---|
| 74.12 | C07AB07 | bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 10.00 | MG | 8.00 | P |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|---|

03824 CONCOR COR 10 MG tbl obd 28x10mg MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 74.13 | C07AB08 | celiprolol | p.o. | 0.20 | GM | 3.52 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 74.14 | C07AB12 | nebivolol | p.o. | 5.00 | MG | 3.52 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-----------------|
| 74.15 | C07AG01 | labetalol | p.o. | 0.60 | GM | 19.50 | L/KAR, INT, GER |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-----------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 74.16 | C07AG02 | karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 37.50 | MG | 15.75 | P |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---|

42773 CORYOL 6,25 porttblnob 30x6.25mg KRK SLO

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|-----|
| 42774 | CORYOL 6,25 | portblnob 90x6.25mg | KRK | SLO |
| 47977 | TALLITON 6.25 MG | por tblnob30x6.25mg | EGI | H |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|---|
| 74.17 | C07AG02 | karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě) | p.o. | 37.50 | MG | 12.00 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|---|

Karvedilol je indikován k léčbě srdečního selhání. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, že není vyšší dávka tolerována, je možno podávat dávku 6,25 mg dlouhodobě. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 - 50 mg denně k udržovací léčbě je karvedilol hrazen v tabletách s obsahem 12,5 a 25 mg. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|---|
| 47978 | TALLITON 12.5 MG | por tblnob30x12.5mg | EGI | H |
| 47979 | TALLITON 25 MG | por tbl nob 30x25mg | EGI | H |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 75 | beta-blokátory, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|---------|-------|----|-------|---|
| 75.1 | C07AA | metipranolol | parent. | 10.00 | MG | 62.97 | O |
|------|-------|--------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-------------|----------------|-----|----|
| 85886 | TRIMEPRANOL | INJ 10X1ML/1MG | HBS | SK |
|-------|-------------|----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 75.2 | C07AG01 | labetalol | parent. | 0.60 | GM | 1 027.60 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------|-------|----|-------|---|
| 75.3 | C07AA | talinolol | parent. | 50.00 | MG | 93.65 | O |
|------|-------|-----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 75.4 | C07AA02 | oxprenolol | parent. | 0.10 | GM | 99.13 | O |
|------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-------|----|-------|---|
| 75.5 | C07AA03 | pindolol | parent. | 15.00 | MG | 99.13 | O |
|------|---------|----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|------|----|--------|---|
| 75.6 | C07AA07 | sotalol | parent. | 0.16 | GM | 900.64 | O |
|------|---------|---------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|
| 75.7 | C07AB02 | metoprolol | parent. | 0.15 | GM | 1 398.18 | O |
|------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|
| 75.8 | C07AB03 | atenolol | parent. | 75.00 | MG | 1 840.83 | O |
|------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|
| 75.9 | C07AB04 | acebutolol | parent. | 0.40 | GM | 1 398.18 | O |
|------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|----|----------|---|
| 75.10 | C07AB09 | esmolol | parent. | 2.50 | GM | 4 205.00 | O |
|-------|---------|---------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 76 | kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 76.1 | C07BB03 | atenolol a thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 4.41 | |
|------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----|----|
| 76715 | TENORETIC | por tbl film 28 | AZC | GB |
|-------|-----------|-----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 76.2 | C07BB07 | bisoprolol a thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 3.71 | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 76.3 | C07CA17 | bopindolol a thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 4.41 | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|----|------|--|--|
| 76.4 | C07FA | beta-blokátory, neselektivní, a jiná p.o. | 0.50 | DF | 0.73 | | |
|------|-------|---|------|----|------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 77 | blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorální podání | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.1 | C08CA01 | amlodipin do 5 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.00 | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.2 | C08CA01 | amlodipin nad 5 mg v 1 tbl | p.o. | 5.00 | MG | 4.00 | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.3 | C08CA02 | felodipin do 5 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.00 | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.4 | C08CA02 | felodipin nad 5 mg v 1 tbl | p.o. | 5.00 | MG | 4.00 | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|-----------------------|-----|--------|---|
| 77.5 | C08CA03 | Isradipin | p.o. | 5.00 | MG | 4.75 | |
| 77.6 | C08CA03 | isradipin (retardované lékové formy) | p.o. | 5.00 | MG | 5.00 | |
| 77.7 | C08CA05 | nifedipin | p.o. | 30.00 | MG | 1.45 | |
| 93460 | CORDIPIN RETARD | | | tbl ret 30x20mg | KRK | SLO | |
| 47490 | CORINFAR 20 RETARD | | | por tbl pro 30x20mg | AWD | D | |
| 77.8 | C08CA05 | nifedipin (lékové formy s retardací hodin) | 24 p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | |
| 77.9 | C08CA05 | nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg) | p.o. | 30.00 | MG | 2.03 | |
| 93460 | CORDIPIN RETARD | | | tbl ret 30x20mg | KRK | SLO | |
| 77.10 | C08CA05 | nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg) | p.o. | 30.00 | MG | 1.37 | |
| 77.11 | C08CA06 | nimodipin | p.o. | 0.30 | GM | 136.08 | X |
| 94189 | DILCEREN | | | tbl obd 50x30mg | SLO | SK | |
| 77.12 | C08CA07 | nisoldipin | p.o. | 20.00 | MG | 5.00 | |
| 77.13 | C08CA08 | nitrendipin | p.o. | 20.00 | MG | 5.00 | |
| 30965 | NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG | | | por tbl nob100x20mg | MCK | D | |
| 77.14 | C08CA09 | lacidipin | p.o. | 4.00 | MG | 5.00 | |
| 77.15 | C08CA10 | nilvadipin do 8 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 8.00 | MG | 5.00 | |
| 77.16 | C08CA10 | nilvadipin nad 8 mg v 1 tbl | p.o. | 8.00 | MG | 4.00 | |
| 77.17 | C08CA12 | barnidipin do 10 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 10.00 | MG | 5.00 | |
| 77.18 | C08CA12 | barnidipin nad 10 mg v 1 tbl | p.o. | 10.00 | MG | 4.00 | |
| 77.19 | C08CA13 | lercanidipin | p.o. | 10.00 | MG | 5.00 | |
| 78 | blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání | | | | | | |
| 78.1 | C08DA01 | verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.24 | GM | 5.00 | |
| 78.2 | C08DA01 | verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.24 | GM | 4.50 | |
| 56160 | VERAHEXAL 120 | | | tbl obd 100x120mg | FST | D | |
| 56158 | VERAHEXAL 120 | | | tbl obd 30x120mg | FST | D | |
| 77037 | VERAPAMIL AL 80 | | | por tbl/film100x80mg | APA | D | |
| 86046 | VERAPAMIL AL 120 | | | por tbl/film100x120mg | APA | D | |
| 78.3 | C08DA02 | gallopamil | p.o. | 0.10 | GM | 4.50 | |
| 78.4 | C08DB01 | diltiazem | p.o. | 0.24 | GM | 4.75 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|--|------|----|------|--|--|
| 78.5 | C08DB01 | diltiazem (retardované lékové formy)p.o. s obsahem 120 mg a více) | | 0.24 | GM | 5.00 | | |
|------|---------|--|--|------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 79 | blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|--|
| 79.1 | C08CA03 | isradipin | parent. | 5.00 | MG | 3 074.59 | H | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|--|
| 79.2 | C08CA05 | nifedipin | parent. | 30.00 | MG | 3 074.59 | H | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|--|
| 79.3 | C08CA06 | nimodipin | parent. | 50.00 | MG | 3 019.19 | X | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|--|

94535 NIMOTOP S inf sol 5x50ml/10mg BAY D

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|--|
| 79.4 | C08DA01 | verapamil | parent. | 0.24 | GM | 355.24 | H | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|--|
| 79.5 | C08DB01 | diltiazem | parent. | 25.00 | MG | 332.07 | H | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|--|

93135 DILZEM PARENTERAL 25 MG inj sic 5x25mg+sol GOD D

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | ACE inhibitory působící méně než 24 hodin | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|--|
| 80.1 | C09AA01 | kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 50.00 | MG | 3.90 | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|--|
| 80.2 | C09AA01 | kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 50.00 | MG | 3.60 | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|--|
| 80.3 | C09AA01 | kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 3.40 | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|--|
| 80.4 | C09AA02 | enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 4.50 | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|--|

06550 ENAP 2.5MG tbl 100x2.5mg KRK SLO

20417 ENALAPRIL AL 5 por tbl nob 30x5mg APA D

20419 ENALAPRIL AL 5 por tbl nob 100x5mg APA D

32277 EDNYT 5 MG tbl 100x5mg-blistr GED H

59643 ENAP 5 MG por tbl nob100x5mg KRK SLO

59879 ENAPRIL 5 tbl 100x5mg SFS D

59976 ENAP 2.5MG tbl 30x2.5mg KRK SLO

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|--|
| 80.5 | C09AA02 | enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 2.60 | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|--|

20434 ENALAPRIL AL 20 por tbl nob100x20mg APA D

32760 ENALEK 20 MG por tbl nob 30x20mg LEK SLO

59885 ENAPRIL 20 tbl 100x20mg SFS D

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|--|
| 80.6 | C09AA02 | enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 3.50 | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|--|

20422 ENALAPRIL AL 10 por tbl nob100x10mg APA D

20420 ENALAPRIL AL 10 por tbl nob 30x10mg APA D

32759 ENALEK 10 MG por tbl nob 30x10mg LEK SLO

59642 ENAP 10 MG por tbl nob100x10mg KRK SLO

59880 ENAPRIL 10 tbl 30x10mg SFS D

59882 ENAPRIL 10 tbl 100x10mg SFS D

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|--|
| 80.7 | C09AA02 | enalaprilát | parent. | 1.25 | MG | 24.39 | H | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|--|

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|-----|-----|
| 62597 | ENAP I.V. | inj 5x1ml/1.25mg | KRK | SLO |
|-------|-----------|------------------|-----|-----|

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 81 | ostatní ACE-inhibitory | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|
| 81.1 | C09AA03 | lisinopril | p.o. | 10.00 | MG | 4.50 |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|

32503 DAPRIL 10 por tbl nob100x10mg MOE CY

| | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|
| 81.2 | C09AA04 | perindopril do 4 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 4.00 | MG | 5.53 |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|------|
| 81.3 | C09AA04 | perindopril nad 4 mg v 1 tbl | p.o. | 4.00 | MG | 3.87 |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|
| 81.4 | C09AA05 | ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.50 | MG | 5.53 |
|------|---------|---|------|------|----|------|

| | | | | |
|-------|------------|-----------------------|-----|----|
| 13470 | RAMIL 1.25 | por tbl nob 90x1.25mg | ZEH | CZ |
| 13469 | RAMIL 1.25 | por tbl nob 30x1.25mg | ZEH | CZ |
| 13473 | RAMIL 2.5 | por tbl nob 90x2.5mg | ZEH | CZ |
| 13472 | RAMIL 2.5 | por tbl nob 30x2.5mg | ZEH | CZ |

| | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|
| 81.5 | C09AA05 | ramipril nad 2,5 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.50 | MG | 3.87 |
|------|---------|--|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|
| 81.6 | C09AA05 | ramipril nad 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.50 | MG | 2.70 |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|
| 81.7 | C09AA06 | quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 15.00 | MG | 5.53 |
|------|---------|---|------|-------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|
| 81.8 | C09AA06 | quinapril nad 15 mg v jedné tabletě | p.o. | 15.00 | MG | 3.87 |
|------|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|
| 81.9 | C09AA07 | benazepril | p.o. | 7.50 | MG | 5.53 |
|------|---------|------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|
| 81.10 | C09AA08 | cilazapril do 2,5 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 2.50 | MG | 5.53 |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|
| 81.11 | C09AA08 | cilazapril nad 2,5 mg v 1 tbl | p.o. | 2.50 | MG | 3.87 |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|
| 81.12 | C09AA09 | fosinopril | p.o. | 15.00 | MG | 3.87 |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|
| 81.13 | C09AA10 | trandolapril | p.o. | 2.00 | MG | 5.53 |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|
| 81.14 | C09AA11 | spirapril | p.o. | 6.00 | MG | 5.53 |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|
| 81.15 | C09AA12 | delapril | p.o. | 30.00 | MG | 5.53 |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|
| 81.16 | C09AA13 | moexipril | p.o. | 15.00 | MG | 5.53 |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|
| 81.17 | C09AA16 | imidapril do 5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.53 |
|-------|---------|--|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|
| 81.18 | C09AA16 | imidapril nad 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 3.87 |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 82 | kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|
| 82.1 | C09BA01 | kaptopril a diuretika | p.o. | 1.00 | DF | 4.34 |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|
| 82.2 | C09BA02 | enalapril a diuretika | p.o. | 1.00 | DF | 3.97 |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|

55429 ENAP-HL por tbl nob 30 KRK SLO

| | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|------|
| 82.3 | C09BA04 | perindopril a indapamid | p.o. | 1.00 | DF | 3.05 |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|------|

| | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|
| 82.4 | C09BA05 | ramipril s obsahem 2,5 mg a diuretikum s obsahem 12,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 |
|------|---------|--|------|------|----|------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 82.5 | C09BA05 | ramipril s obsahem 5 mg a diuretikum p.o. s obsahem 25 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.69 | |
| 82.6 | C09BA06 | quinapril s obsahem 10 mg v jedné tabletě a diuretikum | p.o. | 1.00 | DF | 4.16 | |
| 82.7 | C09BA06 | quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum | p.o. | 1.00 | DF | 5.63 | |
| 82.8 | C09BA07 | benazepril a diuretika | p.o. | 1.00 | DF | 5.06 | |
| 82.9 | C09BA08 | cilazapril a diuretika | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |
| 82.10 | C09BB05 | ramipril s obsahem 2,5 mg a felodipin s obsahem 2,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.03 | |
| 82.11 | C09BB05 | ramipril s obsahem 5 mg a felodipin s obsahem 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.87 | |
| 82.12 | C09BB10 | trandolapril a verapamil | p.o. | 1.00 | DF | 9.28 | |
| 82.13 | C09DA01 | losartan v kombinaci s thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 6.47 | |
| 82.14 | C09DA03 | valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 10.07 | |
| 82.15 | C09DA03 | valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 10.54 | |
| 82.16 | C09DA03 | valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg valsartanu v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 6.47 | |
| 82.17 | C09DA06 | kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |
| 82.18 | C09DA06 | kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 6.47 | |
| 82.19 | C09DA07 | telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 40 mg telmisartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 | |
| 82.20 | C09DA07 | telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg telmisartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 83 | léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 83.1 | C09CA01 | losartan do 50 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 50.00 | MG | 5.53 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-------------|-----------------------|-----|-----|
| 95461 | LAKEA 50 MG | por tbl flm 30x50mg | LEK | SLO |
| 47610 | LORISTA | por tbl/film 84x50mg | KRK | SLO |
| 10604 | LORISTA | por tbl/film 28x50mg | KRK | SLO |
| 10618 | LOZAP 12.5 | portbl/film 30x12.5mg | ZEH | CZ |
| 10620 | LOZAP 50 | por tbl flm 30x50mg | ZEH | CZ |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 83.2 | C09CA01 | losartan nad 50 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 50.00 | MG | 3.87 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|--------|----|------|---|
| 83.3 | C09CA02 | eprosartan | p.o. | 600.00 | MG | 5.53 | |
| 83.4 | C09CA03 | valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 80.00 | MG | 5.53 | |
| 83.5 | C09CA03 | valsartan nad 80 mg v jedné tabletě | p.o. | 80.00 | MG | 3.87 | |
| 83.6 | C09CA04 | irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 150.00 | MG | 7.68 | P |
| 83.7 | C09CA04 | irbesartan nad 150 mg v jedné tabletě | p.o. | 150.00 | MG | 6.12 | P |

Irbesartan je indikován u pacientů s:

- a) diabetickou nefropatií již od fáze mikroalbuminurie,
- b) nedиabetickou nefropatií s proteinurii vyšší než 1 g/24 hodin u nemocných netolerujících ACE inhibitory.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 83.8 | C09CA06 | kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 8.00 | MG | 5.53 | |
| 83.9 | C09CA06 | kandesartan nad 8 mg v jedné tabletě | p.o. | 8.00 | MG | 3.87 | |
| 83.10 | C09CA07 | telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 40.00 | MG | 5.53 | |
| 83.11 | C09CA07 | telmisartan nad 40 mg v jedné tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 3.87 | |

84 hypolipidemika ze skupiny statinů

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.1 | C10AA01 | simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
| 84.2 | C10AA01 | simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 8.00 | P |
| 84.3 | C10AA01 | simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 11.00 | P |
| 84.4 | C10AA01 | simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 15.40 | P |
| 84.5 | C10AA02 | lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | P |
| 84.6 | C10AA02 | lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 6.75 | P |
| 84.7 | C10AA03 | pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 4.80 | P |
| 84.8 | C10AA03 | pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 7.20 | P |
| 84.9 | C10AA03 | pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 10.80 | P |
| 84.10 | C10AA04 | fluvarstatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 4.80 | P |
| 84.11 | C10AA04 | fluvarstatin (nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 7.20 | P |
| 84.12 | C10AA04 | fluvarstatin (nad 40 MG v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 18.72 | P |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.13 | C10AA05 | atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 8.50 | P |
| 84.14 | C10AA05 | atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 11.00 | P |
| 84.15 | C10AA05 | atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 16.50 | P |
| 84.16 | C10AA05 | atorvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 23.10 | P |
| 84.17 | C10AA07 | rosuvastatin (do 10 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 19.26 | P |
| 84.18 | C10AA07 | rosuvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 28.89 | P |
| 84.19 | C10AA07 | rosuvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 43.34 | P |

A) Léčba atorvastatinem (10 a 20mg), simvastatinem (10,20 a 40mg), fluvastatinem (20 a 40mg) a lovastatinem (20,40 a 80mg) a pravastatinem (20 a 40mg) je indikovaná u nemocných s hypercholesterolémii a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno v chorobopise). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem hodnota LDL-cholesterolu, jejíž cílová hodnota je stanovena na 3,0mmol/l. Kombinaci hypolipidemik může indikovat a předepisovat pouze kardiolog, internista, lékař lipidologické poradny a diabetolog.

B) Léčba atorvastatinem (v dávce vyšší než 20mg), fluvastatinem (v dávce vyšší než 40mg) či rosuvastatinem je indikovaná kardiologem, internistou, diabetologem nebo lékařem lipidologické poradny u nemocných s hypercholesterolémii a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% a kdy nelze dosáhnout cílových hodnot ($LDL \leq 3,0\text{mmol/l}$) statiny uvedenými v a) nebo kdy statiny uvedené v bodě a) nelze použít.

| | | | | | | | |
|------|--|---|------|------|----|------|--|
| 85 | hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin | | | | | | |
| 85.1 | C10AB | klofibrát (etofyllin) | p.o. | 0.50 | GM | 4.32 | |
| 85.2 | C10AB02 | bezafibrát | p.o. | 0.60 | GM | 6.17 | |
| 85.3 | C10AB04 | gemfibrozil | p.o. | 1.20 | GM | 6.17 | |
| 85.4 | C10AB05 | fenofibrát | p.o. | 0.30 | GM | 6.17 | |
| 85.5 | C10AB05 | fenofibrát (mikronisované lékové formy) | p.o. | 1.00 | DF | 6.82 | |

| | | | | |
|-------|----------------------|---------------------|-----|---|
| 13337 | LIPOHEXAL 250 RETARD | por cps ret60x250mg | SFS | D |
| 13338 | LIPOHEXAL 250 RETARD | por cps ret90x250mg | SFS | D |
| 58769 | LIPOHEXAL 250 RETARD | por cps ret30x250mg | SFS | D |
| 58770 | LIPOHEXAL 250 RETARD | por cpsret100x250mg | SFS | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 85.6 | C10AB05 | fenofibrát (supramikronisované lékové formy) | p.o. | 1.00 | DF | 8.55 | |
| 85.7 | C10AB08 | ciprofibrát | p.o. | 0.10 | GM | 7.69 | |
| 85.8 | C10AC01 | cholestyramin | p.o. | 14.00 | GM | 31.09 | P |
| 85.9 | C10AC02 | colestipol | p.o. | 20.00 | GM | 31.09 | P |

Léčbu cholestyraminem a colestipolem ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:
 a) u pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
 b) u pacientů s puritem při biliární cirhóze.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|-------|---|
| 85.10 | C10AD06 | acipimox | p.o. | 500.00 | MG | 10.59 | |
| 85.11 | C10AX09 | ezetimib | p.o. | 10.00 | MG | 46.00 | P |

Ezetimib je určen pro kombinační léčbu se statiny (tj. je hrazen v případě použití ve druhé volbě). Léčbu ezetimibem indikuje specialista (kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař lipidologické poradny) u nemocných s těžkou rezistentní hyperlipoproteinémii (familiární hypercholesterolémie), u kterých nevedla léčba vyššími dávkami statinů, trvající alespoň 6 měsíců k dosažení cílových hodnot LDLcholesterolu ($LDL \leq 3,0 \text{ mmol/l}$). Za vyšší dávku statinů je považováno 40 mg simvastatinu, 20 mg atorvastatinu, 80 mg fluvastatinu a lovastatinu, 20 mg rosuvastatinu. V kombinaci s ezetimibem jsou hrazeny základní dávky statinů (tj. do 40 mg simvastatinu a atorvastatinu, do 80 mg fluvastatinu a lovastatinu a do 20 mg rosuvastatinu). Pokud kombinační léčba není účinná (nebylo dosaženo výše uvedených cílových hodnot LDL cholesterolu) po 3 měsících léčby, je ezetimib vysazen.

Ezetimib je dále indikován uvedenými specialisty u nemocných, u kterých vedla léčba statiny k významným a řádně dokumentovaným nežádoucím účinkům: elevaci amonotransferáz na více než trojnásobek a CK na více než pětinásobek normálních hodnot. Za neúčinnost léčby je považováno, pokud po 3 měsících léčby nedojde k aditivnímu poklesu LDL cholesterolu alespoň o 10% ve srovnání s monoterapií statinem.

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 86 | Ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 86.1 | C01CX08 | levosimendan | parent. | 11.00 | MG | 20 280.00 | H |
|------|---------|--------------|---------|-------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|------|----|-------|---|
| 86.2 | C01DA02 | glycerol trinitrát | parent. | 2.50 | MG | 12.98 | H |
|------|---------|--------------------|---------|------|----|-------|---|

04307 NITRO POHL INFUS. inf 10x10ml/10mg PLB D

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 86.3 | C01DA08 | isosorbid dinitrát | parent. | 20.00 | MG | 123.96 | H |
|------|---------|--------------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|
| 86.4 | C01DX03 | oxifedrin | parent. | 40.00 | MG | 13.78 | H |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 86.5 | C01DX12 | molsidomin | parent. | 6.00 | MG | 105.38 | H |
|------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 87 | antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 87.1 | D01AA01 | nystatin | lok. | 1.00 | GM | 2.68 | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|

01069 FUNGICIDIN LÉČIVA ung 1x10gm LEX CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 87.2 | D01AA02 | natamycin | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 87.3 | D01AC01 | klotrimazol do 20 g včetně | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|
| 87.4 | D01AC01 | klotrimazol nad 20 g | lok. | 1.00 | GM | 1.52 | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 87.5 | D01AC01 | klotrimazol tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | GM | 2.54 | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 87.6 | D01AC02 | mikonazol | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 87.7 | D01AC03 | ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelulok. a pasty) | lok. | 1.00 | GM | 3.52 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|--|
| 87.8 | D01AC03 | ekonazol lékové formy krému | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
|------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 87.9 | D01AC05 | isokonazol | lok. | 1.00 | ML | 1.77 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 87.10 | D01AC08 | ketokonazol | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 87.11 | D01AC10 | bifonazol | lok. | 1.00 | GM | 2.49 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 87.12 | D01AC11 | oxikonazol | lok. | 1.00 | GM | 2.49 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 87.13 | D01AC12 | fenticonazol | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 87.14 | D01AC14 | sertakonazol | lok. | 1.00 | GM | 2.49 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 87.15 | G01AF18 | flutrimazol, lékové forma gelu | lok. | 1.00 | GM | 3.06 | |
| 87.16 | G01AF18 | flutrimazol, lékové forma krém a spray | lok. | 1.00 | GM | 4.70 | |
| 87.17 | D01AC20 | kombinace | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.18 | D01AC51 | clotrimazol/urea | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.19 | D01AC60 | bifonazol, kombinace | lok. | 1.00 | GM | 13.41 | P |

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením.

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 88 | Ostatní antimykotika k lokálnímu použití | | | | | | |
| 88.1 | D01AE | jiná antimykotika k zevnímu použití | lok. | 1.00 | ML | 0.78 | |
| 88.2 | D01AE | naftini hydrochlorid | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 88.3 | D01AE04 | kyselina undecylenová | lok. | 1.00 | GM | 0.97 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|--|------|------|----|------|--|
| 00871 | MYKOSEPTIN | ung 1x30gm | LEX | CZ | | | |
| 88.4 | D01AE14 | ciclopirox | lok. | 1.00 | GM | 3.79 | |
| 88.5 | D01AE15 | terbinafin | lok. | 1.00 | GM | 3.79 | |
| 88.6 | D01AE16 | amorolfin | lok. | 1.00 | MG | 3.35 | |
| 88.7 | D01AE18 | tolnaftat | lok. | 1.00 | GM | 1.83 | |
| 88.8 | D01AE19 | tolciklát | lok. | 1.00 | GM | 1.83 | |
| 88.9 | D01AE20 | kombinace antimykotik (ostatní kombinace) | lok. | 1.00 | GM | 0.64 | |
| 88.10 | D01AE20 | kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid) | lok. | 1.00 | GM | 1.83 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89 | emolliencia a protektiva | | | | | | |
| 89.1 | D02AB | přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 0.51 | |
| 88780 | SUSPENSIO ZINCI OXYD.CSL4 PROF. | sus 1x100gm | PSR | CZ | | | |
| 89.2 | D02AC | měkký parafín a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 0.59 | L/DER,PED |
| 89.3 | D02AC | měkký parafín a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | ML | 0.59 | L/DER,PED |
| 89.4 | D02AC | měkký parafín a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.43 | L/DER,PED |
| 89.5 | D02AC | měkký parafín a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) | lok. | 1.00 | ML | 0.43 | L/DER,PED |
| 89.6 | D02AC | měkký parafín s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně) | lok. | 1.00 | ML | 0.65 | L/DER,PED |

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.7 | D02AC | měkký parafín s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení) | lok. | 1.00 | ML | 0.47 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|-----------|
| 89.8 | D02AE01 | měkký parafín a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | ML | 0.50 | L/DER,PED |
|------|---------|--|------|------|----|------|-----------|

97153 EXCIPIAL U HYDROLOTIO drm eml 1x200ml SEG CH

| | | | | | | | |
|------|---------|------|------|------|----|------|-----------|
| 89.9 | D02AE01 | urea | lok. | 1.00 | GM | 0.50 | L/DER,PED |
|------|---------|------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 89.10 | D02AE51 | kombinace kyseliny salicylové s ureou | lok. | 1.00 | GM | 1.00 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 89.11 | D02AX | jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.71 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 89.12 | D02AX | jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.64 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 90 | léčiva pro léčbu ran a vředů | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 90.1 | D03AX | jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl) | lok. | 1.00 | ML | 0.49 | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|--|
| 90.2 | D03AX | jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosy, na obsah karboxycelulosy) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 90.3 | D03AX | jiná léčiva podporující zajizvení (zinc hyaluronas -lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 1.42 | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 90.4 | D03AX | jiná léčiva podporující zajizvení (zinc hyaluronas -lékové formy roztoku) | lok. | 1.00 | ML | 3.91 | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 90.5 | D03AX02 | dextranomer | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 90.6 | D03BA | proteolytické enzymy (chymotrypsin) | lok. | 1.00 | GM | 79.28 | P |
|------|-------|-------------------------------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|---|
| 90.7 | D03BA | proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza) | lok. | 1.00 | GM | 14.02 | P |
|------|-------|--|------|------|----|-------|---|

02594 FIBROLAN MAST ung 1x25gm PDA F

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|-------|---|
| 90.8 | D03BA | proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin) | lok. | 1.00 | GM | 28.84 | P |
|------|-------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 90.9 | D03BA52 | proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 18.57 | P |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 90.10 | D03BA52 | proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 16.62 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

Léčbu proteolytickými enzymy ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog k:

- a) léčbě běrcových vředů,
- b) léčbě nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 91 | Antipsoriatika | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|------|----|------|--|
| 91.1 | D05AA | dehty | lok. | 1.00 | GM | 0.73 | |
|------|-------|-------|------|------|----|------|--|

05994 UNGUENTUM ICHTHAMMOLI 10% H.-B. drm ung 1x30gm HEO CZ

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|----|
| 55290 | UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM | drm ung 1x100gm | MVM | CZ |
| 66262 | SALOXYL | ung 1x30gm | HEO | CZ |
| 66502 | ICHTOXYL | ung 1x30gm | HEO | CZ |
| 83870 | UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM | drm ung 1x1kg | MVM | CZ |
| 85950 | SUSPENSIO VIŠNĚVSKI+PICE LIQUID | sus 1x1000gm | HEO | CZ |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|------|-------|----|-------|-------|
| 91.2 | D05AA | dehty (odbarvený dehet) | lok. | 1.00 | GM | 1.17 | |
| 91.3 | D05AC01 | dithranol | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
| 91.4 | D05AD02 | methoxalen (0,15 % koncentrace) | lok. | 1.00 | ML | 4.05 | |
| 91.5 | D05AX02 | calcipotriol | lok. | 1.00 | GM | 9.00 | P |
| 91.6 | D05AX03 | calcitriol | lok. | 1.00 | GM | 9.00 | P |
| 91.7 | D05AX04 | tacalcitol | lok. | 1.00 | GM | 18.00 | P |
| 91.8 | D05AX05 | tazaroten | lok. | 1.00 | GM | 18.00 | P |
| 91.9 | D05BA02 | methoxalen | p.o. | 10.00 | MG | 3.81 | L/DER |

Léčbu derivátů vitamINU D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně,
- b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojíšťovny.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|
| 91.10 | D05BB01 | etretinát | p.o. | 35.00 | MG | 81.14 | P |
| 91.11 | D05BB02 | acitretin | p.o. | 35.00 | MG | 81.14 | P |

Léčbu etretinátem a acitretinem ordinuje dermatolog:

- a) v léčbě těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- b) u ostatních těžkých forem poruch keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem,
- c) u kožních T-lymfomů.

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|------|------|----|-------|--|
| 92 | antibiotika k zevnímu použití | | | | | | |
| 92.1 | D06AA | tetracyklin a deriváty | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 92.2 | D06AX | neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku) | lok. | 1.00 | ML | 3.83 | |
| 92.3 | D06AX | neomycin/bacitracin (mast) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 92.4 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyп do 2 g včetně) | lok. | 1.00 | GM | 13.69 | |
| 92.5 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyп nad 2 do 5 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 7.63 | |
| 92.6 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyп nad 5 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 2.70 | |

01063 FRAMYKON plv ads 1x20gm IHO CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 92.7 | D06AX | primycin | lok. | 1.00 | GM | 2.44 | |
| 92.8 | D06AX01 | acidum fusidicum | lok. | 1.00 | GM | 4,00 | |
| 92.9 | D06AX02 | chloramfenikol | lok. | 1.00 | GM | 2.88 | |
| 92.10 | D06AX09 | mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 6.65 | |
| 92.11 | D06AX09 | mupirocin (nad 5 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 4.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------|--------|-----|-------|-----------|
| 93 | antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika | | | | | | |
| 93.1 | D06BA | sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.08 | L/DER,CHI |
| 93.2 | D06BA | sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.98 | L/DER,CHI |
| 93.3 | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.40 | L/DER,CHI |
| 62229 DERMAZIN | | crm 1x50gm 1% | | LEK | SLO | | |
| 93.4 | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 1.12 | L/DER,CHI |
| 93.5 | D06BA02 | sulfathiazol | lok. | 1.00 | GM | 0.98 | |
| 93.6 | D06BA03 | matenic | lok. | 1.00 | GM | 0.98 | L/DER,CHI |
| 93.7 | D06BA51 | sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému) | lok. | 1.00 | GM | 2.25 | L/DER,CHI |
| 93.8 | D06BA51 | sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti) | lok. | 100.00 | CM2 | 13.49 | L/DER,CHI |
| 93.9 | D06BB04 | podophylotoxin | lok. | 1.00 | GM | 15.00 | L/DER |
| 93.10 | D06BX01 | metronidazol | lok. | 1.00 | GM | 2.25 | L/DER,CHI |
| 94 | středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace | | | | | | |
| 94.1 | D07AA02 | hydrokortison | lok. | 1.00 | GM | 3.31 | |
| 94.2 | D07AA03 | prednisolon | lok. | 1.00 | GM | 3.18 | |
| 94.3 | D07AB01 | klobetazon | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.4 | D07AB02 | hydrokortison butyrát | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.5 | D07AB03 | flumetason | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.6 | D07AB07 | flupredniden | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.7 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy lotia) | lok. | 1.00 | ML | 2.83 | |
| 66167 TRIAMCINOLON-GALENA | | drm sol 1x30gm | | IVX | CZ | | |
| 94.8 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 2.55 | |
| 41040 TRIAMCINOLON HBF | | drm crm 1x30gm | | HEO | CZ | | |
| 94.9 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 | GM | 0.73 | |
| 94.10 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy tinktury) | lok. | 1.00 | ML | 0.98 | |
| 94.11 | D07AB10 | alclomethason | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.12 | D07AB19 | dexamethason acetát | lok. | 1.00 | GM | 3.09 | |

02415 DEXAMETHAZON LÉČIVA CRM

drm crm 1x10gm

LEX CZ

95 velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|------|------|----|------|--|
| 95.1 | D07AC01 | betamethason dipropionát | lok. | 1.00 | GM | 2.18 | |
|------|---------|--------------------------|------|------|----|------|--|

98032 DIPROSONE ung 1x30gm SCH B

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|
| 95.2 | D07AC01 | betamethason valerát | lok. | 1.00 | GM | 2.95 | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 95.3 | D07AC02 | fluklorolon | lok. | 1.00 | GM | 3.32 | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|------|------|----|------|--|
| 95.4 | D07AC04 | fluocinolon gel | lok. | 1.00 | GM | 2.44 | |
|------|---------|-----------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 95.5 | D07AC04 | fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 95.6 | D07AC04 | fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%) | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 95.7 | D07AC04 | fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 95.8 | D07AC04 | fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%) | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 95.9 | D07AC06 | diflukortolon | lok. | 1.00 | GM | 3.42 | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 95.10 | D07AC08 | fluocinonid | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|-------|
| 95.11 | D07AC09 | budesonid | lok. | 1.00 | GM | 3.18 | L/DER |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 95.12 | D07AC12 | halometason | lok. | 1.00 | GM | 3.27 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|---------------|
| 95.13 | D07AC13 | mometazon do 10g v 1 balení včetně | lok. | 1.00 | GM | 6.70 | L/DER,ALG,PED |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|---------------|
| 95.14 | D07AC13 | mometazon nad 10g v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 5.00 | L/DER,ALG,PED |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|---------------|
| 95.15 | D07AC14 | methylprednisoloni aceponas | lok. | 1.00 | GM | 5.87 | L/DER,ALG,PED |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 95.16 | D07AC17 | flutikason | lok. | 1.00 | GM | 3.42 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---------------|
| 95.17 | D07AC18 | prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 6.70 | L/DER,ALG,PED |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|---------------|
| 95.18 | D07AC18 | prednikarbat (nad 10 g v 1 balení) | lok. | 1.00 | GM | 5.87 | L/DER,ALG,PED |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|-------|
| 95.19 | D07AD01 | klobetasol | lok. | 1.00 | GM | 4.14 | L/DER |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|-------|
| 95.20 | D07AD02 | halcinonid | lok. | 1.00 | ML | 4.14 | L/DER |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|-------|

97019 BETACORTON drm sol 1x25ml SEG CH

97020 BETACORTON drm sol 1x100ml SEG CH

96 kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|
| 96.1 | D07BA01 | prednisolon/cloroxin | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 96.2 | D07BA01 | prednisolon/hexamidin diisothionát | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|------|------|----|------|--|
| 96.3 | D07BB01 | flumetasol a antiseptika | lok. | 1.00 | GM | 3.32 | |
|------|---------|--------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 96.4 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 1.92 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

04178 TRIAMCINOLON E LÉČIVA unguentum 1x20gm LEX CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 96.5 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny) | lok. | 1.00 | GM | 1.42 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 96.6 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 | GM | 0.59 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 96.7 | D07CA01 | hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 96.8 | D07CA01 | hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy) | lok. | 1.00 | ML | 1.96 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------|------|------|----|------|--|
| 96.9 | D07CC01 | betamethason a gentamicin | lok. | 1.00 | GM | 2.50 | |
|------|---------|---------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 97 | kortikosteroidy v jiných kombinacích | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 97.1 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury) | lok. | 1.00 | ML | 1.60 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 97.2 | D07XA01 | hydrokortison | lok. | 1.00 | ML | 1.96 | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 97.3 | D07XA02 | prednisolon/kyselina salicylová | lok. | 1.00 | ML | 1.32 | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|------|------|----|------|--|
| 97.4 | D07XB01 | flumetasone/dehet | lok. | 1.00 | GM | 4.40 | |
|------|---------|-------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 97.5 | D07XB01 | flumethason pivalat/kyselina salicylová | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 97.6 | D07XB02 | triamcinolon | lok. | 1.00 | GM | 1.87 | |
|------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------|------|------|----|------|--|
| 97.7 | D07XC | diflucortolon/isoconasol | lok. | 1.00 | GM | 2.61 | |
|------|-------|--------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 97.8 | D07XC01 | betamethason (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 2.61 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 97.9 | D07XC01 | betamethason (lékové formy tinktur) | lok. | 1.00 | ML | 2.61 | |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------|------|------|----|------|--|
| 97.10 | D07XD | halcinonid/kyselina salicylová | lok. | 1.00 | ML | 3.51 | |
|-------|-------|--------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 97.11 | D07XD | halcinonid/močovina | lok. | 1.00 | GM | 3.51 | |
|-------|-------|---------------------|------|------|----|------|--|

97021 BETACORTON U drm.crm 1x20gm SEG CH

97156 BETACORTON U MASTNÝ KRÉM drm.crm 1x20gm SEG CH

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 98 | antiseptika a desinficiencia | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|----------|----|--------|--|
| 98.1 | D08AC02 | chlorhexidin | lok. | 1 000.00 | ML | 178.70 | |
|------|---------|--------------|------|----------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 98.2 | D08AD | kyselina boritá (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.32 | |
|------|-------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

65997 UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA ung 1x500gm (dÓza) HEO CZ

65998 UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA ung 1x1000gm (dÓza) HEO CZ

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|-------|----|------|--|
| 98.3 | D08AD | kyselina boritá (lékové formy roztoků) | lok. | 10.00 | GM | 1.32 | |
|------|-------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 98.4 | D08AG02 | polyvidon-jód (do 200 g mastí v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|------|------|------|--------|---|
| 84421 | BRAUNOIDON MAST | ung 1x100gm-tuba | BMB | CH | | | |
| 98.5 | D08AG02 | polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku) lok. v jednom balení) | 1.00 | ML | 0.64 | | |
| 02981 | JODISOL ROZTOK | liq 1x80gm | SDH | CZ | | | |
| 46054 | BRAUNOL | liq 1x100ml | BMB | CH | | | |
| 96605 | JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRAŠOV. | drm spr sol 1x75gm | SDH | CZ | | | |
| 98.6 | D08AG02 | polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku) lok. v jednom balení) | 1.00 | ML | 0.49 | | |
| 02983 | JODISOL ROZTOK | liq 1x760gm | SDH | CZ | | | |
| 46055 | BRAUNOL | liq 1x250ml | BMB | CH | | | |
| 46056 | BRAUNOL | liq 1x500ml | BMB | CH | | | |
| 80553 | BRAUNOL | liq 1x1000ml | BMB | CH | | | |
| 98.7 | D08AG02 | polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom lok. balení) | 1.00 | GM | 0.64 | | |
| 46052 | BRAUNOIDON MAST | ung 1x250gm-keřímek | BMB | CH | | | |
| 84422 | BRAUNOIDON MAST | ung 1x250gm-pe tuba | BMB | CH | | | |
| 98.8 | D08AH | kloroxin | lok. | 1.00 | GM | 0.78 | |
| 98.9 | D08AJ | bromid benzododecinia (tinktura a roztok) lok. do 50 ml v jednom balení včetně) | 1.00 | ML | 0.29 | | |
| 98.10 | D08AJ | bromid benzododecinia (tinktura a roztok) lok. nad 50 ml v jednom balení) | 1.00 | ML | 0.08 | H | |
| 58237 | AJATIN PROFARMA TINKTURA | tct 1x1000ml | PSR | CZ | | | |
| 58239 | AJATIN PROFARMA SOLUTIO | sol 1x1000ml | PSR | CZ | | | |
| 98.11 | D08AJ | chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml) lok. v jednom balení včetně) | 1.00 | ML | 0.08 | H | |
| 98.12 | D08AX | hexamidin/chlorhexidin | lok. | 1.00 | GM | 121.37 | H |
| 98.13 | D08AX | noxytiolin | lok. | 2.50 | GM | 492.11 | H |
| 98.14 | D08AX | noxytiolin/tetrakain | lok. | 2.50 | GM | 492.11 | H |
| 98.15 | D08AX | taurodin | lok. | 1.00 | GM | 94.48 | H |
| 99 | léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky | | | | | | |
| 99.1 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy krémů a gelů) do lok. koncentrace 0,05% včetně) | 1.00 | GM | 3.69 | | |
| 66170 | LOCACID | crm 1x30gm 0.05% | PFH | F | | | |
| 97573 | RETIN-A KRÉM 0.025% | drm crm 1x30gm | CIL | CH | | | |
| 99.2 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy krémů a gelů) do lok. koncentrace nad 0,05%) | 1.00 | GM | 4.40 | | |
| 99.3 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy roztoků do lok. koncentrace 0,05% včetně) | 1.00 | ML | 3.70 | | |
| 64956 | AIROL | lot 1x50ml 0.05% | PRH | F | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.4 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy roztoků) lok. koncentrace nad 0,05%) | | 1.00 | ML | 4.40 | |
| 99.5 | D10AD03 | adapalen - léková forma krémů a gelů | lok. | 1.00 | GM | 4.00 | |
| 99.6 | D10AD54 | isotretinoïn a erythromycin v kombinaci | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 99.7 | D10AE01 | benzoyl peroxid (koncentrace 20%) | lok. | 1.00 | ML | 2.54 | |
| 99.8 | D10AE01 | benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů) | lok. | 1.00 | GM | 1.42 | |

47279 ECLARAN 5 drm gel 1x45gm PFG F

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.9 | D10AE01 | benzoyl peroxid (lékové formy roztoků) lok. a lotii) | | 1.00 | ML | 0.39 | |
| 99.10 | D10AF01 | klindamycin | lok. | 1.00 | ML | 1.96 | |
| 99.11 | D10AF02 | erythromycin (lékové formy krémů a mastí) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 99.12 | D10AF02 | erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | ML | 2.01 | |

98204 ERYFLUID sol 1x30ml PFH F

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.13 | D10AF02 | erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení | lok. | 1.00 | ML | 1.62 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

75285 ERYFLUID sol 1x100ml PFH F

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|-------|
| 99.14 | D10AF52 | erythromycin v kombinaci | lok. | 1.00 | ML | 2.93 | |
| 99.15 | D10AX03 | kyselina azelaová | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 99.16 | D10BA01 | isotretinoïn (do 10 MG včetně v jedné kapsli) | p.o. | 30.00 | MG | 82.33 | X |
| 99.17 | D10BA01 | isotretinoïn (nad 10 MG v jedné kapsli) | p.o. | 30.00 | MG | 74.29 | X |
| 99.18 | D11AX | celulóza (lékové formy zásypů) | lok. | 1.00 | GM | 9.78 | L/DER |

100 ostatní léčiva používaná u nemocí kůže

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 100.1 | D04AB01 | lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%) | lok. | 1.00 | GM | 4.26 | O |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|

46125 LIDOCAIN 10% spr 1x38gm EGI H

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 100.2 | D11AF | fluorouracil (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 13.15 | L/DER,ONK |
| 100.3 | D11AF | fluorouracil (lékové formy roztoků) | lok. | 1.00 | ML | 16.51 | L/DER |
| 100.4 | D11AX14 | tacrolimus v koncentraci 0,03% | lok. | 1.00 | GM | 28.80 | P |
| 100.5 | D11AX14 | tacrolimus v koncentraci 0,1% | lok. | 1.00 | GM | 31.50 | P |

Léčbu tacrolimem ordinuje dermatovenerolog u pacientů s atopickou dermatitidou (AD), kteří netolerují klasickou terapii, nebo kteří na klasické terapii selhávají:

- a) u dětí do 6 let, které trpí středně těžkou a těžkou AD na hlavě a krku (4,5 - 9 klasifikace dle Rajka-Langeland),
- b) u starších dětí a dospělých, kteří trpí těžkou AD na hlavě a krku (8 – 9 klasifikace dle Rajka - Langeland).

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|
| 100.6 | D11AX15 | pimecrolimus | lok. | 1.00 | GM | 28.80 | P |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu pimecrolimem ordinuje dermatovenerolog u pacientů s atopickou dermatitidou (AD), kteří netolerují klasickou terapii, nebo kteří na klasické terapii selhávají - u dětí, které trpí středně těžkou AD na hlavě a krku (4,5 – 7,5 klasifikace dle Rajka - Langeland).

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 101 | gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|------|--|
| 101.1 | G01AA01 | nystatin | vag. | 100.00 | KU | 0.98 | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 101.2 | G01AA02 | natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg) | vag. | 25.00 | MG | 6.64 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 101.3 | G01AA02 | natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg) | vag. | 25.00 | MG | 4.11 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 101.4 | G01AA10 | klindamycin (lékové formy krémů) | vag. | 1.00 | GM | 11.00 | P |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 101.5 | G01AA51 | nystatin kombinace s nifuratem (lékové formy vag. čípků) | vag. | 1.00 | DF | 17.00 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 101.6 | G01AA51 | nystatin kombinace s nifuratem (lékové formy vag. krémů) | vag. | 5.00 | GM | 33.95 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.7 | G01AA51 | nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem | vag. | 1.00 | DF | 11.30 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 101.8 | G01AF01 | metronidazol | vag. | 0.50 | GM | 3.34 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

02430 ENTIZOL tbl vag 10x500mg ZPF PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 101.9 | G01AF02 | klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.10 | GM | 12.68 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 101.10 | G01AF02 | klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet) | vag. | 0.10 | GM | 8.10 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 101.11 | G01AF04 | mikonazol | vag. | 0.10 | GM | 8.70 | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.12 | G01AF05 | ekonazol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.10 | GM | 12.78 | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.13 | G01AF05 | ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků) | vag. | 0.10 | GM | 30.99 | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 101.14 | G01AF11 | ketoconazol | vag. | 0.40 | GM | 13.44 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 101.15 | G01AF12 | fenticonazol | vag. | 0.10 | GM | 13.44 | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|--|
| 101.16 | G01AF17 | oxikonazol | vag. | 0.60 | GM | 109.90 | |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 101.17 | G01AF20 | kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol (lékové formy vag. tablet) | vag. | 1.00 | DF | 6.35 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 101.18 | G01AG02 | terkonazol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 80.00 | MG | 12.88 | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 101.19 | G01AG02 | terkonazol (lékové formy vaginálních tablet) | vag. | 80.00 | MG | 31.28 | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.20 | G01AX12 | ciclopirox (vaginální čípky) | vag. | 1.00 | DF | 31.28 | |
| 101.21 | G01AX12 | ciclopirox (vaginální roztok) | vag. | 1.00 | DF | 17.60 | |
| 101.22 | G01AX12 | ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení) | vag. | 1.00 | GM | 4.69 | |
| 101.23 | G01AX12 | ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení) | vag. | 1.00 | GM | 3.11 | |

| | | |
|-----|---|--|
| 102 | gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití | |
|-----|---|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|
| 102.1 | G01AX | jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný) | vag. | 1.00 | DF | 6.40 | |
| 102.2 | G01AX | laktobacillus | vag. | 1.00 | DF | 10.26 | |
| 102.3 | G01AX | nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků) | vag. | 1.00 | DF | 17.60 | |
| 102.4 | G01AX | nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 5.00 | GM | 35.19 | |
| 102.5 | G01AX | nitrofurantoin | vag. | 0.20 | GM | 2.99 | |

03629 FURANTOIN LÉČIVA tbl vag 30x100mg LEX CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 102.6 | G01AX | sulfathiazol | vag. | 1.00 | DF | 6.60 | |
| 102.7 | G01AX03 | polykresulen | vag. | 90.00 | MG | 0.35 | |
| 102.8 | G01AX11 | polyvidon-jód (vaginální čípky) | vag. | 0.20 | GM | 8.94 | |
| 102.9 | G01AX11 | polyvidon-jód (vaginální gel) | vag. | 0.20 | GM | 6.16 | |
| 102.10 | G01AX14 | laktobacillus a estriol – vaginální tablety | vag. | 1.00 | DF | 16.13 | |
| 102.11 | G02CC03 | benzydamin hydrochlorid | vag. | 1.00 | DF | 8.00 | |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 103 | Iléčiva zvyšující tonus dělohy | |
|-----|--------------------------------|--|

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- d) v poporodním období při závažné metrorragii.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|-------|----|--------|-----|
| 103.1 | G02AB01 | methylergometrin | parent. | 0.20 | MG | 18.00 | |
| 103.2 | G02AB02 | ergotové alkaloidy | p.o. | 0.20 | MG | 1.12 | |
| 103.3 | G02AB03 | ergometrin | p.o. | 0.20 | MG | 1.12 | |
| 103.4 | G02AB03 | ergometrin | parent. | 0.20 | MG | 9.38 | |
| 103.5 | G02AD01 | dinoprost | parent. | 25.00 | MG | 651.85 | K/P |
| 103.6 | G02AD02 | dinoproston | p.o. | 0.50 | MG | 84.02 | H |

57150 PROSTIN E 2 tbl 10x0.5mg PPU B

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 103.7 | G02AD02 | dinoproston | parent. | 0.50 | MG | 389.86 | K/P |
| 103.8 | G02AD02 | dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně) | vag. | 1.00 | DF | 770.00 | K/P |
| 103.9 | G02AD02 | dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně) | vag. | 1.00 | DF | 1 111.90 | K/P |
| 103.10 | G02AD02 | dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce) | vag. | 1.00 | DF | 357.19 | K/P |

02289 PROSTIN E2 tbl vag 4x3mg PPU B

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|-----------------|------|----|----------|-----|
| 103.11 | G02AD02 | dinoproston (pesar) | vag. | 1.00 | DF | 2 200.00 | K/P |
| 103.12 | G02AD04 | karboprost | parent. | 0.25 | MG | 633.92 | K/P |
| 10734 | PROSTIN 15 M INJ. | | inj 1x1ml/250rg | PPU | B | | |
| 103.13 | G02AD05 | sulproston | parent. | 0.50 | MG | 651.85 | K/P |

104 léčiva snižující tonus dělohy

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------|-------|----|-------|-----|
| 104.1 | G02CA | hexoprenalin | p.o. | 1.50 | MG | 10.12 | P |
| 104.2 | G02CA | hexoprenalin | parent. | 25.00 | RG | 45.36 | U/P |
| 46293 | GYNIPRAL 25MCG KONC.PRO PŘ.INF. | inf cnc sol 5x5ml | | NYC | A | | |
| 75463 | GYNIPRAL 10 MCG/2ML | inj sol 5x2ml/10rg | | NYC | A | | |
| 75464 | GYNIPRAL 25MCG KONCEN.ZUR INF. | inf 5x5ml/25rg | | HNP | A | | |
| 104.3 | G02CA01 | ritodrin | p.o. | 40.00 | MG | 23.14 | P |
| 104.4 | G02CA01 | ritodrin | parent. | 40.00 | MG | 45.36 | U/P |
| 104.5 | G02CA03 | fenoterol | p.o. | 20.00 | MG | 23.14 | P |
| 104.6 | G02CA03 | fenoterol | parent. | 0.50 | MG | 45.36 | U/P |

Léčbu hexoprenalinem, ritodrinem a fenoterolem ordinuje gynekolog - parenterální formu při zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, léčbě porodní dystokie, intrapartální akutní tokolýze; - p.o. formu pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|----------|-----|
| 104.7 | G02CX01 | atosiban infuse | parent. | 1.00 | DF | 3 500.00 | U/P |
| 104.8 | G02CX01 | atosiban injekce | parent. | 1.00 | DF | 1 150.00 | U/P |

Atosiban je indikován při předčasné děložní činnosti od 24. týdne gestace do ukončeného 33. týdne těhotenství u těhotných s:
a) diabetes mellitus, b) kardiopatií, c) primární hypotenzi a tendencí ke kolapsovým stavům, d) thyreopatií, e) srdeční arytmii
anebo f) u nichž byla indikována parenterální tokolýza v kontinuálním podání delším než 48 hodin.

105 inhibitory prolaktinu

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------|----|-------|---|
| 105.1 | G02CB | tergurid | p.o. | 1.00 | MG | 5.46 | |
| 105.2 | G02CB01 | bromokriptin | p.o. | 5.00 | MG | 11.43 | |
| 67514 | MEDOCRIPTINE | | tbl 500x2.5mg-l | MOE | CY | | |
| 105.3 | G02CB02 | lisurid | p.o. | 0.60 | MG | 2.49 | |
| 105.4 | G02CB03 | kabergolin | p.o. | 70.00 | RG | 21.49 | P |

Kabergolin je indikován při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků s obsahem bromokriptinu) u nemocných s prolaktin secernujícími adenomy hypofýzy a s hyperprolaktinemii jiného původu, u nemocných s akromeglií reagující na léčbu dopaminergními agonisty a u žen v indikacích vyžadujících zástavu laktace.

Za nedostatečnou účinnost léčiv ze skupiny dopaminergních gonistů se považuje:

- neschopnost navodit klinickou remisi potíží, tj. u žen obnovu menstruačního krvácení a zástava galaktorey, případně u žen přejících si otěhotnět obnova ovulačních cyklů, u mužů potenci,
- neschopnost zabránit růstu prolaktin secernujícího adenomu a u makroadenomů neschopnost zmenšit jeho objem,
- v indikaci zástava laktace nedosažení této zástavy obvyklým dávkováním.

66746 DOSTINEX 0.5MG

tbl 8x0.5mg

PAU I

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|
| 105.5 | G02CB04 | quinagolid | p.o. | 75.00 | RG | 21.49 | Z |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|

106 mužské pohlavní hormony

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|------------------------|
| 106.1 | G03BA03 | testosteron | p.o. | 0.12 | GM | 27.37 | L/END,ONK,GYN, SEX,URN |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|------|------------------------|
| 106.2 | G03BA03 | testosteron | parent. | 18.00 | MG | 8.07 | L/END,ONK,GYN, SEX,URN |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|------|------------------------|

00373 AGOVIRIN-DEPOT

inj 5x2ml/50mg

BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|------------------------|
| 106.3 | G03BB01 | mesterolon | p.o. | 50.00 | MG | 20.04 | L/END,ONK,GYN, SEX,URN |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|------------------------|

107 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 107.1 | G03CA | přirozené a semisyntetické estrogeny prosté, mestranol | p.o. | 0.15 | MG | 3.76 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|
| 107.2 | G03CA03 | estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|---|
| 107.3 | G03CA03 | estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 4.18 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|---|

Estradiol v p.o. lékové formě indikuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- při substituční léčba hypogonadismu žen,
- k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|------|--|
| 107.4 | G03CA04 | estriol | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|---------|------|------|----|------|--|

31315 OVESTIN 2 MG

tbl 30x2mg

ORG NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 107.5 | G03CA57 | přirodní konj. estrogeny (do 300 µg včetně v jedné tabletě nebo tobolce) | p.o. | 1.00 | DF | 2.25 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 107.6 | G03CA57 | přirodní konj. estrogeny (nad 300 µg v jedné tabletě nebo tobolce) | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

108 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|--|
| 108.1 | G03CA03 | estradiol | Parent. | 1.00 | MG | 4.35 | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|--|

00364 AGOFOLLIN

inj sol 5x1ml/5mg

BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 108.2 | G03CA03 | estradiol | vag. | 25.00 | RG | 7,83 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|--------|----|------|---|
| 108.3 | G03CA03 | estradiol (léková forma nosní spray) | inhala. | 300.00 | RG | 5.00 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 108.4 | G03CA03 | estradiol (lékové formy gelů) | transd. | 1.50 | MG | 5.00 | P |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|
| 108.5 | G03CA03 | estradiol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.20 | MG | 2,46 | I |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 108.6 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
| 108.7 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 1.00 | DF | 4.18 | P |
| 108.8 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg/včetně /den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
| 108.9 | G03CA03 | estradiol implantát | parent. | 1.00 | DF | 900.00 | P |

Estradiol v transd., parent. (implantát) a inhal. lékové formě indikuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
 a) při substituční léčbě hypogonadismu žen,
 b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|------|--|
| 108.10 | G03CA03 | estradiol valerat | parent. | 1.00 | MG | 2.37 | |
| 108.11 | G03CA04 | estriol | parent. | 2.00 | MG | 4.30 | |
| 108.12 | G03CA04 | estriol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.20 | MG | 1,50 | |
| 108.13 | G03CA04 | estriol (lékové formy vaginálních tablet, do vag. 0,5 mg včetně) | vag. | 0.20 | MG | 2,14 | |
| 108.14 | G03CA04 | estriol (lékové formy vaginálních tablet, vag. nad 0,5 mg) | vag. | 0.20 | MG | 0,93 | |
| 108.15 | G03CA09 | promestrien (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 10.00 | MG | 3,76 | |
| 108.16 | G03CA09 | promestrien (lékové formy vaginálních tobolek) | vag. | 10.00 | MG | 4,00 | |
| 108.17 | G03CC | promestrien a chlorquinaldol v kombinaci | vag. | 1.00 | DF | 5.50 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|------|------|----|------|---------------------------|
| 109 | ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů | | | | | | |
| 109.1 | G03DA02 | medroxyprogesteron | p.o. | 5.00 | MG | 3.26 | L/GYN,URN,END, INT,SEX |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|------------------------------------|---------|-------|----|-------|-------------------------------|
| 91231 | PROVERA 5 MG | por tbl nob 24x5mg | PPU | B | | | |
| 109.2 | G03DA03 | hydroxyprogesteron | parent. | 10.00 | MG | 1.76 | L/GYN,URN,SEX |
| 109.3 | G03DA04 | progesteron | p.o. | 0.30 | GM | 15.60 | L/GYN,URN,END, INT,SEX |
| 109.4 | G03DA04 | progesteron | parent. | 5.00 | MG | 1.00 | L/GYN,URN,SEX |
| 109.5 | G03DA04 | progesteron (depotní lékové formy) | parent. | 5.00 | MG | 3.85 | L/GYN,URN,SEX |
| 109.6 | G03DA04 | progesteron | transd. | 0.30 | GM | 15.60 | L/GYN,URN,END, INT,SEX |
| 109.7 | G03DB01 | dydrogesteron | p.o. | 10.00 | MG | 5.20 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |
| 109.8 | G03DB04 | nomegestrol | p.o. | 5.00 | MG | 5.20 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |
| 109.9 | G03DC02 | norethisteron | p.o. | 5.00 | MG | 2.81 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |

109.10 G03DC03 lynestrenol p.o. 5.00 MG 2.81 U/GYN,URN,END, INT,SEX,GER

109.11 G03DC05 tibolon p.o. 2.50 MG 14.50 P

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

110 kombinace ženských pohlavních hormonů

110.1 G03EA02 testosterone estrogen parent. 1.00 DF 22.23 L/GYN,END,SEX

00464 FOLIVIRIN inj 5x2ml BTA SK

110.2 G03EA03 prasteron enantat/estradiol valerat parent. 1.00 DF 73.32 L/GYN,END,SEX

110.3 G03FA01 norethisteron a estrogen, fixní kombinace transd. 1.00 DF 4.50

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 110.4 | G03FA01 | norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 110.5 | G03FA01 | norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 110.6 | G03FA12 | medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem do 1 mg estrogenu včetně | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 110.7 | G03FA12 | medroxyprogesteron a estrogen, fixní s obsahem nad 1 mg | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

110.8 G03FA14 dydrogesteron a estradiol, fixní kombinace p.o. 1.00 DF 4.50

110.9 G03FA15 dienogest a estradiol, fixní kombinace p.o. 1.00 DF 4.50

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 110.10 | G03FB | gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 110.11 | G03FB05 | norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 110.12 | G03FB05 | norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky | transd. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|---------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 110.13 | G03FB06 | medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 110.14 | G03FB08 | dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinace | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 110.15 | G03FB09 | levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinace | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|------|--|
| 110.16 | G03FB09 | levonorgestrel a estrogen, sekvenční pripravky | transd. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|--------|---------|---|---------|------|----|------|--|

110-17 C621LR01 suprarenal(estradiol) 1.00 DE 1.50

111 gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|---|--------|--------------------|
| 111.1 | G03GA01 | choriový gonadotrofin (do 500 U v 1ampuli včetně) | parent. | 250.00 | U | 24.59 | L/GYN,END,PED, SEX |
| 111.2 | G03GA01 | choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1ampuli) | parent. | 250.00 | U | 10.71 | L/GYN,END,PED, SEX |
| 111.3 | G03GA01 | choriový gonadotrofin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně) | parent. | 250.00 | U | 14.98 | L/GYN,END,PED, SEX |
| 111.4 | G03GA01 | rekombinantrní choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli) | parent. | 250.00 | U | 19.60 | L/GYN,END,PED, SEX |
| 111.5 | G03GA02 | gonadotrofin lidský | parent. | 75.00 | U | 313.26 | Z |

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|----|
| 12979 | MENOGON | inj sic 10+10xsolv. | FEI | D |
| 15203 | MERIONAL 75 M.J. | inj pso lqf 1x75ut | ISR | CZ |
| 15204 | MERIONAL 75 M.J. | inj pso lqf 10x75ut | ISR | CZ |
| 43727 | MERIONAL 75 M.J. | inj sic 1x75ut+solv | IBS | CH |
| 43728 | MERIONAL 75 M.J. | inj sic 10x75ut+sol | IBS | CH |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|--------------------|
| 111.6 | G03GA04 | urofollitrofin | parent. | 75.00 | U | 381.40 | Z |
| 111.7 | G03GA04 | urofollitrofin vysoce čištěný | parent. | 75.00 | U | 488.79 | Z |
| 111.8 | G03GA05 | folitrofin alfa | parent. | 75.00 | U | 733.19 | Z |
| 111.9 | G03GA06 | folitrofin beta | parent. | 75.00 | U | 733.19 | Z |
| 111.10 | G03GA07 | lutropin alfa (rekombinantrní lidský luteinizační hormon) | parent. | 75.00 | U | 733.19 | Z |
| 111.11 | G03GB02 | klomifen | p.o. | 9.00 | MG | 1.24 | L/GYN,END,SEX, URN |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------|------|----|--------|----------------|
| 112 | ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů | | | | | | |
| 112.1 | G03HA01 | ciproteron | parent. | 0.10 | GM | 121.67 | L/PSY,SEX, URN |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--|------|------|----|--------|------------------------|
| 03783 | ANDROCUR-50 | tbl 50x50mg | SAG | D | | | |
| 32094 | CYPROPLEX | por tbl nob 30x50mg | PHM | NL | | | |
| 32095 | CYPROPLEX | por tbl nob 50x50mg | PHM | NL | | | |
| 32096 | CYPROPLEX | por tbl nob 50x50mg | PHM | NL | | | |
| 59354 | ANDROCUR 100 | tbl obd 50x100mg | SUE | F | | | |
| 112.2 | G03HA01 | ciproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 166.20 | |
| 112.3 | G03HA01 | ciproteron (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 55.60 | |
| 112.4 | G03XA01 | danazol | p.o. | 0.60 | GM | 78.16 | L/GYN,END,HEM, ALG,SEX |
| 112.5 | G03XA02 | gestrinon | p.o. | 0.70 | MG | 46.26 | L/GYN,END,HEM, ALG,SEX |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------|------|------|----|-------|--|
| 113 | jiná urologika včetně spasmolytik | | | | | | |
| 113.1 | G04AB01 | kyselina nalidixová | p.o. | 4.00 | GM | 8.55 | |
| 113.2 | G04AB03 | kyselina pipemidová | p.o. | 0.80 | GM | 19.55 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|-------------------------|
| 113.3 | G04AC02 | nifurtinol | p.o. | 0.16 | GM | 2.58 | |
| 113.4 | G04BD02 | flavoxat | p.o. | 0.80 | GM | 12.96 | L/URN,GYN,SEX, GER |
| 113.5 | G04BD04 | oxybutynin | p.o. | 15.00 | MG | 12.96 | L/URN,GYN,SEX GER, PED |
| 113.6 | G04BD04 | oxybutynin | transd. | 1 | DF | 37,20 | L/URN,GYN,SEX GER, PED |
| 113.7 | G04BD06 | propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 15.00 | MG | 11.70 | L/URN,GYN,SEX, PED, GER |
| 113.8 | G04BD06 | propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 15.00 | MG | 5.20 | L/URN,GYN,SEX, GER |
| 113.9 | G04BD07 | tolterodin | p.o. | 4.00 | MG | 40.00 | P |

Léčiva s obsahem tolterodinu jsou indikovaná urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro závažné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snižení urgentních nebo inkontinentních eposid o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře (počet mikcí 10 a více za 24 hodin, z toho minimálně 1 mikce za noc, nejméně 1 episodaurgence, nebo 1 episoda inkontinence za 24 hodin) či urgentní inkontinence bez polakisurii. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskarinky: pokud je frekvence inkontinetních nebo urgentních episod snížena o více než 50%, nebo frekvence mikcí o více než 20%, lze terapii tolterodinem dále hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|------|-------|----|-------|---|
| 113.10 | G04BD09 | trospium chlorid | p.o. | 40.00 | MG | 11.84 | |
| 12525 | SPASMEX 5 | tbl 30x5mg | PFL | D | | | |
| 12526 | SPASMEX 5 | tbl 50x5mg | PFL | D | | | |
| 12527 | SPASMEX 15 | tbl 30x15mg | PFL | D | | | |
| 12528 | SPASMEX 15 | tbl 50x15mg | PFL | D | | | |
| 113.11 | G04BD08 | solifenacin | p.o. | 5.00 | MG | 40.00 | P |

Léčiva s obsahem solifenacigu jsou indikovaná urologem a gynekologem při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snižení urgentních nebo inkontinentních eposid o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin, tolterodin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře (počet mikcí 10 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizodaurgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinence bez polakisurii.

Po 3 měsících terapie solifenacinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskarinky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních episod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních episod nejméně o 50%, je možné v terapii solifenacinem pokračovat a terapie bude nadále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|
| 113.12 | G04BD09 | duloxetin | p.o. | 80.00 | MG | 46.00 | P |
|--------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|

Léčiva s obsahem duloxetinu jsou indikovaná urologem nebo gynekologem u pacientek starších 18 let s prokázanou stresovou inkontinenčí moči I a II stupně (některým z těchto vyšetření: urodynamicckým, UZ a PWT), u kterých není primárně indikována chirurgická léčba. Po 3 měsících léčby duloxetinem je zhodnocen stav pacientky. Pokud frekvence eposid mimovolního úniku moči za týden poklesne pod 50% (za poslední týden před kontrolou), je léčba duloxetinem plně indikována a bude nadále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Po 6 měsících léčby je stav opět vyhodnocen (kritéria pro toto hodnocení jsou dotazník s počtem eposid inkontinence), užívání duloxetinu se přeruší na 1 měsíc a stav pacientky je opět vyhodnocen (celkový zdravotní stav, změna frekvence urgencí nebo eposid úniku moči a vedlejší účinky léku). Pokud ústup obtíží bude přetrvávat po dobu alespoň 1 měsíce i po vysazení duloxetinu, bude tato léčba ukončena a pacientka bude pozvána na kontrolu za 3 měsíce. Pokud dojde během 1-měsíčního přerušení léčby duloxetinem k obnovení obtíží (v původním rozsahu nebo ještě horším) je další podávání duloxetinu indikováno a hrazeno a to po dobu pokračování účinků léčby, tzn. snížení množství eposid úniku moči pod 50% výchozí hodnoty. Kontroly pacientky u specialisty (urologa nebo gynekologa) jsou nutné každé 3 měsíce ke zhodnocení účinků léčby a stavu pacientky. Pokud léčba trvá déle než 1 rok, je nutné kontrolní vyšetření pacientky (urodynamiccké event. UZ a vyhodnocení PWT).

| | |
|-----|---|
| 114 | Iléčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty a ostatní gynekologa |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 114.1 | C02CA04 | doxazosin – neretardované formy | p.o. | 4.00 | MG | 12.75 | L/URN |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----|-----|
| 64797 | KAMIREN 4 | tbl 30x4mg | KRK | SLO |
| 64798 | KAMIREN 2 | tbl 30x2mg | KRK | SLO |
| 45214 | ZOXON 2 | por tbl nob 30x2mg | ZEH | CZ |
| 45215 | ZOXON 4 | por tbl nob 30x4mg | ZEH | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|-------|
| 114.2 | C02CA04 | doxazosin-retardované formy do 4 mg/p.o. v jedné tabletě včetně | | 4.00 | MG | 14.40 | L/URN |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|-------|
| 114.3 | C02CA04 | doxazosin-retardované formy nad 4 mg/p.o. v jedné tabletě | | 4.00 | MG | 10.20 | L/URN |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 114.4 | G04CA01 | alfuzosin | p.o. | 7.50 | MG | 15.00 | L/URN |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|-------|-------|
| 114.5 | G04CA01 | alfuzosin (SR nebo retardované formy) | p.o. | 10.00 | MG | 15.00 | L/URN |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 114.6 | G04CA02 | tamsulosin | p.o. | 0.40 | MG | 15.00 | L/URN |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 114.7 | G04CA03 | terazosin | p.o. | 5.00 | MG | 12.75 | L/URN |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 114.8 | G04CB01 | finasterid | p.o. | 5.00 | MG | 15.00 | L/URN |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 114.9 | G04CX01 | extrakt Pyg. africanum | p.o. | 2.00 | DF | 10.80 | L/URN |
|-------|---------|------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 114.10 | G04CX02 | extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně) | p.o. | 1.00 | DF | 10.80 | L/URN |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 114.11 | G04CX02 | extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně) | p.o. | 2.00 | DF | 10.80 | L/URN |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|-------|
| 114.12 | G04CX03 | mepartacin | p.o. | 150.00 | KU | 15.00 | L/URN |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 115 | ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|--|
| 115.1 | G04BC | rozpuštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet) | p.o. | 4.00 | DF | 17.72 | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|------------|------------|-----|---|
| 60046 | BLEMAREN N | tbl eff 80 | EPF | D |
|-------|------------|------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|-------|----|------|--|
| 115.2 | G04BC | rozpuštědla močových kamenů (ve formě prášku) | p.o. | 10.00 | GM | 6.58 | |
|-------|-------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 116 | hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-------|
| 116.1 | H01AA02 | tetrakosaktid (nedepotní lékové formy) | parent. | 0.25 | MG | 59.93 | L/END |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|---|--------|------|
| 116.2 | H01AC01 | somatropin | parent. | 2.00 | U | 602.76 | L/J5 |
|-------|---------|------------|---------|------|---|--------|------|

| | | | | |
|-------|---------------------------|--------------------|-----|---|
| 61229 | GENOTROPIN 16 M.J.(5.3MG) | inj pso lqf 5x16ut | PHA | S |
|-------|---------------------------|--------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|---|
| 66752 | GENOTROPIN 36 M.J.(12MG) | inj pso lqf 5x36ut | PHA | S |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 117 | hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 117.1 | H01BA02 | desmopresin | parent. | 4.00 | RG | 82.41 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 117.2 | H01BA02 | desmopresin (nosní kapky) | lok. | 25.00 | RG | 23.53 | |
|-------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|--|

02634 ADIURETIN

gtt nas 1x5ml/0.5mg FRL CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|--------|----|--------|---|
| 117.3 | H01BA02 | desmopresin (nosní spray) | lok. | 25.00 | RG | 23.53 | |
| 117.4 | H01BA02 | desmopresin (pevné lékové formy) | p.o. | 400.00 | RG | 125.00 | P |

Léčba desmopresinem v tabletách je indikovaná u nemocných s diabetes insipidus, kde není možná aplikace desmopresinu intranasálně vzhledem k závažnému postižení nosní sliznice nebo v případě slepoty nemocného.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 117.5 | H01BA04 | terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 288.08 | H |
| 117.6 | H01BA04 | terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 245.27 | H |
| 117.7 | H01BA05 | ormipresin | parent. | 5.00 | U | 27.57 | H |
| 117.8 | H01BB02 | oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | U | 49.20 | H |
| 117.9 | H01BB02 | oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | U | 21.96 | H |

118 hormony hypotalamu a jejich analogia

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|---------|---|
| 118.1 | H01AX01 | pegvisomant | parent. | 10.00 | MG | 2256.30 | Z |
| 118.2 | H01CA01 | gonadorelin (nasálně) | lok. | 1.20 | MG | 203.34 | Z |
| 118.3 | H01CA02 | nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně) | lok. | 0.40 | MG | 134.00 | Z |

45481 SYNAREL

spr nas 1x4ml/30dag SEA POR

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|----------|----|----------|---|
| 118.4 | H01CA02 | nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně) | lok. | 0.40 | MG | 104.40 | Z |
| 118.5 | H01CB01 | somatostatin | parent. | 6.00 | MG | 7 688.40 | X |
| 118.6 | H01CB02 | oktreetid | parent. | 1.00 | MG | 4 000.00 | H |
| 118.7 | H01CB02 | oktreetid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 10 mg | parent. | 357.00 | RG | 1 276.70 | X |
| 118.8 | H01CB02 | oktreetid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 20 mg | parent. | 714.00 | RG | 1 557.00 | X |
| 118.9 | H01CB02 | oktretid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 30 mg | parent. | 1 072.00 | RG | 1 832.00 | X |
| 118.10 | H01CB03 | lantretoid s obsahem 120mg | parent. | 4.29 | MG | 2 077.43 | X |
| 118.11 | H01CB03 | lantretoid s obsahem 30mg | parent. | 2.14 | MG | 1 557.00 | X |
| 118.12 | H01CB03 | lantretoid s obsahem 60mg | parent. | 2.14 | MG | 1 522.01 | X |
| 118.13 | H01CB03 | lantretoid s obsahem 90mg | parent. | 3.21 | MG | 1 800.86 | X |
| 118.14 | H01CC01 | ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu) | parent. | 0.25 | MG | 1 440.00 | Z |
| 118.15 | H01CC02 | cetrorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuli | parent. | 0.25 | MG | 1 440.00 | Z |
| 118.16 | H01CC02 | cetrorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuli | parent. | 0.25 | MG | 600.30 | Z |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|---------|-------|----|-------|---|
| 119 | kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání | | | | | | |
| 119.1 | H02AA02 | fludrokortison | p.o. | 0.10 | MG | 4.76 | |
| 119.2 | H02AB01 | betamethason | p.o. | 1.50 | MG | 3.42 | |
| 119.3 | H02AB02 | dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více) | p.o. | 1.50 | MG | 9.29 | |
| 119.4 | H02AB02 | dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | MG | 3.42 | |
| 119.5 | H02AB07 | prednison | p.o. | 10.00 | MG | 2.80 | |
| 02963 | PREDNISON 20 LÉČIVA | tbl 20x20mg-blistr | LEX | | | | |
| 119.6 | H02AB08 | triamcinolon | p.o. | 7.50 | MG | 2.74 | |
| 119.7 | H02AB09 | hydrokortison | p.o. | 30.00 | MG | 6.97 | |
| 119.8 | H02AB10 | kortison | p.o. | 37.50 | MG | 5.07 | |
| 120 | kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 120.1 | H02AB | mazipredon | parent. | 30.00 | MG | 17.79 | O |
| 120.2 | H02AB01 | betamethason (depotní lékové formy) | parent. | 0.40 | MG | 3.28 | O |
| 120.3 | H02AB02 | dexamethason (40 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 24.50 | O |
| 120.4 | H02AB02 | dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.50 | MG | 1.56 | O |
| 01673 | DEXAMED | inj 100x2ml/8mg | MOE | CY | | | |
| 46037 | DEXONA | inj 6x2ml 4mg/ml | CAI | IND | | | |
| 46038 | DEXONA | inj 8x6x2ml | CAI | IND | | | |
| 84090 | DEXAMED | inj 10x2ml/8mg | MOE | CY | | | |
| 120.5 | H02AB04 | methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 20.00 | MG | 29.49 | O |
| 120.6 | H02AB04 | methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 20.00 | MG | 15.25 | O |
| 120.7 | H02AB04 | methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 20.00 | MG | 22.11 | O |
| 120.8 | H02AB06 | prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | MG | 17.46 | O |
| 120.9 | H02AB06 | prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | MG | 12.51 | O |
| 120.10 | H02AB07 | prednison (do 10 mg včetně) | p.rect. | 10.00 | MG | 17.30 | |
| 120.11 | H02AB07 | prednison (nad 10 do 30 mg včetně) | p.rect. | 10.00 | MG | 8.16 | |
| 120.12 | H02AB07 | prednison (nad 30 mg) | p.rect. | 10.00 | MG | 4.59 | |
| 120.13 | H02AB08 | triamcinolon | parent. | 7.50 | MG | 13.64 | O |
| 120.14 | H02AB09 | hydrokortison | parent. | 30.00 | MG | 11.19 | O |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---------|--------|----|--------|-------|
| 121 | hormony štítné žlázy a jódová terapie | | | | | | |
| 121.1 | H03AA | hormony štítné žlázy | p.o. | 1.00 | DF | 2.12 | |
| 61160 | JODTHYROX | tbl 50 | MEC | D | | | |
| 61161 | JODTHYROX | tbl 100 | MEC | D | | | |
| 121.2 | H03AA01 | levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | MG | 1.86 | |
| 69189 | EUTHYROX 50 | tbl 100x50rg | MEC | D | | | |
| 47141 | LETROX 50 | tbl 100x50rg | MEC | D | | | |
| 121.3 | H03AA01 | levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | MG | 1.09 | |
| 69191 | EUTHYROX 150 | tbl 100x50rg | MEC | D | | | |
| 121.4 | H03AA01 | levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | MG | 1.37 | |
| 97186 | EUTHYROX 100 | tbl 100x100rg | MEC | D | | | |
| 121.5 | H03AA02 | liothyronin sodný | p.o. | 0.06 | MG | 4.40 | |
| 121.6 | H03AA03 | kombinace levothyroxinu a liothyroninu | p.o. | 1.00 | DF | 1.69 | |
| 03875 | THYREOTOM | tbl 60x50rg | BCC | D | | | |
| 121.7 | H03CA | jódová terapie | p.o. | 200.00 | RG | 1.76 | |
| 61158 | JODID 100 | tbl 100 | MEC | D | | | |
| 61159 | JODID 200 | tbl 100 | MEC | D | | | |
| 122 | Tyreostatika | | | | | | |
| 122.1 | H03BA02 | propylthiouracil | p.o. | 0.10 | GM | 6.94 | |
| 14914 | PROPYCIL 50 | por tbl nob100x50mg | HPB | D | | | |
| 122.2 | H03BB01 | karbimazol | p.o. | 15.00 | MG | 2.93 | |
| 00066 | CARBIMAZOL-SLOVAKOFARMA | tbl 100x5mg | ZEH | SK | | | |
| 122.3 | H03BB02 | thiamazol | p.o. | 10.00 | MG | 2.83 | |
| 122.4 | H03BB02 | thiamazol | parent. | 10.00 | MG | 4.50 | H |
| 122.5 | H03BC01 | perchlorát draselný | p.o. | 0.20 | GM | 1.66 | |
| 123 | glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva | | | | | | |
| 123.1 | H04AA01 | glukagon | parent. | 1.00 | MG | 404.62 | L/DIA |
| 123.2 | H04AA01 | glukagon (ve formě hypokit) | parent. | 1.00 | MG | 819.51 | L/DIA |
| 83741 | GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT | inj sic 1mg+sol+stř | NOO | DK | | | |
| 123.3 | H05AA02 | teriparatid | parent. | 20.00 | RG | 390.00 | X |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|--------|---|--------|-----------------------|
| 123.4 | H05BA01 | kalcitonin (lososí) | parent. | 100.00 | U | 118.09 | L/INT,ORT, END,GER |
|-------|---------|---------------------|---------|--------|---|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|--------|--------|---|-------|---|
| 123.5 | H05BA01 | kalcitonin (lososí) | inhal. | 200.00 | U | 61.20 | P |
|-------|---------|---------------------|--------|--------|---|-------|---|

Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, revmatolog, gynekolog a endokrinolog u osteoporózy dokumentované denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stav výrazně s algickým (bolestivým) syndromem, nereagující na běžnou analgetickou terapii. Po 3.měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|---|--------|-----------------------|
| 123.6 | H05BA03 | kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | U | 125.37 | L/INT,ORT, END,GER |
|-------|---------|---|---------|--------|---|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|---|--------|-----------------------|
| 123.7 | H05BA03 | kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | U | 157.39 | L/INT,ORT, END,GER |
|-------|---------|--|---------|--------|---|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|
| 123.8 | H05BX01 | cinacalcet | p.o. | 60.00 | MG | 392.45 | X |
|-------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 124 | ostatní léčiva ze skupiny hormonů | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 124.1 | H02AB04 | methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 7.50 | MG | 3.42 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 124.2 | H02AB04 | methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě) | p.o. | 7.50 | MG | 4.79 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

86606 MEDROL 16 MG por tbl nob50x16mg-b PPU B

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 125 | tetracyklinová a amfenikolová antibiotika | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 125.1 | J01AA02 | doxycyklin | p.o. | 0.10 | GM | 3.92 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----|---|
| 04013 | DOXYBENE 200 MG TABLETY | por tbl nob10x200mg | MCK | D |
| 12737 | DOXYHEXAL 200 TABS | tbl 10x200mg | SFS | D |
| 12738 | DOXYHEXAL 200 TABS | tbl 20x200mg | SFS | D |
| 32953 | DOXYHEXAL TABS | tbl 10x100mg | SFS | D |
| 32954 | DOXYHEXAL TABS | tbl 20x100mg | SFS | D |
| 47718 | DOXYCYCLIN AL 100 | tbl 10x100mg | APA | D |
| 47719 | DOXYCYCLIN AL 100 | tbl 20x100mg | APA | D |
| 47720 | DOXYCYCLIN AL 200 | tbl 10x200mg | APA | D |
| 97654 | DOXYBENE 100 MG | cps 10x100mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 125.2 | J01AA02 | doxycyklin | parent. | 0.10 | GM | 91.28 | K |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 125.3 | J01AA04 | lymecyklin | p.o. | 0.60 | GM | 3.92 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|------|--|
| 125.4 | J01AA06 | oxytetracyklin | p.o. | 1.00 | GM | 3.92 | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 125.5 | J01AA07 | tetracyklin | p.o. | 1.00 | GM | 3.92 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 125.6 | J01AA08 | minocyklin | p.o. | 0.20 | GM | 7.84 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-------|---|
| 125.7 | J01AA09 | rolitetracyklin | parent. | 0.35 | GM | 94.63 | K |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 125.8 | J01AA | doxycyklin v kombinaci s ambroxolem | p.o. | 1.00 | DF | 6.17 | |
|-------|-------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|-------|--|
| 125.9 | J01BA01 | chloramfenikol | p.o. | 3.00 | GM | 25.88 | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|------|----|--------|---|
| 125.10 | J01BA01 | chloramfenikol | parent. | 3.00 | GM | 267.93 | K |
|--------|---------|----------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---------|------|----|--------|---|
| 125.11 | J01BA02 | thiamphenikol | parent. | 1.50 | GM | 176.31 | K |
|--------|---------|---------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 126 | peniciliny se širokým spektrem, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 126.1 | J01CA01 | ampicilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 14.13 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 126.2 | J01CA01 | ampicilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 17.20 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 126.3 | J01CA04 | amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 gm v 1tabletě včetně | p.o. | 1.00 | GM | 10.10 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------|-----|---|--|--|--|
| 32557 | OSPAMOX 500 MG | por tbl film14x500mg | SZK | A | | | |
| 44337 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 10x500mg | HHC | D | | | |
| 44338 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 20x500mg | HHC | D | | | |
| 66364 | OSPAMOX 250MG | cps 12x250mg | SZK | A | | | |
| 66368 | OSPAMOX 500 MG | por tbl film12x500mg | SZK | A | | | |
| 17628 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 10x500mg | SFS | D | | | |
| 176629 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 20x500mg | SFS | D | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 126.4 | J01CA04 | amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 gm v 1tabletě | p.o. | 1.00 | GM | 9.06 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| 17623 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 10x1000mg | SFS | D | | | |
| 17624 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 20x1000mg | SFS | D | | | |
| 17625 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 50x1000mg | SFS | D | | | |
| 17630 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 10x750mg | SFS | D | | | |
| 17632 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 50x750mg | SFS | D | | | |
| 32558 | OSPAMOX 750 MG | por tbl film14x750mg | SZK | A | | | |
| 32559 | OSPAMOX 1000 MG | por tbl film14x1000mg | SZK | A | | | |
| 44339 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 10x750mg | HHC | D | | | |
| 44341 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 50x750mg | HHC | D | | | |
| 44342 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 10x1000mg | HHC | D | | | |
| 44343 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 20x1000mg | HHC | D | | | |
| 44344 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 50x1000mg | HHC | D | | | |
| 65929 | AMOXICILLIN AL 1000 | tbl obd 10x1000mg | APA | D | | | |
| 65958 | AMOXICILLIN AL 1000 | tbl obd 20x1000mg | APA | D | | | |
| 66369 | OSPAMOX 750 MG | por tbl film12x750mg | SZK | A | | | |
| 66370 | OSPAMOX 1000 MG | por tbl film12x1000mg | SZK | A | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 126.5 | J01CA04 | amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech) | p.o. | 1.00 | GM | 11.67 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-----|----|--|--|--|
| 17620 | AMOXIHEXAL | plv sus 1x100ml | SFS | D | | | |
| 17622 | AMOXIHEXAL FORTE | plv sus 1x100ml | SFS | D | | | |
| 44345 | AMOXIHEXAL | plv sus 1x100ml | AAG | D | | | |
| 44347 | AMOXIHEXAL FORTE | plv sus 1x100ml | AAG | D | | | |
| 62050 | DUOMOX 500 | tbl 20x500mg | YEU | NL | | | |
| 62053 | DUOMOX 375 | tbl 20x375mg | YEU | NL | | | |
| 66366 | OSPAMOX 250MG/5ML | gra sus 1x60ml | SZK | A | | | |
| 66367 | OSPAMOX 375MG/5ML | gra sus 1x60ml | SZK | A | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 126.6 | J01CA04 | amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech) | p.o. | 1.00 | GM | 10.00 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 126.7 | J01CA06 | bakampicilin | p.o. | 1.20 | GM | 16.62 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 127 | peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 127.1 | J01CA01 | ampicilin | parent. | 2.00 | GM | 43.35 | K |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 129.1 | J01CE01 | benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně) | parent. | 3.60 | GM | 121.29 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

01093 PENICILIN G 1.0 DRAS.SOL BIOT. inj sic 10x1mu BTA SK
 02136 PENICILIN G 0.5 DRAS.SOL BIOT. inj sic 10x500ku BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 129.2 | J01CE01 | benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli) | parent. | 3.60 | GM | 49.06 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 129.3 | J01CE08 | benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně) | parent. | 2.00 | MU | 70.63 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 129.4 | J01CE08 | benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli) | parent. | 2.00 | MU | 26.93 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 129.5 | J01CE09 | prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně) | parent. | 2.00 | MU | 79.58 | K |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 129.6 | J01CE09 | prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce) | parent. | 2.00 | MU | 38.84 | K |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 129.7 | J01CE30 | kombinace | parent. | 0.50 | DF | 10.31 | K |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 130 | | peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.1 | J01CF02 | cloxacilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 28.74 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.2 | J01CF02 | cloxacilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 39.98 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.3 | J01CF04 | oxacilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 28.74 | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.4 | J01CF04 | oxacilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 39.98 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 130.5 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 30.20 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 130.6 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 1 g v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | GM | 20.63 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 130.7 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | GM | 27.50 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 130.8 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg do 1 g v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 25.80 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 130.9 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 39.60 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 130.10 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml) | p.o. | 1.00 | GM | 30.00 | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|

32434 BETAKLAV por plv sus1x100ml KRK SLO

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.11 | J01CR04 | sultamicilin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.50 | GM | 77.18 | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.12 | J01CR04 | sultamicilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.50 | GM | 80.90 | |
|--------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------|------|----|--------|-------|
| 131 | jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání | | | | | | |
| 131.1 | J01DB01 | cefalexin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 38.13 | |
| 131.2 | J01DB01 | cefalexin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 39.53 | |
| 66357 | OSPEXIN 1000MG | | tbl obd 12x1000mg | BCA | A | | |
| 131.3 | J01DC02 | cefuroxim axetil (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 87.73 | |
| 131.4 | J01DC02 | cefuroxim axetil (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 134.70 | |
| 131.5 | J01DC04 | cefaclor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 57.45 | |
| 131.6 | J01DC04 | cefaclor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 53.80 | |
| 131.7 | J01DC04 | cefaclor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 84.00 | |
| 131.8 | J01DC04 | cefaclor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml) | p.o. | 1.50 | GM | 70.20 | |
| 131.9 | J01DB05 | cefadroxil (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 38.13 | |
| 131.10 | J01DB05 | cefadroxil (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 40.92 | |
| 131.11 | J01DD08 | cefixim | p.o. | 0.40 | GM | 91.00 | ATB |
| 131.12 | J01DD10 | ceftetamet | p.o. | 1.00 | GM | 91.00 | ATB |
| 131.13 | J01DD13 | cefpodoxim | p.o. | 0.40 | GM | 87.73 | ATB |
| 131.14 | J01DD14 | ceftibuten | p.o. | 0.40 | GM | 87.73 | ATB |
| 131.15 | J01DC10 | ceprozil (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 87.73 | |
| 131.16 | J01DC10 | ceprozil (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 134.70 | |
| 132 | jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 132.1 | J01CF04 | oxacilin | parent. | 2.00 | GM | 95.80 | K |
| 132.2 | J01DD62 | cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 2.00 | GM | 397.00 | U/ATB |
| 132.3 | J01DB03 | cefalotin | parent. | 4.00 | GM | 125.17 | U/ATB |
| 132.4 | J01DB04 | cefazolin | parent. | 3.00 | GM | 120.93 | U/ATB |
| 02205 | CEFAZOLINE PANPHARMA | inj sic 25x1gm | LPA | F | | | |
| 84018 | CEFAZOLINE PANPHARMA | inj sic 50x1gm | LPA | F | | | |
| 85510 | VULMIZOLIN 1.0 | inj sic 50x1gm | BTA | SK | | | |
| 91148 | VULMIZOLIN 1.0 | inj sic 10x1gm | BTA | SK | | | |
| 132.5 | J01DC01 | cefoxitin | parent. | 6.00 | GM | 937.79 | U/ATB |
| 132.6 | J01DC02 | cefuroxim | parent. | 4.00 | GM | 329.10 | U/ATB |
| 132.7 | J01DC04 | ceframandol | parent. | 6.00 | GM | 575.27 | U/ATB |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|-----------------------------------|
| 132.8 | J01DD01 | cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM | 477.44 | U/ATB |
| 132.9 | J01DD01 | cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM | 440.56 | U/ATB |
| 132.10 | J01DD02 | ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM | 1 736.18 | U/ATB |
| 132.11 | J01DD02 | ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM | 1 679.42 | U/ATB |
| 132.12 | J01DD03 | cefsulodin | parent. | 6.00 | GM | 615.68 | U/ATB |
| 132.13 | J01DD04 | ceftriaxon | parent. | 2.00 | GM | 508.60 | ambulantně: K/P ústavně: U/ATB |

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog k:

- a) inciální léčbě bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- b) léčbě Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložen laboratorním vyšetřením),
- c) léčbě nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosovalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|---------|------|----|----------|-------|
| 132.14 | J01DD07 | ceftizoxim | parent. | 4.00 | GM | 615.68 | U/ATB |
| 132.15 | J01DE01 | cefepim | parent. | 4.00 | GM | 1 445.00 | U/ATB |
| 132.16 | J01DB08 | cefapirin | parent. | 4.00 | GM | 194.73 | U/ATB |
| 132.17 | J01DD12 | cefoperazon | parent. | 6.00 | GM | 1 297.00 | U/ATB |
| 132.18 | J01DE02 | cefpiprom | parent. | 4.00 | GM | 1 638.40 | U/ATB |
| 132.19 | J01DF01 | aztreonam | parent. | 4.00 | GM | 1 645.60 | U/ATB |
| 132.20 | J01DH | ertapenem | parent. | 1.00 | GM | 1 885.39 | U/ATB |
| 132.21 | J01DH02 | meropenem | parent. | 2.00 | GM | 2 194.52 | U/ATB |
| 132.22 | J01DH51 | imipenem a inhibitor enzymu | parent. | 2.00 | GM | 2 238.99 | U/ATB |

133 sulfonamidy a trimetoprim

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 133.1 | J01EA01 | trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě) p.o. včetně) | p.o. | 0.40 | GM | 11.60 | |
| 89813 TRIPRIM 100MG tbl 20x100mg MCK D | | | | | | | |
| 133.2 | J01EA01 | trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě) p.o. | p.o. | 0.40 | GM | 8.94 | |
| 133.3 | J01EB05 | sulfafurazol | p.o. | 4.00 | GM | 13.64 | |
| 133.4 | J01EE01 | sulfamethoxazol a trimethoprim | parent. | 1.92 | GM | 127.04 | K |
| 133.5 | J01EE01 | sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.92 | GM | 6.40 | |
| 133.6 | J01EE01 | sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.92 | GM | 17.06 | |
| 133.7 | J01EE01 | sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 22.39 | |
| 133.8 | J01EE03 | sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 6.94 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 133.9 | J01EE03 | sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 23.07 | |
| 133.10 | J01EE04 | sulfamoxol a trimethoprim (pevné lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 6.94 | |
| 133.11 | J01EE04 | sulfamoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 23.07 | |
| 133.12 | J01EE05 | sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 6.94 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|--------|----|--------|-------|
| 134 | makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy | | | | | | |
| 134.1 | J01FA | telithromycin | p.o. | 800.00 | MG | 96.80 | U/ATB |
| 134.2 | J01FA01 | erythromycin | parent. | 1.00 | GM | 717.50 | K |
| 134.3 | J01FA01 | erythromycin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 19.09 | |
| 134.4 | J01FA01 | erythromycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 33.69 | |
| 134.5 | J01FA02 | spiramycin | p.o. | 3.00 | GM | 42.75 | |
| 134.6 | J01FA02 | spiramycin | parent. | 4.50 | MU | 653.19 | K |
| 134.7 | J01FA05 | oleandomycin | p.o. | 1.00 | GM | 14.59 | |
| 134.8 | J01FA06 | roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 38.67 | |
| 134.9 | J01FA06 | roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 31.60 | |

10855 ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG por tbl flm10x150mg MCK D

10857 ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG por tbl flm14x150mg MCK D

10875 ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG por tbl flm10x300mg MCK D

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|----------|-------|
| 134.10 | J01FA07 | josamycin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 30.08 | |
| 134.11 | J01FA07 | josamycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 40.45 | |
| 134.12 | J01FA09 | klarithromycin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 40.01 | |
| 134.13 | J01FA09 | klarithromycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 66.50 | |
| 134.14 | J01FA09 | klaritromycin | parent. | 1.00 | GM | 731.80 | K |
| 134.15 | J01FA10 | azithromycin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.25 | GM | 52.78 | |
| 134.16 | J01FA10 | azithromycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.25 | GM | 82.27 | |
| 134.17 | J01FA10 | azitromycin | parent. | 0.50 | GM | 474.33 | K |
| 134.18 | J01FA13 | ditythromycin | p.o. | 0.50 | GM | 42.75 | |
| 134.19 | J01FG02 | quinupristin v kombinaci s dalfopristinem | parent | 1.00 | DF | 2 492.00 | U/ATB |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|--------|------|----|-------|--|
| 134.20 | J01RA | kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol) | v.p.o. | 5.00 | DF | 32.16 | |
|--------|-------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 135 | linkosamidová antibiotika | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 135.1 | J01FF01 | klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.80 | GM | 538.80 | U/ATB |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 135.2 | J01FF01 | klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli) | parent. | 1.80 | GM | 494.02 | U/ATB |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 135.3 | J01FF01 | klindamycin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 44.37 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|--------|--|
| 135.4 | J01FF01 | klindamycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 136.53 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-------|
| 135.5 | J01FF02 | linkomycin | parent. | 1.80 | GM | 49.17 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|-----|
| 135.6 | J01FF02 | linkomycin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.80 | GM | 29.33 | ATB |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|-----|

91997 NELOREN cps 16x500mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|--------|-----|
| 135.7 | J01FF02 | linkomycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.80 | GM | 160.62 | ATB |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 136 | aminoglykosidová antibiotika | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|--|
| 136.1 | J01GA01 | streptomycin | parent. | 1.00 | GM | 117.10 | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|--|

13797 STREPTOMYCIN 1GM plv sol 10x1gm/lahv BAK BG

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|
| 136.2 | J01GB01 | tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.24 | GM | 43.84 | U/ATB |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|-----------|------|----|----------|---|
| 136.3 | J01GB01 | tobramycin (léková forma – inhalaci roztok) | inhalační | 0.60 | GM | 2 975.00 | P |
|-------|---------|---|-----------|------|----|----------|---|

Tobramycin v inhalaci formě je indikován pacientům s cystickou fibrózou infikovaných *Pseudomonas aeruginosa*, starších 6-ti let.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 136.4 | J01GB01 | tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.24 | GM | 23.02 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|
| 136.5 | J01GB03 | gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.24 | GM | 45.18 | U/ATB |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|-------|
| 136.6 | J01GB03 | gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci) | imp. | 1.00 | DF | 152.06 | U/ATB |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|--------|----|----------|-------|
| 136.7 | J01GB03 | gentamicin (lékové formy pěny) | lok. | 130.00 | MG | 2 411.98 | U/ATB |
|-------|---------|--------------------------------|------|--------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 136.8 | J01GB03 | gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.24 | GM | 23.61 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|
| 136.9 | J01GB05 | neomycin | parent. | 1.00 | GM | 122.34 | U/ATB |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 136.10 | J01GB06 | amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | GM | 741.01 | U/ATB |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 136.11 | J01GB06 | amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | GM | 398.66 | U/ATB |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 136.12 | J01GB07 | netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.35 | GM | 519.93 | U/ATB |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 136.13 | J01GB07 | netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.35 | GM | 304.57 | U/ATB |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 136.14 | J01GB11 | isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | GM | 620.27 | U/ATB |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 136.15 | J01GB11 | isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | GM | 516.90 | U/ATB |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 137 | chinolonová chemoterapeutika | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|---|
| 137.1 | J01MA | trovafloxacin | p.o. | 0.20 | GM | 24.50 | P |
|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|---|

K léčbě trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.2 | J01MA | trovafloxacin | parent. | 0.20 | GM | 212.23 | U/ATB |
|-------|-------|---------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 137.3 | J01MA01 | ofloxacin | p.o. | 0.40 | GM | 19.00 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

12349 ZANOCIN 200MG tbl obd 10x200mg RXY IND

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.4 | J01MA01 | ofloxacin | parent. | 0.40 | GM | 212.23 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|--|
| 137.5 | J01MA02 | ciprofloxacin | p.o. | 1.00 | GM | 19.00 | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.6 | J01MA02 | ciprofloxacin – infúze | parent. | 0.50 | GM | 212.23 | U/ATB |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.7 | J01MA02 | ciprofloxacin – injekce | parent. | 0.50 | GM | 186.84 | U/ATB |
|-------|---------|-------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 137.8 | J01MA03 | pefloxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-------|
| 137.9 | J01MA03 | pefloxacin | parent. | 0.80 | GM | 93.26 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 137.10 | J01MA04 | enoxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 137.11 | J01MA06 | norfloxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 137.12 | J01MA07 | lomefloxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 137.13 | J01MA08 | fleroxacin | p.o. | 0.40 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.14 | J01MA08 | fleroxacin | parent. | 0.40 | GM | 212.23 | U/ATB |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|
| 137.15 | J01MA09 | sparfloxacin | p.o. | 0.20 | GM | 19.00 | P |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|

K léčbě sparfloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--------|------|----|--------|-------|
| 137.16 | J01MA12 | levofloxacin | parent | 0.25 | GM | 212.13 | U/ATB |
|--------|---------|--------------|--------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 137.17 | J01MA12 | levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.25 | GM | 75.00 | U/ATB |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 137.18 | J01MA12 | levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.25 | GM | 60.00 | U/ATB |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|
| 137.19 | J01MA14 | moxifloxacin | p.o. | 0.40 | GM | 60.00 | U/ATB |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 138 | ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-------|
| 138.1 | J01XA01 | vankomycin | parent. | 2.00 | GM | 1 276.68 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-------|

92289 EDICIN 0.5 GM inj plv sol 1x500mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|
| 138.2 | J01XA02 | teikoplanin | parent. | 0.40 | GM | 2 492.83 | U/ATB |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|
| 138.3 | J01XB01 | kolistin | p.o. | 3.00 | MU | 42.82 | U/ATB |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-------|
| 138.4 | J01XB01 | kolistin | parent. | 3.00 | MU | 109.34 | U/ATB |
| 138.5 | J01XB02 | polymyxin | parent. | 0.15 | GM | 103.09 | U/ATB |
| 138.6 | J01XX08 | linezolid | p.o. | 1.20 | GM | 4 811.98 | U/ATB |
| 138.7 | J01XX08 | linezolid | parent | 1.20 | GM | 4 741.52 | U/ATB |

139 imidazolová chemoteraputika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 139.1 | G01AX05 | nifuratel | p.o. | 0.60 | GM | 12.50 | |
| 139.2 | J01XD01 | metronidazol | p.o. | 2.00 | GM | 13.80 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|--------|---|
| 139.3 | J01XD01 | metronidazol | p.rect. | 2.00 | GM | 8.36 | |
| 139.4 | J01XD01 | metronidazol | parent. | 1.50 | GM | 176.89 | U |
| 139.5 | J01XD02 | tinidazol | p.o. | 2.00 | GM | 13.80 | |
| 139.6 | J01XD03 | ornidazol | p.o. | 1.50 | GM | 22.00 | |
| 139.7 | J01XD03 | ornidazol | parent. | 1.00 | GM | 50.44 | U |
| 139.8 | J01XE01 | nitrofurantoin | p.o. | 0.20 | GM | 3.65 | |

140 antimykotika pro systémové užití

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|----------|-------|
| 140.1 | D01BA01 | griseofulvin | p.o. | 0.50 | GM | 9.97 | |
| 140.2 | D01BA02 | terbinafin | p.o. | 0.25 | GM | 35,00 | L/DER |
| 140.3 | J02AA01 | amfotericin | parent. | 35.00 | MG | 279.36 | U |
| 140.4 | J02AA01 | amfotericin na tukových nosičích | parent. | 35.00 | MG | 1 597.70 | U/ATB |
| 140.5 | J02AB01 | mikonazol | parent. | 1.00 | GM | 469.63 | U |
| 140.6 | J02AB02 | ketokonazol | p.o. | 0.20 | GM | 25.00 | |
| 140.7 | J02AC01 | flukonazol | parent. | 0.20 | GM | 550.00 | U/P |

Parenterální flukonazol je indikován k léčbě těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profilakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 140.8 | J02AC01 | flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.20 | GM | 249.07 | P |
| 140.9 | J02AC01 | flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu | p.o. | 0.20 | GM | 349.25 | P |
| 140.10 | J02AC01 | flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 193.65 | P |
| 140.11 | J02AC01 | flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu) včetně | p.o. | 0.20 | GM | 479.01 | P |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|----------|-------|
| 140.12 | J02AC01 | flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu p.o. včetně) | | 0.20 | GM | 436.59 | P |
| 140.13 | J02AC02 | itraconazol | parent. | 0.20 | GM | 3 520.00 | U/ATB |
| 140.14 | J02AC02 | itraconazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení) | p.o. | 0.20 | GM | 95.60 | P |
| 140.15 | J02AC02 | itraconazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení | p.o. | 0.20 | GM | 114.00 | P |
| 140.16 | J02AC02 | itraconazol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.20 | GM | 371.70 | P |
| 140.17 | J02AC03 | vorikonazol | p.o. | 0.40 | GM | 2 655,50 | U/ATB |
| 140.18 | J02AC03 | vorikonazol | parent. | 0.40 | GM | 9 857,80 | U/ATB |
| 140.19 | J02AX01 | flucytosin | p.o. | 10.00 | GM | 858.22 | P |

Perorální fluconazol, itraconazol a flucytosin pro krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u:

- a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích jednotkách nebo dermatolog u:

- a) systémových mykóz u imunokompromitovaných pacientů,
- b) těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofytů na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření,
- c) těžké formy nehtových mykóz (itraconazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- 1) postižení celé nehtové ploténky,
- 2) postižení minimálně čtyř nehtových plotenek tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem,
- 3) postižení nehtu palce dolní končetiny.

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

Profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

Itraconazol v tekutých lékových formách je hrazen k léčbě orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|----------|-----|
| 140.20 | J02AX01 | flucytosin | parent. | 10.00 | GM | 2 710.83 | U/P |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|----------|-----|

Parenterální flucytosin je indikován k léčbě těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů včetně pacientů připravovaných k transplantaci.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|-----------|-------|
| 140.21 | J02AX04 | caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulce | parent. | 1.00 | DF | 17 259.00 | U/ATB |
| 140.22 | J02AX04 | caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulce | parent. | 1.00 | DF | 24 163.00 | U/ATB |

141 ostatní antimykobakteriální látky

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 141.1 | J04AB02 | rifampicin | p.o. | 0.60 | GM | 12.76 | |
| 141.2 | J04AB03 | rifamycin | parent. | 0.60 | GM | 244.40 | |
| 141.3 | J04AB04 | rifabutin | p.o. | 0.15 | GM | 113.69 | P |

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

91946 MYCOBUTIN 150 cps 30x150mg PHA I

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|--|
| 141.4 | J04AB30 | kapreomycin | parent. | 1.00 | GM | 553.11 | |
| 141.5 | J04AC01 | Isoniazid | p.o. | 0.30 | GM | 2.04 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|-------|--|
| 141.6 | J04AK01 | pyrazinamid | p.o. | 1.50 | GM | 14.63 | |
| 141.7 | J04AK02 | ethambutol | p.o. | 1.20 | GM | 12.22 | |
| 141.8 | J04BA02 | dapson | p.o. | 50.00 | MG | 1.37 | |

| | |
|-----|---|
| 142 | systémová antivirotna pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí |
|-----|---|

Léčbu famciklovirem, valaciklovirem, brividinem a parenterálním aciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:
 a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
 b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
 c) léčba herpes zosteri,
 d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|
| 142.1 | J05AB01 | aciklovir | parent. | 4.00 | GM | 1 438.30 | U/P |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|------|------|----|--------|--|
| 142.2 | J05AB01 | aciklovir do 200 mg včetně | p.o. | 4.00 | GM | 221.90 | |
|-------|---------|----------------------------|------|------|----|--------|--|

54213 RANVIR 200 tbl 25x200mg RXG IND

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|--|
| 142.3 | J05AB01 | aciklovir nad 200 mg | p.o. | 4.00 | GM | 195.00 | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|---|
| 142.4 | J05AB01 | aciklovir (suspense) | p.o. | 4.00 | GM | 272.00 | P |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|---|

Aciklovir suspenze je indikován u dětí a dorostenců v indikaci herpes zoster.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 142.5 | J05AB04 | ribavirin | p.o. | 1.00 | GM | 604.96 | X |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|----------|---|
| 142.6 | J05AB06 | ganciklovir | p.o. | 3.00 | GM | 1 862.06 | P |
|-------|---------|-------------|------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-----|
| 142.7 | J05AB06 | ganciklovir | parent. | 0.50 | GM | 1 490.26 | U/P |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|--------|---|
| 142.8 | J05AB09 | famciklovir | p.o. | 0.75 | GM | 195.00 | P |
|-------|---------|-------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|--------|---|
| 142.9 | J05AB11 | valaciklovir | p.o. | 3.00 | GM | 195.00 | P |
|-------|---------|--------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu ganciklovirem a valganciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenickou a autologickou transplantací kostní dřeně,
- c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|--------|----|-----------|-----|
| 142.10 | J05AB12 | cidofovir | parent. | 375.00 | MG | 30 698.31 | U/P |
|--------|---------|-----------|---------|--------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|------|------|----|----------|---|
| 142.11 | J05AB14 | valganciklovir | p.o. | 0.90 | GM | 1 943.81 | P |
|--------|---------|----------------|------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|--------|---|
| 142.12 | J05AB15 | brividin | p.o. | 0.50 | GM | 195.00 | P |
|--------|---------|----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|
| 142.13 | J05AD01 | foskarnet | parent. | 6.50 | GM | 3 006.25 | U/P |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|--------|-------|----|--------|---|
| 142.14 | J05AH01 | zanamivir | inhal. | 20.00 | MG | 121.00 | P |
|--------|---------|-----------|--------|-------|----|--------|---|

Zanamivir je indikován pro léčbu influenze A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
2. dospělí se závažným chronickým plichním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravidelnost protitlátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kuru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetrující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|
| 142.15 | J05AH02 | oseltamivir | p.o. | 150.00 | MG | 121.00 | P |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|

Oseltamivir je indikován pro léčbu influenze A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
2. dospělí se závažným chronickým plnicím či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protitlátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetrující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|------|------|----|-------|---|
| 142.16 | J05AX05 | inosin pranobex | p.o. | 1.00 | GM | 30.55 | P |
|--------|---------|-----------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 143 | Antiretrovirotyka | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|

Léčbu antiretrovirovými léčivy (atazanavir, zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin, abacavir a tenofovir disoproxil) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetrující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|---|
| 143.1 | J05AE | inhibitory proteáz (lopinavir, ritonavir v kombinaci) | p.o. | 6.00 | DF | 564.00 | P |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------|------|-----|----|--------|---|
| 143.2 | J05AE | atazanavir | p.o. | 0.3 | GM | 453.70 | P |
|-------|-------|------------|------|-----|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 143.3 | J05AE01 | saquinavir | p.o. | 1.80 | GM | 453.70 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

59463 FORTOVASE 200 MG cps 180x200mg HLR D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 143.4 | J05AE02 | indinavir | p.o. | 2.40 | GM | 453.70 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 143.5 | J05AE03 | ritonavir | p.o. | 1.20 | GM | 453.70 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 143.6 | J05AE04 | nelfinavir | p.o. | 2.25 | GM | 453.70 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 143.7 | J05AF01 | zidovudin | p.o. | 1.50 | GM | 685.28 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|
| 143.8 | J05AF01 | zidovudin | parent. | 1.00 | GM | 2 613.03 | U/P |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 143.9 | J05AF02 | didanosin | p.o. | 0.40 | GM | 236.43 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 143.10 | J05AF03 | zalcitabin | p.o. | 2.25 | MG | 235.25 | P |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|-------|----|--------|---|
| 143.11 | J05AF04 | stavudin | p.o. | 80.00 | MG | 302.07 | P |
|--------|---------|----------|------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 143.12 | J05AF05 | lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně | p.o. | 0.30 | GM | 292.03 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 143.13 | J05AF05 | lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru | p.o. | 0.30 | GM | 248.01 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|--------|----|--------|---|
| 143.14 | J05AF06 | abacavir | p.o. | 600.00 | MG | 345.35 | P |
|--------|---------|----------|------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|------|--------|----|--------|---|
| 143.15 | J05AF07 | tenofovir disoproxil | p.o. | 245.00 | MG | 460.00 | P |
|--------|---------|----------------------|------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|------|-------|----|--------|---|
| 143.16 | J05AF08 | adefovir dipivoxil | p.o. | 10.00 | MG | 610.00 | P |
|--------|---------|--------------------|------|-------|----|--------|---|

Adefovir disoproxil je indikován k léčbě pacientů s chronickou hepatitidou B nebo jaterní cirhózou B s rezistencí na lamivudin a s biochemicky či morfologicky aktivní jaterní lézi. Rezistencí na lamivudin se rozumí opětná významná replikace HBV i při podávání lamivudinu.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 143.17 | J05AF30 | abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinaci | p.o. | 2.00 | DF | 788.69 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 143.18 | J05AF30 | jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin) | p.o. | 2.00 | DF | 522.13 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|---------|---|
| 143.19 | J05AG01 | nevirapin | p.o. | 0.40 | GM | 343.34 | P |
| 143.20 | J05AG03 | efavirenz | p.o. | 0.60 | GM | 431.00 | P |
| 143.21 | J05AX07 | enfuvirtid | parent. | 180.00 | MG | 1492.00 | P |

Enfuvirtid je indikován u HIV pozitivních pacientů, pokud selhala antiretrovirová terapie z důvodů vzniku rezistence či závažných vedlejších příznaků.

| | |
|-----|--|
| 144 | Zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 144.1 | J06AA | sérum proti stafylokokovým infekcím | parent. | | | plně | K/P |
|-------|-------|-------------------------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|--|--|------|---|
| 144.2 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína) | parent. | | | plně | K |
|-------|-------|---|---------|--|--|------|---|

94269 POLYSTAFANA inj 10x0.5ml/5.4ut SVF CZ

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 145 | Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu |
|-----|--------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|--|--|------|-----|
| 145.1 | J06AA01 | sérum proti záškrtu | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|---------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

| | |
|-----|--|
| 146 | Zvířecí imunoglobuliny proti hadimu jedu |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 146.1 | J06AA03 | sérum proti hadimu jedu | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|-------------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti hadimu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

93005 VIPER VENOM ANTITOXIN inj 1x5ml/500ut BIM PL

| | |
|-----|--|
| 147 | Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|--|--|------|-----|
| 147.1 | J06AA04 | sérum proti botulinu | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|----------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

| | |
|-----|--|
| 148 | Zvířecí inunoglobuliny proti plynaté sněti |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 148.1 | J06AA05 | sérum proti plynaté sněti | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|---------------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

01195 GASEA inj 1x20ml/25ku SVF CZ

| | |
|-----|--|
| 149 | Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|---------|--|--|------|-----|
| 149.1 | J06AA06 | sérum proti vzteklině | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|-----------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

46295 FAVIRAB inj 1x5ml/1ku AVS F

| | |
|-----|---|
| 150 | imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 150.1 | J06BA01 | imunoglobuliny, norm. lidské, k extravaskulární aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli | parent. | 1.00 | DF | 600.00 | O |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|--------|---|
| 150.2 | J06BA01 | imunoglobuliny, norm. lidské, parent. k extravaskulární aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli | | 1.00 | DF | 247.24 | O |
|-------|---------|--|--|------|----|--------|---|

57669 PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16 inj 1x2ml/320mg GFO E

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 151 | imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|------|----|-------|---|
| 151.1 | J06BA | imunoglobuliny, norm. lidské (parent. k extravaskulární aplikaci), kombinace s histaminem | | 1.00 | DF | 83.85 | O |
|-------|-------|---|--|------|----|-------|---|

87736 HISTAGLOBIN inj 3x12mg+sol. BBL CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 151.2 | J06BA02 | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci | parent. | 1.00 | GM | 956.88 | B |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|---|
| 151.3 | J06BA02 | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM) | parent. | 1.00 | GM | 1 955.16 | U |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 151.4 | J06BA02 | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci se sníženým obsahem IgA | parent. | 1.00 | GM | 1 400.00 | B/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|

Jako lék druhé volby s přítomností prokázaných protilátek proti IgA.

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 152 | lidské imunoglobuliny proti tetanu | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|---|
| 152.1 | J06BB02 | imunoglobulin proti tetanu | parent. | | | plně | B |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|---|

44668 PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF inj sic 1x250ut+2ml GFO E

44669 PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF inj sic 1x500ut+2ml GFO E

57804 PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF inj 1x1ml/250ut-str GFO E

57805 PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF inj 1x2ml/500ut-str GFO E

83607 TETABULIN S/D injsol1x1ml/250ut+s BXG A

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 153 | lidské imunoglobuliny proti hepatitidě | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------|---|
| 153.1 | J06BB04 | imunoglobulin proti hepatitidě B | parent. | | | plně | K |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------|---|

57419 PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO inj 1x3ml/600ut GFO E

57420 PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO inj 1x5ml/1000ut GFO E

97558 NEOHEPATECT inf sol 1x2ml/100ut BTP D

97559 NEOHEPATECT inf sol1x10ml/500ut BTP D

97560 NEOHEPATECT inf sol1x40ml/2ku BTP D

97897 HEPATECT inj 1x2ml BTP D

97898 HEPATECT inj 1x10ml BTP D

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 154 | lidské imunoglobuliny proti vzteklině | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 154.1 | J06BB05 | imunoglobulin proti rabies | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|-----|

46731 IMOGRAM RABIES PASTEURIZED inj 1x10ml/1500ut AVS F

53163 IMOGRAM RABIES PASTEURIZED inj 1x2ml/300ut AVS F

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 155 | ostatní lidské specifické imunoglobuliny | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|
| 155.1 | J06BB01 | anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně) | parent. | 250.00 | RG | 1 407.96 | K |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|----------|---|
| 155.2 | J06BB01 | anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg) | parent. | 250.00 | RG | 1 320.40 | K |
|-------|---------|--|---------|--------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-----------|-----|
| 155.3 | J06BB03 | imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu | parent. | 1.00 | KU | 32 724.00 | K/P |
|-------|---------|---|---------|------|----|-----------|-----|

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- a) neočkované těhotné ženy,
- b) novorozeneček po kontaktu s varicellou,
- c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- d) varicelózní primární pneumonitis.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 155.4 | J06BB09 | imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci | parent. | 1.00 | GM | 4 745.64 | U/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- a) novorozeneček s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 155.5 | J06BB12 | protiencefalický globulin | parent. | 1.00 | ML | 300.65 | K |
|-------|---------|---------------------------|---------|------|----|--------|---|

95082 FSME-BULIN inj 1x1ml BXG A

95083 FSME-BULIN inj 1x2ml BXG A

95084 FSME-BULIN inj 1x5ml BXG A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-----------|---|
| 155.6 | J06BB16 | palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně | parent. | 1.00 | DF | 19 633.00 | X |
|-------|---------|--|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-----------|---|
| 155.7 | J06BB16 | palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli | parent. | 1.00 | DF | 32 444.61 | X |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 156 | očkovací látky proti tetanu | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|--|--|------|---|
| 156.1 | J07AM01 | tetanový toxoid | parent. | | | plně | K |
|-------|---------|-----------------|---------|--|--|------|---|

83443 TETAVAX inj 1x0.5ml-stř. AVS F

83444 TETAVAX inj 20x0.5ml-stř. AVS F

83445 TETAVAX inj 1x10ml-lahv. AVS F

83447 TETAVAX inj 10x20ml-lahv. AVS F

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|-----------|---------|------|----|-------|-----|
| 156.2 | J07AM51 | tetanový anatoxin, s anatoxinem záškrtu | kombinace | parent. | 1.00 | DF | 11.67 | O/P |
|-------|---------|---|-----------|---------|------|----|-------|-----|

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 157 | jiné bakteriální vakcíny | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 157.1 | J07AG01 | hemofilus influenzae B, čistěný purifikovaný antigen | parent. | 1.00 | DF | 212.30 | O/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|--------|-----|
| 157.2 | J07AL01 | pneumoková vakcina | parent. | 1.00 | DF | 227.36 | O/P |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|--------|-----|

85534 PNEUMO 23 inj 1x0.5ml+střík. AVS F

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|---|
| 157.3 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcina) | parent. | 1.00 | DF | 206.02 | O |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|-------|---|
| 157.4 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů) | parent. | 1.00 | DF | 26.15 | K |
|-------|-------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------|----|--------|---|
| 157.5 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní parent. | 1.00 | DF | 280.47 | O |
|-------|-------|--|------|----|--------|---|

| | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|----|--------|---|
| 157.6 | J07BB02 | chřipka, čištěný antigen parent. | 1.00 | DF | 140.00 | P |
|-------|---------|----------------------------------|------|----|--------|---|

Vakcína je indikovaná u pacientů nad 65 let věku a u pacientů po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdece a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin a diabetem a to pokud nejsou očkování proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhl. MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 158 | očkovací látky proti tuberkulóze | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|----|--------|---|
| 158.1 | J07AN01 | tuberkulosa, mykobakterium živé atenuované parent. | 1.00 | DF | 229.40 | H |
|-------|---------|--|------|----|--------|---|

58227 BCG VACCINE SSI inj sic 10x10d Áv+so SST DK
 58228 BCG VACCINE SSI inj sic 10x20d Áv+so SST DK

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 159 | očkovací látky proti vzteklině | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---------|---|--|--|------|---|
| 159.1 | J07BG01 | inaktivovaný celý virus vztekliny parent. | | | plně | K |
|-------|---------|---|--|--|------|---|

75379 RABIPUR inj sic 1x2.5ut+sol CBG D
 90996 RABIPUR inj sic 5x2.5ut+sol CBG D
 93706 VERORAB inj sic 1dag.+0.5ml AVS F

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 160 | ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|----|--------|-----|
| 160.1 | J07AH03 | meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigen parent. | 1.00 | DF | 101.83 | O/P |
|-------|---------|--|------|----|--------|-----|

76063 MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINE inj sic 1x1dag+str AVS F

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|----|--------|-----|
| 160.2 | J07AH07 | meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný parent. | 1.00 | DF | 420.00 | O/P |
|-------|---------|--|------|----|--------|-----|

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|----|-------|-----|
| 160.3 | J07BF03 | dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus parent. | 1.00 | DF | 95.30 | O/P |
|-------|---------|--|------|----|-------|-----|

| | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|-------|-----|
| 160.4 | J07BJ01 | zarděnky, živý oslabený virus parent. | 1.00 | DF | 74.00 | O/P |
|-------|---------|---------------------------------------|------|----|-------|-----|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 161 | ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|------|----|------|--|
| 161.1 | J01MB05 | kyselina oxolinová p.o. | 1.00 | GM | 9.00 | |
|-------|---------|-------------------------|------|----|------|--|

91101 DESUROL tbl 50x250mg LEX CZ

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 162 | cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|----|------|--|
| 162.1 | L01AA01 | cyklofosfamid p.o. | 0.10 | GM | 5.18 | |
|-------|---------|--------------------|------|----|------|--|

94174 CYCLOPHOSPHAMIDE ORION tbl obd 50x50mg ONA SF

| | | | | | | |
|-------|---------|---|------|----|------|--|
| 162.2 | L01AA02 | chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě) p.o. | 1.00 | MG | 4.50 | |
|-------|---------|---|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|-----------|
| 162.3 | L01AA02 | chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 3.72 | |
| 162.4 | L01AA03 | melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 4.30 | |
| 162.5 | L01AA03 | melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 2.88 | |
| 162.6 | L01AB01 | busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 4.89 | L/ONK,HEM |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 163 | cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|-------|----|------|---|
| 163.1 | L01AA01 | cyklofosfamid | parent. | 10.00 | MG | 3.52 | B |
|-------|---------|---------------|---------|-------|----|------|---|

10776 CYTOXAN 500 MG inj sic 12x500mg BMS POR

10777 CYTOXAN 1 G inj sic 6x1gm BMS POR

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 163.2 | L01AA03 | melfalan | parent. | 1.00 | MG | 12.61 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 163.3 | L01AA05 | chlormethin | parent. | 1.00 | MG | 34.22 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|
| 163.4 | L01AA06 | ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 1.42 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|------|-----------|
| 163.5 | L01AA06 | ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 1.32 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-----------|
| 163.6 | L01AB01 | busulfán | parent. | 1.00 | MG | 180.00 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|------|-----------|
| 163.7 | L01AX04 | dakarbazin | parent. | 10.00 | MG | 7.90 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 164 | antimetabolity – analoga listové kyseliny, perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 164.1 | L01BA01 | metotrexát | p.o. | 1.00 | MG | 1.52 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10 tbl 100x10mg PVL CZ

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 165 | antimetabolity – analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|------|---|
| 165.1 | L01BA01 | metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 9.09 | B |
|-------|---------|--|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|------|---|
| 165.2 | L01BA01 | metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 3.12 | B |
|-------|---------|--|---------|------|----|------|---|

11191 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 1x2ml/50mg-lah PHM NL

11192 METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML inj 5x2ml/50mg-amp PHM NL

64784 METHOTREXAT EBEWE inf 1x5ml/500mg EBP A

87564 METHOTREXAT LACHEMA 50 inj sic 10x50mg PVL CZ

87761 METHOTREXAT LACHEMA 500 inj sic 10x500mg LCM CZ

93964 METHOTREXAT LACHEMA 50 inj 10x5ml/50mg PVL CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|------|---|
| 165.3 | L01BA01 | metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | MG | 4.89 | B |
|-------|---------|--|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|
| 165.4 | L01BA03 | raltitrexed | parent. | 1.00 | DF | 7 498.20 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--------|----|-----------|---|
| 165.5 | L01BA04 | pemetrexed | parent. | 500.00 | MG | 39 327.00 | X |
|-------|---------|------------|---------|--------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 166 | antimetabolity – analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|-----------|
| 166.1 | L01BB02 | merkaptopurin | p.o. | 10.00 | MG | 6.21 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|-----------|
| 166.2 | L01BB03 | tioguanin | p.o. | 10.00 | MG | 9.34 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|-----------|
| 170.1 | L01CB01 | etoposid | p.o. | 1.00 | MG | 2.84 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | |
|-------|---------------|--------------|-----|---|
| 86710 | VEPESID 100MG | cps 10x100mg | BMS | I |
| 93696 | LASTET 25 | cps 40x25mg | NKU | J |
| 93697 | LASTET 50 | cps 20x50mg | NKU | J |
| 93698 | LASTET 100 | cps 10x100mg | NKU | J |
| 97401 | VEPESID 50MG | cps 20x50mg | BMS | I |

| | |
|-----|---|
| 171 | deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|-----------|
| 171.1 | L01CB01 | etoposid | parent. | 1.00 | MG | 3.02 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|-----------|

| | | | | |
|-------|---------|---------------------|-----|---|
| 86709 | VEPESID | inf cnc10x5ml/100mg | BMS | I |
|-------|---------|---------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|
| 171.2 | L01CB02 | teniposid | parent. | 1.00 | MG | 6.06 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|

| | |
|-----|--------|
| 172 | taxany |
|-----|--------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 172.1 | L01CD01 | paclitaxel | parent. | 1.00 | MG | 133.20 | X |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|--------|---------------------|-----|----|
| 05952 | PAXENE | inf cnc sol1x16.7ml | IVX | CZ |
| 05953 | PAXENE | inf cnc sol 1x50ml | IVX | CZ |
| 45154 | PAXENE | inf cnc sol 1x5ml | IVX | CZ |
| 45155 | PAXENE | inf cnc sol 1x25ml | IVX | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 172.2 | L01CD02 | docetaxel | parent. | 1.00 | MG | 233.50 | X |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

| | |
|-----|--------------------------------|
| 173 | antracykliny a jejich deriváty |
|-----|--------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|-----------|
| 173.1 | L01DA01 | daktinomycin | parent. | 1.00 | MG | 664.85 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.2 | L01DB01 | doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 29.05 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.3 | L01DB01 | doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 28.90 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|
| 32978 | DOXORUBICIN-TEVA 0.2% | injsol1x200mg/100ml | PHM | NL |
|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.4 | L01DB02 | daunorubicin | parent. | 1.00 | MG | 19.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.5 | L01DB03 | epirubicin | parent. | 1.00 | MG | 35.85 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.6 | L01DB04 | aklarubicin | parent. | 1.00 | MG | 19.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.7 | L01DB05 | zorubicin | parent. | 1.00 | MG | 19.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 173.8 | L01DB06 | idarubicin | p.o. | 1.00 | MG | 274.70 | X |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----------|
| 173.9 | L01DB06 | idarubicin | parent. | 1.00 | MG | 711.45 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.10 | L01DB07 | mitoxantron | parent. | 1.00 | MG | 53.96 | B/ONK,HEM |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|------|----|--------|---|
| 173.11 | L01XX32 | bortezomibum | parent. | 3.50 | MG | 36 000 | X |
|--------|---------|--------------|---------|------|----|--------|---|

| | |
|-----|---------------------------------|
| 174 | ostatní cytotoxická antibiotika |
|-----|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 174.1 | L01DC01 | bleomycin | parent. | 1.00 | MG | 50.09 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | |
|-------|---------|--------------|-----|
| 03404 | BLEOCIN | injsic1x15mg | NKU |
|-------|---------|--------------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|
| 174.2 | L01DC03 | mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 66.39 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 174.3 | L01DC03 | mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 59.00 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 175 | platinová cytostatika | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|-----------|
| 175.1 | L01XA01 | cisplatina | parent. | 1.00 | MG | 8.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|-----------|

96454 PLATIDIAM 25 inf cnc sol 5x50ml PVL CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|
| 175.2 | L01XA02 | karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 6.70 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|
| 175.3 | L01XA02 | karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 3.86 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 176 | ostatní cytostatika, perorální podání | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|-----------|
| 176.1 | L01AD02 | lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 5.72 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|--|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|-----------|
| 176.2 | L01AD02 | lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 5.63 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|---|------|------|----|------|-----------|

64652 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MG cps 20x40mg BMS I

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-----------|
| 176.3 | L01AD02 | lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 4.39 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|-------|--------|----|-----------|---|
| 176.4 | L01AX03 | temozolomid | p. o. | 370.00 | MG | 13 369.00 | X |
|-------|---------|-------------|-------|--------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|-----------|
| 176.5 | L01XB01 | prokarbazin | p.o. | 10.00 | MG | 2.44 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|------|----------------|
| 176.6 | L01XX05 | hydroxymočovina | p.o. | 0.10 | GM | 2.00 | L/ONK,HEM, URN |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|------|----------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|----------------|
| 176.7 | L01XX14 | tretinoïn | p.o. | 10.00 | MG | 98.65 | L/ONK,HEM, URN |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|----------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|----------|---|
| 176.8 | L01XX28 | imatinib | p.o. | 400.00 | MG | 2 672.95 | X |
|-------|---------|----------|------|--------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 177 | ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 177.1 | L01AC01 | thiotepa | parent. | 1.00 | MG | 21.31 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|
| 177.2 | L01AD01 | karmustin | parent. | 1.00 | MG | 9.73 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|

53666 BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/) inj sic 1x100mg+sol BMS I

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|-------|----|-------|-----------|
| 177.3 | L01AD04 | streptozocin | parent. | 10.00 | MG | 14.81 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|-------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 177.4 | L01AD05 | fotemustin | parent. | 1.00 | MG | 94.48 | X |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|
| 177.5 | L01XC02 | rituximab | parent. | 10.00 | MG | 1 148.28 | X |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-----------|---|
| 177.6 | L01XC03 | trastuzumab | parent. | 1.00 | DF | 25 414.00 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 177.7 | L01XC04 | alemtuzumab | parent. | 1.00 | MG | 442.20 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 177.8 | L01XC06 | cetuximab | parent. | 1.00 | MG | 67.92 | X |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 177.9 | L01XC07 | bevacizumab | parent. | 1.00 | MG | 105.41 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|-----|
| 177.10 | L01XD02 | verteporfin | parent. | 15.00 | MG | 44 000.00 | K/P |
|--------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|-----|

Verteporfin k fotodynamické terapii /PDT/ ordinuje oftalmolog u nemocných se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou chorioideální neovaskularizací objektivizovanou angiografickým vyšetřením .

Standardní postup PDT je indikován u klasických a čistě okultních subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán (CHNVM), u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), dále u patologické myopie, angiodních pruhů, po traumatech, u syndromu histoplasmózy, u zánětlivých a idiopatických membrán, i při komplikacích makulárních dystrofí (morbus Best).

PDT je indikována i tam, kde by další pokles ZO jediného prakticky vidoucího oka pod 0,1 měl nepříznivý dopad na kvalitu života nemocného u komplikovaných případů nemocných se subfoveální CHNVM u VPMD, patologické myopie. Velikost léze je omezena: největší průměr je 5,4 mm. Funkce oka musí být rovna nebo lepší než 0,1. Podkladem pro indikaci je podrobné biomikroskopické a angiografické vyšetření (fluorescenční, event. indocyaninová angiografie), někdy i optická koherentní tomografie (OCT).

Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného centra. PDT bude prováděna na pracovištích, která splní nutné personální i přístrojové podmínky k zajištění dostupnosti pro nemocné.

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|---------|-------|----|----------|-------------------|
| 177.11 | L01XD03 | methylaminolevulinát | lok. | 2.00 | GM | 8 600.00 | X |
| 177.12 | L01XX01 | amsakrin | parent. | 1.00 | MG | 25.80 | B/ONK,HEM |
| 177.13 | L01XX02 | asparagináza | parent. | 1.00 | MG | 2 784.54 | B/ ONK,HEM |
| 177.14 | L01XX09 | miltefosin | lok. | 60.00 | MG | 9.78 | |
| 177.15 | L01XX11 | estramustin | parent. | 1.00 | MG | 0.91 | B/ONK,HEM, URN |
| 177.16 | L01XX17 | topotekan | parent. | 1.00 | MG | 2 913.06 | X |
| 177.17 | L01XX19 | irinotekan | parent. | 1.00 | MG | 72.40 | X |

178 hormonální léčiva s cytostatickým účinkem

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|---------------|--------|----|-------|--------------------------|
| 178.1 | L01XX11 | estramustin | p.o. | 10.00 | MG | 3.21 | L/ONK,HEM,URN |
| 58742 | ESTRACYT | | cps 100x140mg | PIK | I | | |
| 178.2 | L02AB01 | megestrol (pevné lékové formy) | p.o. | 160.00 | MG | 39.89 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|--------|----|-------|---|
| 178.3 | L02AB01 | megestrol (tekuté lékové formy) | p.o. | 160.00 | MG | 70.97 | P |
|-------|---------|---------------------------------|------|--------|----|-------|---|

Indikováno v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|--------------------------|
| 178.4 | L02AB02 | medroxyprogesteron | p.o. | 1.00 | GM | 149.59 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |
| 178.5 | L02AB02 | medroxyprogesteron | parent. | 1.00 | GM | 692.00 | L/ONK,GYN,SEX |
| 178.6 | L02AB03 | gestonoron | parent. | 1.00 | MG | 1.12 | L/ONK,GYN,SEX |
| 178.7 | L02AE01 | buserelin | inhal. | 1.00 | MG | 233.29 | Z |
| 178.8 | L02AE01 | buserelin | parent. | 1.00 | MG | 253.00 | K/P |
| 178.9 | L02AE01 | buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 719.80 | K/P |
| 178.10 | L02AE01 | buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 576.70 | K/P |
| 178.11 | L02AE02 | leuprorelin | parent. | 1.00 | MG | 253.00 | K/P |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 178.12 | L02AE02 | leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 294.40 | K/P |
| 178.13 | L02AE02 | leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 218.60 | K/P |
| 178.14 | L02AE03 | goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 294.40 | K/P |
| 178.15 | L02AE03 | goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 269.20 | K/P |
| 178.16 | L02AE04 | triptorelin | parent. | 1.00 | DF | 226.70 | K/P |
| 178.17 | L02AE04 | triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 288.90 | K/P |
| 178.18 | L02AE04 | triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 218.50 | K/P |

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- b) léčba karcinomu prostaty,
- c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- e) pubertas precox,
- f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

| 179 antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|-------|----|------|-----------------------|
| 179.1 | L02AA01 | diethylstilbestrol | p.o. | 10.00 | MG | 3.32 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |
| 179.2 | L02AA01 | diethylstilbestrol | parent. | 10.00 | MG | 6.55 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
| 179.3 | L02AA02 | polyestradiol fosfát | parent. | 1.00 | MG | 3.18 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
| 179.4 | L02AA03 | ethinylestradiol | p.o. | 1.00 | MG | 4.06 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |
| 179.5 | L02AA04 | fostfestrol | p.o. | 0.10 | GM | 3.32 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |
| 179.6 | L02AA04 | fostfestrol | parent. | 0.10 | GM | 4.79 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
| 179.7 | L02BA01 | tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 5.00 | |

10703 TAMIFEN 10 por tbl nob100x10mg MOE CY
 31581 TAMOPLEX 10 MG porttblnob100x10mg-l PHM NL
 31586 TAMOPLEX 20 MG porttblnob100x20mg-l PHM NL
 67039 TAMIFEN 10 por tbl nob 30x10mg MOE CY

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|--------|-------|----|--------|-------------------|
| 179.8 | L02BA01 | tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě) | p.o. | 20.00 | MG | 3.65 | |
| 179.9 | L02BA03 | fulvestrant | parent | 8.30 | MG | 500.00 | X |
| 179.10 | L02BB01 | flutamid | p.o. | 0.75 | GM | 67.30 | L/ONK,URN,SEX,END |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|------|-------|----|--------|---------------|
| 179.11 | L02BB02 | nilutamid | p.o. | 0.30 | GM | 158.30 | L/ONK,URN,SEX |
| 179.12 | L02BB03 | bicalutamid do 50 mg včetně | p.o. | 50.00 | MG | 128.00 | P |
| 179.13 | L02BB03 | bicalutamid nad 50 mg | p.o. | 50.00 | MG | 107.14 | P |

Léčba bicalutamidem 50 mg je indikovaná u pacientů s karcinomem prostaty, u kterých léčba flutamidem vede k rozvoji závažných nežádoucích účinků.

Léčba bicalutamidem 150 mg je indikována urologem a onkologem jako časná adjuvantní léčba u nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty po radikální prostatektomii s rizikovými faktory (Gleason skore ≥ 7, perineurální šíření nádoru, pozitivní chirurgické okraje), nebo u nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty jako konkomitantní a adjuvantní léčba k radioterapii.

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------|-------|----|-----------|-----------|
| 180 | inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii | | | | | | |
| 180.1 | L02BG01 | aminogluthetimid | p.o. | 1.00 | GM | 62.45 | L/ONK,END |
| 180.2 | L02BG02 | formestan | parent. | 18.00 | MG | 235.90 | X |
| 92361 LENTARON DEPOT 250MG I.M. inj sic 1x250mg+sol NPA CH | | | | | | | |
| 180.3 | L02BG03 | anastrozol | p.o. | 1.00 | MG | 152.00 | X |
| 180.4 | L02BG04 | letrozol | p.o. | 2.50 | MG | 152.00 | X |
| 180.5 | L02BG06 | exemestan | p.o. | 25.00 | MG | 152.00 | X |
| 181 | Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů | | | | | | |
| 181.1 | L03AA02 | filgrastim | parent. | 1.00 | MG | 9 070.60 | X |
| 181.2 | L03AA13 | pegfilgrastim | parent. | 1.00 | MG | 5 620.00 | X |
| 181.3 | L03AA03 | molgramostim (do 0,3 mgG včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 13 613.27 | X |
| 181.4 | L03AA03 | molgramostim (nad 0,3 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 11 843.67 | X |
| 181.5 | L03AA10 | lenograstim | parent. | 1.00 | MG | 12 477.40 | X |
| 181.6 | L03AB01 | interferon alfa natural | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.7 | L03AB03 | interferon gamma | parent. | 1.00 | MU | 1 531.33 | X |
| 181.8 | L03AB04 | interferon alfa-2a - aplikční forma "pera" | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.9 | L03AB04 | interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.10 | L03AB04 | interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. – jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 202.50 | X |
| 181.11 | L03AB05 | interferon alfa-2b - aplikční forma "pera" | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.12 | L03AB05 | interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.13 | L03AB05 | interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 202.50 | X |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 181.14 | L03AB06 | interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetně | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 181.15 | L03AB06 | interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuli | parent. | 1.00 | MU | 202.50 | X |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|---------|------|----|--------|---|
| 181.16 | L03AB07 | interferon beta - 1a | parent. | 1.00 | MU | 409.37 | X |
|--------|---------|----------------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|----------|-------------------|-----|---|
| 01793 | REBIF 44 | inj 1x0.5ml/44rg | IFB | I |
| 01794 | REBIF 44 | inj 3x0.5ml/44rg | IFB | I |
| 01795 | REBIF 44 | inj 12x0.5ml/44rg | IFB | I |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|---------|------|----|----------|---|
| 181.17 | L03AB07 | interferon beta-1a výhradně intramuskulární podání | prop | parent. | 1.00 | DF | 5 932.25 | X |
|--------|---------|--|------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|---------|------|----|--------|---|
| 181.18 | L03AB08 | interferon beta-1b | parent. | 1.00 | MU | 276.80 | X |
|--------|---------|--------------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 181.19 | L03AB09 | interferon alfacon – 1 | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
|--------|---------|------------------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 181.20 | L03AB10 | peginterferon alfa- 2b | parent. | 1.00 | RG | 72.83 | X |
|--------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 181.21 | L03AB11 | peginterferon alfa- 2a | parent. | 1.00 | RG | 47.40 | X |
|--------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|
| 181.22 | L03AC01 | adesleukin | parent. | 1.00 | MG | 7 141.00 | X |
|--------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|

182 ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 182.1 | L03AX | bac. propionibacterii acnes | parent. | 1.00 | MG | 72.83 | O/ONK |
|-------|-------|-----------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 182.2 | L03AX | dialyzát lidských leukocytů | parent. | 1.00 | DF | 844.00 | P |
|-------|-------|-----------------------------|---------|------|----|--------|---|

Dialyzát lidských leukocytů předepisuje lékař odbornosti alergolog a klinický imunolog nemocným se středně těžkou a těžkou primární nebo sekundární poruchou celulární imunity, prokázanou laboratorním imunologickým vyšetřením.

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------|------|------|----|-----|-----------|
| 182.3 | L03AX | dialyzát veprových leukocytů | p.o. | 1.00 | BA | 60% | L/ALG,IMU |
|-------|-------|------------------------------|------|------|----|-----|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 182.4 | L03AX | laktobacillus acidophilus | parent. | 3.00 | DF | 587.57 | O/GYN |
|-------|-------|---------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------------|-----|----|--|--|--|
| 86711 | SOLCOTRICHOVAC | inj sus 3x0.5ml | IAB | CH | | | |
|-------|----------------|-----------------|-----|----|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|-----------|
| 182.5 | L03AX | směs bakteriálních lyzátů | lok. | 1.00 | BA | 60% | L/ALG,ORL |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|--|
| 182.6 | L03AX | směs bakteriálních lyzátů | p.o. | 1.00 | BA | 60% | |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|
| 182.7 | L03AX | thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 64.86 | Z |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|
| 182.8 | L03AX | thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 45.31 | Z |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 182.9 | L03AX | vaccin. staphyl. phagolys. | lok. | 1.00 | ML | 36.51 | L/ALG,ORL |
|-------|-------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 182.10 | L03AX | vaccin. staphyl. phagolys. | parent. | 1.00 | DF | 72.98 | O |
|--------|-------|----------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------|
| 182.11 | L03AX03 | BCG vakcína | lok. | 1.00 | MG | 37.00 | O/ONK,URN |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------|

BCG vakcína je indikována urologem nebo onkologem k intravizekální léčbě a metafylaxi primárního či recidivujícího karcinomu močového měchýře po transuretrární resekci s nálezem karcinomu in-situ (CIS), T1 G3 a nádorů mnohočetných.

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------|---------|-------|----|----------|---|
| 182.12 | L03AX13 | glatirameracetat kopolymer | parent. | 20.00 | MG | 1 106.56 | X |
|--------|---------|----------------------------|---------|-------|----|----------|---|

183 imunosupresivní léčiva, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|
| 183.1 | L04AA01 | cyklosporin | p.o. | 250.00 | MG | 253.40 | P |
|-------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, nefrolog, revmatolog, alergolog, klinický imunolog, pediatr a gastroenterolog :

- a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
 - b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
 - d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 - e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - f) těžké formy revmatoidní artridy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 - g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 - h) systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
 - i) těžké formy polymyositis/dermatomyosityd nereagující na standardní léčbu,
 - j) v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
- k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog.
 - l) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|---------------------|-----|----|--|--|
| 06408 | EQUORAL | | por sol 1x50ml/5gm | IVX | CZ | | |
| 10183 | EQUORAL 25 MG | | por cps mol 50x25mg | IVX | CZ | | |
| 10184 | EQUORAL 50 MG | | por cps mol 50x50mg | IVX | CZ | | |
| 10185 | EQUORAL 100 MG | | por cps mol50x100mg | IVX | CZ | | |
| 92572 | CONSUPREN S 25 MG | | por cps mol 50x25mg | IVX | CZ | | |
| 92573 | CONSUPREN S 50 MG | | por cps mol 50x50mg | IVX | CZ | | |
| 92574 | CONSUPREN S 100 MG | | por cps mol50x100mg | IVX | CZ | | |
| 94052 | CONSUPREN | | sol 1x50ml 100mg/ml | IVX | CZ | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 183.2 | L04AA05 | tacrolimus do 0,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 428.70 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 183.3 | L04AA05 | tacrolimus nad 0,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 346.70 | P |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu tacrolimem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

1. transplantace ledvin
2. transplantace srdce
3. transplantace jater

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|------|------|----|--------|---|
| 183.4 | L04AA06 | mophetil mycophenolát | p.o. | 2.00 | GM | 359.10 | P |
|-------|---------|-----------------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu mophetil mycphenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin nebo transplantace srdce nebo plic. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 183.5 | L04AA10 | sirolimus | p.o. | 6.00 | MG | 663.38 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

Sirolimus ordinují lékaři transplantačních center u transplantaci ledvin jako profylaktickou imunosupresi s prednisonem a redukovanou dávkou cyklosporinu nebo bez něj nebo v případě nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů jako jejich náhrada.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|
| 183.6 | L04AA13 | leflunomid | p.o. | 20.00 | MG | 79.10 | P |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|

Léčbu leflunomidem indikuje revmatologem u pacientů s těžkou formou:

- a) revmatoidní artridy se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení a přetrvávající aktivitou nemoci při dostatečně dávce sulfasalazinu nebo metotrexátu, které jsou podávány nejméně po dobu 6 měsíců,
- b) psoritické artridy.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 183.7 | L04AX01 | azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 1.81 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 183.8 | L04AX01 | azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 1.12 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 184 | imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------|---------|---|----|-----------|---|
| 184.1 | L04AA | adalimumab | parent. | 2 | DF | 49 459.00 | X |
|-------|-------|------------|---------|---|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|------|-------|
| 184.2 | L04AA01 | cyklosporin | parent. | 1.00 | MG | 2.52 | U/J10 |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|------|-------|

88514 SANDIMMUN inf cnc sol 10x5ml NPA CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-----------|-------|
| 184.3 | L04AA02 | muromonab-CD3 | parent. | 5.00 | MG | 11 129.25 | U/J10 |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|----|--------|-------|
| 184.4 | L04AA03 | antilymfocytární IG | parent. | 10.00 | MG | 103.87 | U/J10 |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 184.5 | L04AA04 | antithymocytární IG (infuze) | parent. | 1.00 | MG | 69.40 | U/J10 |
|-------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 184.6 | L04AA04 | antithymocytární IG (injekce) | parent. | 1.00 | MG | 121.46 | U/J10 |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|
| 184.7 | L04AA05 | tacrolimus | parent. | 5.00 | MG | 1 544.69 | H |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|--------|----|------------|-------|
| 184.8 | L04AA08 | dacizumab | parent. | 350.00 | MG | 139 608.00 | U/J10 |
|-------|---------|-----------|---------|--------|----|------------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 184.9 | L04AA09 | basiliximab | parent. | 20.00 | MG | 50 354.15 | H |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|
| 184.10 | L04AA11 | etanerceptum | parent. | 7.00 | MG | 1 391.80 | X |
|--------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|-----------|---|
| 184.11 | L04AA12 | infliximab | parent. | 375.00 | MG | 66 975.00 | X |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 184.12 | L04AA21 | efalizumab | parent. | 1.00 | MG | 69,48 | X |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|------|-------|
| 184.13 | L04AX01 | azathioprin | parent. | 1.00 | MG | 9.82 | U/J10 |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|------|-------|

185 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|------|------|----|------|--|
| 185.1 | M01AA | butylpyrazolidiny | p.o. | 3.00 | DF | 3.32 | |
|-------|-------|-------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 185.2 | M01AA05 | klofezon | p.o. | 0.60 | GM | 3.32 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------|------|-------|----|------|--|
| 185.3 | M01AB | deriváty kyseliny octové | p.o. | 70.00 | MG | 1.76 | |
|-------|-------|--------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 185.4 | M01AB01 | indometacin | p.o. | 0.10 | GM | 2.47 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 185.5 | M01AB02 | sulindac | p.o. | 0.40 | GM | 4.36 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 185.6 | M01AB03 | tolmetin | p.o. | 0.70 | GM | 4.36 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 185.7 | M01AB05 | diklofenak | p.o. | 0.10 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

67541 ALMIRAL 50 tbl obd 20x50mg MOE CY

75604 DICLOFENAC AL 25 tbl obd 50x25mg APA D

75605 DICLOFENAC AL 25 tbl obd 100x25mg APA D

98108 NAKLOFEN tbl ent 20x50mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 185.8 | M01AB05 | diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku | p.o. | 0.10 | GM | 4.20 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 185.9 | M01AB06 | alclofenak | p.o. | 1.25 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 185.10 | M01AB09 | ionazolak | p.o. | 0.60 | GM | 4.00 | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 185.11 | M01AB16 | aceklofenak | p.o. | 0.20 | GM | 4.00 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 185.12 | M01AB55 | diklofenak/misoprostol (na diklofenaku) | p.o. | 0.10 | GM | 29.33 | Z |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|

186 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 186.1 | M01AE01 | ibuprofen | p.o. | 1.20 | GM | 3.50 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

32020 IBUPROFEN AL 400
97989 APO-IBUPROFEN 400 MG

tbl obd 100x400mg
tbl obd 100x400mg

APA D
APT CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 186.2 | M01AE01 | ibuprofen (lékové formy sirupu) | p.o. | 1.20 | GM | 19.55 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|
| 186.3 | M01AE02 | naproxen (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 186.4 | M01AE02 | naproxen (tekuté lékové formy), | p.o. | 0.50 | GM | 13.15 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 186.5 | M01AE03 | ketoprofen | p.o. | 0.15 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 186.6 | M01AE07 | suprofen | p.o. | 0.40 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 186.7 | M01AE08 | pirprofen | p.o. | 0.80 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 186.8 | M01AE09 | flurbiprofen | p.o. | 0.20 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 186.9 | M01AE10 | indoprofen | p.o. | 0.60 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 186.10 | M01AE11 | kyselina tiaprofenová | p.o. | 0.60 | GM | 4.00 | |
|--------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|---|
| 186.11 | M01AE12 | oxaprozin | p.o. | 0.90 | GM | 8.25 | P |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|---|

Oxaprozin se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 186.12 | M01AE17 | dexketoprofen | p.o. | 75.00 | MG | 4.52 | |
|--------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|
| 186.13 | M01AG02 | kyselina tolfenámová | p.o. | 0.30 | GM | 4.29 | |
|--------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 187 | ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva pro perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 187.1 | M01AC01 | piroxikam | p.o. | 20.00 | MG | 2.30 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

11068 PIROXICAM AL 20
53745 PRO-ROXIKAM 20MG
97710 APO-PIROXICAM 20

tbl 20x20mg

APA D

tbl 20x20mg

PMP CZ

cps 100x20mg

APT CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 187.2 | M01AC01 | piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku) | p.o. | 20.00 | MG | 4.20 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 187.3 | M01AC02 | tenoxikam | p.o. | 20.00 | MG | 2.30 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 187.4 | M01AC05 | lornoxikam | p.o. | 12.00 | MG | 2.30 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 187.5 | M01AC06 | meloxikam | p.o. | 15.00 | MG | 6.50 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- a) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- b) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- c) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění,
- b) osteoartróza nosních kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé irritace,
- c) primární dysmenorea.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně.

Léčiva ze skupiny specifických cox 2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě jejich indikování u pacientů trpících hypertenzi, hyperlipidémií, diabetem mellitus, periferním onemocněním tepen i úraků. Podávání cox 2 inhibitorů je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku.

Etoricoxib je navíc kontraindikován u nekompenzované hypertenze.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.6 | M01AH01 | celecoxib | p.o. | 0.20 | GM | 22.70 | P |
| 187.7 | M01AH03 | valdecoxib 10 mg | p.o. | 1.00 | DF | 22.70 | P |
| 187.8 | M01AH03 | valdecoxib 20 mg | p.o. | 1.00 | DF | 25.90 | P |
| 187.9 | M01AH03 | valdecoxib 40 mg | p.o. | 1.00 | DF | 24.30 | P |

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza a revmatoidní artrida denní dávka valdecoxibu do 20 mg včetně, v indikaci primární dysmenorea denní dávka valdecoxibu v prvním dni do 80 mg včetně a následující dny do 40 mg včetně.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|---|
| 187.10 | M01AH05 | etoricoxib 120 mg v 1 tbl | p.o. | 60.00 | MG | 25.90 | P |
|--------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|---|

Etoricoxib v síle 120 mg v 1 tbl je hrazen ze zdravotního pojištění při akutním dnávém záchvatu.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.11 | M01AH05 | etoricoxib 60 mg v 1 tbl | p.o. | 1.00 | DF | 22.70 | P |
| 187.12 | M01AH05 | etoricoxib 90 mg v 1 tbl | p.o. | 1.00 | DF | 25.90 | P |
| 187.13 | M01AX01 | nabumeton | p.o. | 1.00 | GM | 6.50 | P |

Nabumeton se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 187.14 | M01AX04 | azapropazon | p.o. | 0.75 | GM | 6.50 | |
| 187.15 | M01AX13 | proquazone | p.o. | 0.90 | GM | 6.50 | |
| 187.16 | M01AX17 | nimesulid | p.o. | 0.20 | GM | 6.50 | |

188 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|------|----|-------|--|
| 188.1 | M01AA | butylpyrazolidiny | parent. | 1.00 | DF | 6.89 | |
| 188.2 | M01AB01 | indometacin | p.rect. | 0.10 | GM | 3.27 | |
| 188.3 | M01AB01 | indometacin | parent. | 0.10 | GM | 12.66 | |
| 188.4 | M01AB03 | tolmetin | p.rect. | 0.70 | GM | 10.56 | |
| 188.5 | M01AB05 | diklofenak | p.rect. | 0.10 | GM | 8.50 | |
| 188.6 | M01AB05 | diklofenak | parent. | 0.10 | GM | 12.90 | |

67547 ALMIRAL inj 10x3ml/75mg MOE CY

67548 ALMIRAL inj 100x3ml/75mg MOE CY

98109 NAKLOFEN inj 5x3ml/75mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|--|
| 188.7 | M01AB09 | ionazolak | p.rect. | 0.60 | GM | 10.56 | |
| 188.8 | M01AC01 | piroxikam | p.rect. | 20.00 | MG | 8.50 | |
| 188.9 | M01AC01 | piroxikam | parent. | 20.00 | MG | 11.73 | |
| 188.10 | M01AC02 | tenoxikam | p.rect. | 20.00 | MG | 10.75 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 188.11 | M01AC02 | tenoxikam | parent. | 20.00 | MG | 11.73 | |
| 188.12 | M01AC05 | lornoxikam | parent. | 12.00 | MG | 11.73 | |
| 188.13 | M01AC06 | meloxikam | p.rect. | 15.00 | MG | 13.00 | P |

Meloxikam se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|
| 188.14 | M01AC06 | meloxikam | parent. | 15.00 | MG | 39.00 | P |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|

Meloxikam parenterální se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena a to v případě, že nelze použít tabletovou a čípkovou formu.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|---------|-------|----|--------|-----|
| 188.15 | M01AE01 | ibuprofen | p.rect. | 1.20 | GM | 9.38 | |
| 188.16 | M01AE01 | ibuprofen | parent. | 1.20 | GM | 13.73 | |
| 188.17 | M01AE02 | naproxen | p.rect. | 0.50 | GM | 10.75 | |
| 188.18 | M01AE02 | naproxen | parent. | 0.50 | GM | 13.73 | |
| 188.19 | M01AE03 | ketoprofen | p.rect. | 0.15 | GM | 8.37 | |
| 188.20 | M01AE03 | ketoprofen | parent. | 0.15 | GM | 15.45 | |
| 188.21 | M01AE11 | kyselina tiaprofenová | p.rect. | 0.60 | GM | 10.75 | |
| 188.22 | M01AG | etofenamat | parent. | 1.00 | GM | 13.73 | |
| 188.23 | M01AH04 | parecoxib do 3 amp v 1 bal. včetně | parent. | 80.00 | MG | 334.00 | P |
| 188.24 | M01AH04 | parecoxib nad 3 amp v 1 bal. | parent. | 80.00 | MG | 334.00 | O/P |

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s niže uvedeným rizikem:

- a) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- b) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- c) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění,
- b) osteoartróza nosních kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé irritace,
- c) primární dysmenorea.

Léčiva ze skupiny specifických cox 2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a nedobře kontrolovanou hypertenzí. Jejich podávání je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku.

Parecoxib je hrazen pro léčbu pooperační bolesti u pacientů s nesnášenlivostí opioidních analgetik nebo u pacientů s vředovou chorobou nebo krvácením do GIT v anamnéze.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 188.25 | M01AX17 | nimesulid | p.rect. | 0.20 | GM | 13.00 | P |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

Nimsulid k p.rect. aplikaci je indikován k léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 189 | specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|------|-------|
| 189.1 | M01CB01 | aurothiomalát sodný | parent. | 2.40 | MG | 6.10 | L/REV |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|------|-------|

02780 TAUREDON 50 injsol10x0.5ml/50mg AKZ D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|
| 189.2 | M01CC01 | penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě)p.o. | | 0.50 | GM | 27.28 | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|--|
| 189.3 | M01CC01 | penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.50 | GM | 22.56 | |
| 189.4 | N02BA | lysin acetylsalicylát | parent. | 3.00 | GM | 40.37 | |
| 189.5 | N02BA | lysin salicylát | parent. | 3.00 | GM | 41.79 | |
| 189.6 | N02BA04 | salicylát sodný | parent. | 3.00 | GM | 38.58 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 190 | lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|--------|----|------|--|
| 190.1 | M02AA | ketofenylbutazon do 50 g masti včetně lok. v jednom balení | | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.2 | M02AA | kombinace ibuprofenu a heparinoidu do lok. 50 g včetně v jednom balení | | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.3 | M02AA | protizánětlivé přípr., nesteroidní lok. k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení | | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.4 | M02AA05 | benzydamin | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.5 | M02AA06 | etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.6 | M02AA06 | etofenamát nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.7 | M02AA07 | piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.8 | M02AA07 | piroxikam nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.9 | M02AA10 | ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.10 | M02AA10 | ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.11 | M02AA10 | ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu) | lok. | 150.00 | MG | 5.50 | |
| 190.12 | M02AA13 | ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.13 | M02AA13 | ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.14 | M02AA15 | diklofenak (transdermální lékové formy) | transd. | 2.00 | DF | 5.08 | |
| 190.15 | M02AA15 | diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.16 | M02AA15 | diklofenak nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--|------|------|----|------|--|
| 65985 | VERAL GEL | gel 1x100gm 1% | SLO | SK | | | |
| 67550 | ALMIRAL GEL | gel 1x250gm | MOE | CY | | | |
| 190.17 | M02AA17 | kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.18 | M02AA21 | tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---|---------|--------|----|----------|---|
| 190.19 | M02AA21 | tolectin nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.20 | M02AA23 | indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.21 | M02AA23 | indomethacin nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.22 | M02AA23 | indomethacin spray | lok. | 1.00 | ML | 0.85 | |
| 190.23 | M02AC | přípravky s deriváty kyseliny salicylové | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.24 | M02AX | jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ. | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.25 | M02AX10 | různé | lok. | 1.00 | GM | 0.21 | |
| 191 | svalová relaxancia | | | | | | |
| 191.1 | M03AA01 | alkuronium | parent. | 20.00 | MG | 70.43 | H |
| 191.2 | M03AA02 | tubokurarin | parent. | 30.00 | MG | 55.82 | H |
| 191.3 | M03AB | decamethonium | parent. | 10.00 | MG | 23.76 | H |
| 191.4 | M03AB01 | suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | MG | 63.84 | H |
| 191.5 | M03AB01 | suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | MG | 40.52 | H |
| 191.6 | M03AC02 | gallamin | parent. | 100.00 | MG | 43.11 | H |
| 191.7 | M03AC01 | pankuronium | parent. | 10.00 | MG | 113.59 | H |
| 191.8 | M03AC03 | vekuronium | parent. | 10.00 | MG | 113.59 | H |
| 191.9 | M03AC04 | atrakurium | parent. | 50.00 | MG | 98.58 | H |
| 191.10 | M03AC06 | pipekuronium | parent. | 10.00 | MG | 103.48 | H |
| 191.11 | M03AC09 | rokuroniumbromid | parent. | 50.00 | MG | 200.00 | H |
| 191.12 | M03AC10 | mivacuronium | parent. | 10.00 | MG | 123.20 | H |
| 42587 | MIVACRON | inj 5x10ml/20mg | WFD | GB | | | |
| 42588 | MIVACRON | inj 5x10ml/20mg | GAK | I | | | |
| 42589 | MIVACRON | inj 5x5ml/10mg | GAK | I | | | |
| 42590 | MIVACRON | inj 5x5ml/10mg | WFD | GB | | | |
| 191.13 | M03AC11 | cisatracurium | parent. | 10.00 | MG | 208.40 | H |
| 191.14 | M03AX01 | botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | U | 9 075.20 | X |
| 191.15 | M03AX01 | botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | U | 2 268.80 | X |
| 191.16 | M03CA01 | dantrolen | parent. | 0.10 | GM | 7 008.60 | T |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 192.1 | M04AA01 | allopurinol | p.o. | 0.40 | GM | 3.28 | |
| 192.2 | M04AB02 | sulfipyrazon | p.o. | 0.30 | GM | 5.08 | |
| 192.3 | M04AB03 | benzbromaron | p.o. | 0.10 | GM | 1.86 | |
| 192.4 | M04AC01 | kolchicin | p.o. | 1.00 | MG | 5.61 | |

62380 COLCHICUM-DISPERT tbl obd 50x500rg SVP D

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|------|-------|----|-------|---|
| 193 | léčiva působící na mineralizaci kostí | | | | | | |
| 193.1 | G03XC01 | raloxifen | p.o. | 60.00 | MG | 31.00 | P |

Raloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog u postmenopauzálních žen s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|----------|---|
| 193.2 | M05BA02 | kyselina kladronová | parent. | 1.50 | GM | 2 305.80 | P |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|----------|---|

94460 BONEFOS 400 MG cps 100x400mg LOY SF

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 193.3 | M05BA02 | kyselina kladronová do 400 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.60 | GM | 197.94 | P |
| 193.4 | M05BA02 | kyselina kladronová nad 400 mg do 520 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.60 | GM | 304.54 | P |
| 193.5 | M05BA02 | kyselina kladronová nad 520 mg do 800 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.60 | GM | 197.94 | P |

Léčbu kyselinou kladronovou ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:

- a) destrukcí kostí a hyperkalcémii provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,
- b) mnohočetným myelomem.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|-------|----|----------|---|
| 193.6 | M05BA03 | kyselina pamidronová | parent. | 60.00 | MG | 3 758.01 | P |
|-------|---------|----------------------|---------|-------|----|----------|---|

Léčbu kyselinou pamidronovou ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog u pacientů s:

- a) destrukcí kostí a hyperkalcémii provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich,
- b) mnohočetným myelomem,
- c) manifestní Pagetovou chorobou.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 193.7 | M05BA04 | kyselina alendronová s obsahem do 10 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 10.00 | MG | 31.95 | P |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 193.8 | M05BA04 | kyselina alendronová s obsahem nad 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 10.00 | MG | 32.83 | P |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---|

Léčbu kyselinou alendronovou ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:

- a) pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,
- b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT).

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je hrazena pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|------|----|----------|---|
| 193.9 | M05BA06 | kyselina ibandronová | parent. | 2.00 | MG | 2 717.00 | P |
|-------|---------|----------------------|---------|------|----|----------|---|

Léčbu kyselinou ibandronovou parent. a p.o. v tabletě o síle 50mg, ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:

- a) destrukcí kostí a hyperkalcémii provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,
- b) mnohočetným myelomem.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|---|----|-------|---|
| 193.10 | M05BA06 | kyselina ibandronová s obsahem do 2,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1 | DF | 31.95 | P |
|--------|---------|---|------|---|----|-------|---|

Léčbu kyselinou ibandronovou p.o. v tabletě o síle 2,5mg včetně ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:

- a) pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,
- b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT).

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je hrazena pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|---|----|--------|---|
| 193.11 | M05BA06 | kyselina ibandronová s obsahem 50 mg p.o. v jedné tabletě | | 1 | DF | 197.94 | P |
|--------|---------|--|--|---|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|------|------|----|-------|---|
| 193.12 | M05BA07 | kyselina risedronová | p.o. | 5.00 | MG | 31.95 | P |
|--------|---------|----------------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu kyselinou risedronovou ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:

- a) pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,
- b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT).

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je hrazena pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|---------|------|----|----------|---|
| 193.13 | M05BA08 | kyselina zoledronová | parent. | 4.00 | MG | 8 150.00 | P |
|--------|---------|----------------------|---------|------|----|----------|---|

Léčba kyselinou zoledronovou je indikována onkologem, hematologem, urologem a pneumologem u pacientů:

- a) v 1.linii léčby osteoblastických a smíšených kostních metastáz solidních tumorů a ve 2.linii léčby osteolytických lesí mnhohočetného myelomu,
- b) s hyperkalcemii vyvolanou nádorovým onemocněním nereagujícím dostatečně na předchozí aplikaci jiných bisfosfonátů.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|------|------|----|-------|---|
| 193.14 | M05BX03 | stroncium-ranelát | p.o. | 2.00 | GM | 43.00 | P |
|--------|---------|-------------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu stroncium-ranelát ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog a gynekolog u pacientek:

- a) s komplikovanou osteoporosou, definovanou jako T-skore -2,5 na standardních měřených místech (bederní páteř, proximální femur, event. předloktí) metodou dvoufotonové kostní densitometrie a pokud má pacientka osteoporotickou frakturu,
 - b) u kterých jsou kontraindikované bisfosfonáty nebo raloxifen,
 - c) nesnášejících jiná antiresorpční léčiva nebo při projevech závažných nežádoucích účinků na této léčbě.
- Léčba delší než 2 roky je indikovaná pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní density.

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 194 | ostatní léčiva používaná u nemoci muskuloskeletálního systému | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|------|------|----|-------|------------|
| 194.1 | M01AX05 | glukosamin sulfat | p.o. | 1.00 | DF | 11.43 | L/REV, ORT |
|-------|---------|-------------------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|-------|------------|
| 194.2 | M01AX21 | diacerein | p.o. | 100.00 | MG | 15.24 | L/REV, ORT |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|-------|------------|
| 194.3 | M01AX25 | chondroitin sulfat | p.o. | 1.60 | GM | 14.66 | L/REV, ORT |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 194.4 | M03BA52 | carisoprodol a paracetamol v kombinaci | p.o. | 3.00 | DF | 2.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 194.5 | M03BX01 | baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 50.00 | MG | 9.97 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 194.6 | M03BX01 | baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 6.31 | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|
| 194.7 | M03BX02 | tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 12.00 | MG | 21.50 | L/NEU,ORT,REV |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|
| 194.8 | M03BX02 | tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 12.00 | MG | 15.84 | L/NEU,ORT,REV |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|
| 194.9 | M03BX04 | tolperison | p.o. | 200.00 | MG | 4.38 | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|

57785 MYDOCALM 50 MG por tbl flm 30x50mg GED H

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|------|--|
| 194.10 | M03BX04 | tolperison | parent. | 200.00 | MG | 9.58 | |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|------|-------|----|------|--|
| 194.11 | M03BX05 | thiocolchicosid | p.o. | 12.00 | MG | 9.97 | |
|--------|---------|-----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|--|
| 194.12 | M03BX05 | thiocolchicosid | parent. | 12.00 | MG | 39.10 | |
|--------|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 194.13 | M03BX07 | tetrazepam | p.o. | 0.10 | GM | 9.97 | |
| 194.14 | M09AB52 | multienzymy (obsahující pankreatin, trypsin, chymotrypsin, bromelain, papain, amylasu, lipasu, rutosid) | p.o. | 6.00 | DF | 8.80 | P |

Léčbu multienzymovými přípravky ordinuje onkolog, chirurg, internista nebo dermatolog u lymfedémů v souvislosti s radikální operací nebo s radioterapií pro malignitu, za podmínky, že ke kontrole lymfedému nedostačuje fyzikální léčba, nebo tuto nelze aplikovat.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 194.15 | N02BB02 | metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně) | parent. | 3.00 | GM | 44.53 | O |
| 194.16 | N02BB02 | metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli) | parent. | 3.00 | GM | 18.48 | O |
| 194.17 | N02BB73 | aminophenazon v kombinaci psycholeptiky | parent. | 1.00 | DF | 8.10 | O |
| 194.18 | N02BE01 | paracetamol (do 150 mg v jednom čípkup.rect. včetně) | parent. | 3.00 | GM | 90.96 | |
| 194.19 | N02BE01 | paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku) | p.rect. | 3.00 | GM | 26.98 | |
| 194.20 | N02BE05 | propacetamol | parent. | 1.00 | GM | 41.84 | O |
| 194.21 | M09AX01 | kyselina hyaluronová | parent. | 3.60 | MG | 195.52 | P |

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:
součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 195 | lokální anestetika ze skupiny esterů | | | | | | |
| 195.1 | N01AA01 | ether pro anestézii (diethylether) | inhal. | 100.00 | GM | 15.45 | H |
| 195.2 | N01BA | estery aminobenzoové kyseliny | parent. | 100.00 | ML | 19.55 | O |
| 195.3 | N01BA02 | prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | ML | 1.37 | O |
| 195.4 | N01BA02 | prokain (nad 10 ml v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | ML | 0.49 | O |

| | | | |
|-------|--|-----|----|
| 69670 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x250ml/500mg | ARD | CZ |
| 69671 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x500ml/1gm | ARD | CZ |
| 69673 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x250ml/1.25gm | ARD | CZ |
| 69674 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x500ml/2.5gm | ARD | CZ |
| 69676 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. inj 1x250ml | ARD | CZ |
| 69677 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. inj 1x500ml/5gm | ARD | CZ |
| 89212 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x200ml | ARD | CZ |
| 89214 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x200ml | ARD | CZ |
| 89216 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. inj 1x200ml | ARD | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|------|----|------|---|
| 196 | lokální anestetika ze skupiny amidů | | | | | | |
| 196.1 | N01BB | trimekain | lok. | 1.00 | GM | 1.18 | O |
| 196.2 | N01BB | trimekain (koncentrace 0,5%) | parent. | 1.00 | ML | 0.73 | O |
| 69705 | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x250ml 0.5% | ARD | CZ | | | | |
| 69706 | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x500ml 0.5% | ARD | CZ | | | | |
| 196.3 | N01BB | trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | ML | 1.43 | O |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 196.4 | N01BB | trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | ML | 0.40 | O |
| 196.5 | N01BB | trimekain (koncentrace 2%) | parent. | 1.00 | ML | 1.22 | O |
| 196.6 | N01BB | trimekain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 2.35 | O |
| 196.7 | N01BB01 | bupivakain | parent. | 1.00 | ML | 3.52 | O |
| 196.8 | N01BB01 | bupivakain (lékové formy spinal) | parent. | 1.00 | ML | 31.75 | O |
| 196.9 | N01BB02 | lidokain | parent. | 1.00 | ML | 1.22 | O |
| 196.10 | N01BB02 | lidokain (obsah 11 ml) | lok. | 1.00 | ML | 3.90 | P |
| 196.11 | N01BB02 | lidokain (obsah 6 ml) | lok. | 1.00 | ML | 5.60 | P |

Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 196.12 | N01BB03 | mepivakain | parent. | 1.00 | ML | 3.52 | O |
| 196.13 | N01BB08 | artikain | parent. | 1.00 | ML | 4.15 | O |
| 196.14 | N01BB08 | artikain (lékové formy hyperbar) | parent. | 1.00 | ML | 9.86 | O |
| 196.15 | N01BB09 | levobupivacain | parent. | 1.00 | ML | 11.60 | O |
| 196.16 | N01BB10 | ropivacain | parent. | 1.00 | ML | 11.60 | O |
| 196.17 | N01BB51 | bupivakain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 3.81 | O |

197 lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vazokonstriční látkou

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|------|---|
| 197.1 | N01BB52 | lidokain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 2.35 | O |
| 197.2 | N01BB58 | artikain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 4.44 | O |

93109 SUPRACAIN 4% inj 10x2ml LEX CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|--------|----|-------|---|
| 197.3 | N01BX01 | ethylchlorid | lok. | 100.00 | ML | 93.36 | O |
|-------|---------|--------------|------|--------|----|-------|---|

198 analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.1 | N02AA01 | morfin (100 a více mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 44,22 | |
| 198.2 | N02AA01 | morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 75.40 | |

80405 VENDAL RETARD 10MG tbl obd 30x10mg LAR A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.3 | N02AA01 | morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 50,53 | |
| 198.4 | N02AA01 | morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 47,15 | |
| 198.5 | N02AA01 | morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce) | p.o. | 0.10 | GM | 53,90 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 198.6 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy p.o. s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 61.60 | |
| 198.7 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy p.o. s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 58.36 | |
| 198.8 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení) | p.o. | 0.10 | GM | 39.10 | |
| 198.9 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení) | p.o. | 0.10 | GM | 17.60 | |
| 198.10 | N02AA03 | hydromorfon do 4 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 20.00 | MG | 98.60 | |
| 198.11 | N02AA03 | hydromorfon nad 4 mg do 8 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 20.00 | MG | 93.34 | |
| 198.12 | N02AA03 | hydromorfon nad 8 mg do 24 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 20.00 | MG | 88.50 | |
| 198.13 | N02AB02 | pethidin | p.o. | 0.40 | GM | 41.30 | |

| | |
|-----|---|
| 199 | analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|
| 199.1 | N02AA05 | oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 75.00 | MG | 125.10 | |
| 199.2 | N02AA05 | oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 75.00 | MG | 118.47 | |
| 199.3 | N02AA05 | oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě | p.o. | 75.00 | MG | 109.58 | |
| 199.4 | N02AA08 | dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.15 | GM | 32.71 | |

56874 DHC CONTINUS 90 MG por tbl ret 20x90mg NPP GB
 80451 DHC CONTINUS 60 MG por tbl ret 56x60mg NPP GB

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 199.5 | N02AA08 | dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 27.86 | |
| 199.6 | N02AC05 | benzitramid | p.o. | 10.00 | MG | 12.71 | |
| 199.7 | N02AD01 | pentazocin | p.o. | 0.20 | GM | 22.39 | |
| 199.8 | N02AX01 | tilidin | p.o. | 0.20 | GM | 19.78 | |
| 199.9 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované) | p.o. | 0.30 | GM | 15.70 | |
| 199.10 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 24.44 | |
| 199.11 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované) | p.o. | 0.30 | GM | 23.52 | |
| 199.12 | N02AX52 | tramadol hydrochlorid v kombinaci s paracetamolem | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | |

| | |
|-----|---|
| 200 | analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, ostatní cesty aplikace |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|---|
| 200.1 | N01AH01 | fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 137.80 | O |
| 200.2 | N01AH01 | fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 101.48 | O |
| 200.3 | N01AH02 | alfentanyl | parent. | 1.50 | MG | 46.89 | H |
| 200.4 | N01AH03 | sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně) | parent. | 0.60 | MG | 1 342.74 | H |
| 200.5 | N01AH03 | sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně) | parent. | 0.60 | MG | 644.02 | H |

21043 SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML inj sol10x10ml/50rg TRX A
 21044 SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML inj sol20x10ml/50rg TRX A
 30779 SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML inj sol 5x10ml/50rg TRX A

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 200.6 | N01AH03 | sufentanyl (nad 50 rg v ampuli) | parent. | 0.60 | MG | 718.96 | H |
| 200.7 | N01AH06 | remifentanyl | parent. | 1.00 | MG | 264.29 | H |
| 200.8 | N01AH51 | fentanyl v kombinacích | parent. | 4.00 | ML | 38.22 | H |
| 200.9 | N02AA01 | morfín (do 10 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 30.00 | MG | 15.45 | O |
| 200.10 | N02AA01 | morfín (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 30.00 | MG | 9.33 | O |
| 200.11 | N02AB02 | pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.40 | GM | 55.68 | O |
| 200.12 | N02AB02 | pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.40 | GM | 34.44 | O |
| 200.13 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 728.79 | P |
| 200.14 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 217.93 | P |
| 200.15 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 414.10 | P |
| 200.16 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 627.51 | P |

Fentanyl s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|----------|--------|----|--------|---|
| 200.17 | N02AC03 | piritramid | parent. | 300.00 | MG | 94.43 | O |
| 200.18 | N02AD01 | pentazocin | parent. | 0.20 | GM | 87.35 | O |
| 200.19 | N02AE01 | buprenorfin | subling. | 1.20 | MG | 80.00 | |
| 200.20 | N02AE01 | buprenorfin | parent. | 1.20 | MG | 200.40 | O |
| 200.21 | N02AE01 | buprenorfin (s řízeným uvolňováním 35 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 245.11 | P |
| 200.22 | N02AE01 | buprenorfin (s řízeným uvolňováním 50,5 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 357.05 | P |
| 200.23 | N02AE01 | buprenorfin (s řízeným uvolňováním 70 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 463.20 | P |

Buprenorfin s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 200.24 | N02AF01 | butorfanol | parent. | 12.00 | MG | 83.10 | O |
| 200.25 | N02AF02 | nalbufin | parent. | 80.00 | MG | 69.21 | O |
| 200.26 | N02AX01 | tilidin | parent. | 0.20 | GM | 16.37 | O |
| 200.27 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid | p.rect. | 0.30 | GM | 41.60 | |
| 200.28 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.30 | GM | 82.30 | O |
| 200.29 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.30 | GM | 43.00 | O |

| | |
|-----|--|
| 201 | analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, peroroální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 201.1 | N02BA | lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | GM | 8.65 | |
| 201.2 | N02BA | lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | GM | 6.45 | |
| 201.3 | N02BA01 | kyselina acetylsalicylová | p.o. | 3.00 | GM | 6.30 | |

00011 ACYLPYRIN tbl 10x500mg SLO SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|------|--|
| 201.4 | N02BA02 | aloxiprin | p.o. | 3.00 | GM | 6.45 | |
| 201.5 | N02BA03 | cholin salicylát | p.o. | 3.00 | GM | 8.65 | |
| 201.6 | N02BA11 | diflunisal | p.o. | 0.75 | GM | 5.72 | |

| | |
|-----|---|
| 202 | ostatní analgetika – antipyretika, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 202.1 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | GM | 8.67 | |
| 202.2 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | GM | 4.94 | |

03837 PARALEN 500 tbl 10x500mg LEX CZ
 05097 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg TOP CND
 83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 202.3 | N02BE01 | paracetamol (tekuté lékové formy) | p.o. | 3.00 | GM | 8.65 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | |
|-----|---------------|
| 203 | antimigrenika |
|-----|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|--------|--|
| 203.1 | N02CA01 | dihydroergotamin | p.o. | 4.00 | MG | 1.22 | |
| 203.2 | N02CA01 | dihydroergotamin | parent. | 4.00 | MG | 111.52 | |

90795 DIHYDERGOT inj 5x1ml/1mg NPA CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|--------|-------|----|-------|--|
| 203.3 | N02CA01 | dihydroergotamin nosní spray | inhal. | 1.00 | MG | 50.00 | |
| 203.4 | N02CA07 | lisurid | p.o. | 75.00 | RG | 0.73 | |
| 203.5 | N02CA52 | ergotamin, kombinace | p.o. | 4.00 | DF | 9.38 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 203.6 | N02CC01 | sumatriptan | parent. | 1.00 | DF | 899.35 | X |
| 203.7 | N02CC01 | sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 105.00 | |
| 203.8 | N02CC01 | sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 78.75 | |
| 203.9 | N02CC01 | sumatriptan (nosní sprej) | inhal. | 1.00 | DF | 292.50 | P |

Léčbu inhalačním sumatriptanem indikuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|-------------|-------|------|--------|-------|
| 203.10 | N02CC02 | naratriptan | p.o. | 2.50 | MG | 105.00 | |
| 203.11 | N02CC03 | zolmitriptan | p.o. | 2.50 | MG | 105.00 | |
| 203.12 | N02CC03 | zolmitriptan (nosní sprej) | inhal. | 1.00 | DF | 292.50 | P |
| 203.13 | N02CC04 | rizatriptan | p.o. | 10.00 | MG | 105.00 | |
| 203.14 | N02CC06 | eletriptan | p.o. | 40.00 | MG | 105.00 | |
| 203.15 | N02CX | lysín acetylsalicylát s metoklopramidem | v kombinaci | p.o. | 1.00 | DF | 21.66 |
| 203.16 | N02CX | pipethiaden | p.o. | 3.00 | DF | 2.54 | |
| 203.17 | N02CX01 | pizotifen | p.o. | 1.50 | MG | 5.87 | |
| 203.18 | N02CX06 | oxetoron | p.o. | 0.12 | GM | 5.87 | |

204 antiepileptika ze skupiny barbiturátů

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 204.1 | N03AA | fenobarbital pseudonorefedr. | p.o. | 0.10 | GM | 2.05 | |
| 204.2 | N03AA02 | fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě) včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 6.08 | |
| 204.3 | N03AA02 | fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 0.10 | GM | 126.25 | O |
| 204.4 | N03AA02 | fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 2.27 | |
| 204.5 | N03AA02 | fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.10 | GM | 13.46 | O |

84449 LUMINAL inj 5x1ml/200mg DET D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 204.6 | N03AA03 | primidon (pevné lékové formy) | p.o. | 1.25 | GM | 11.76 | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|

13731 LISKANTIN tbl 100x250mg DET D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 204.7 | N03AA03 | primidon (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.25 | GM | 45.51 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

205 antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 205.1 | N03AB02 | fenytoin | p.o. | 0.30 | GM | 2.40 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|

00297 SODANTON tbl 20x100mg SLO SK

62234 EPILAN D GEROT tbl 100x100mg GER A

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|---|
| 205.2 | N03AB02 | fenytoin | parent. | 0.30 | GM | 116.04 | O |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 205.3 | N03AB04 | mefenytoin | p.o. | 0.40 | GM | 2.44 | |
| 205.4 | N03AB52 | fentyoin, kombinace | p.o. | 3.00 | DF | 2.40 | |
| 205.5 | N03AD01 | ethosuximid (pevné lékové formy) | p.o. | 1.25 | GM | 16.78 | |
| 205.6 | N03AD01 | ethosuximid (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.25 | GM | 22.69 | |
| 205.7 | N03AD03 | mesuximid | p.o. | 0.90 | GM | 24.78 | |

206 antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 206.1 | N03AE01 | klonazepam | parent. | 8.00 | MG | 230.32 | O |
| 206.2 | N03AE01 | klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 8.00 | MG | 24.15 | |
| 206.3 | N03AE01 | klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 8.00 | MG | 12.71 | |
| 206.4 | N03AE01 | klonazepam (tekuté lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 33.60 | |
| 206.5 | N03AF01 | karbamazepin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 12.16 | |

62309 APO-CARBAMAZEPINE tbl 100x200mg APT CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 206.6 | N03AF01 | karbamazepin (retardované pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 16.94 | |
| 206.7 | N03AF01 | karbamazepin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 42.52 | |
| 206.8 | N03AF02 | oxcarbazepin | p.o. | 1.00 | GM | 11.10 | |

207 antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|----------|---|
| 207.1 | N03AG01 | natrium valproát | parent. | 1.50 | GM | 1 201.85 | K |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|----------|---|

54238 ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSLÖ. inj sol 5x3ml/300mg DET D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 207.2 | N03AG01 | natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 29.96 | |
| 207.3 | N03AG01 | natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 27.58 | |
| 207.4 | N03AG01 | natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 17.68 | |
| 207.5 | N03AG01 | natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 15.35 | |
| 207.6 | N03AG01 | natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 24.97 | |
| 207.7 | N03AG01 | natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 25.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|--------|-----------|
| 207.8 | N03AG01 | natrium valproát (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.50 | GM | 25.63 | |
| 207.9 | N03AG02 | valpromid | p.o. | 1.50 | GM | 25.61 | L/PSY,NEU |
| 207.10 | N03AG04 | vigabatrin | p.o. | 2.00 | GM | 122.90 | P |
| 207.11 | N03AG06 | tiagabín | p.o. | 30.00 | MG | 126.00 | P |

Léčbu tiagabinem a vigabatinem indikuje neurolog či psychiátr pro léčbu epileptických záхватů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),
2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | ostatní antiepileptika | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-----------|
| 208.1 | N03AX03 | sultiam | p.o. | 0.40 | GM | 15.87 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-----------|

55852 OSPOLOT tbl obd 50x200mg DET D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 208.2 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 175.75 | P |
| 208.3 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 136.80 | P |
| 208.4 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 500.00 | P |
| 208.5 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 300.00 | P |

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiátr, neurolog pro děti do 15. let, které nemohou být léčeny tabletovou formou.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|-----------|
| 208.6 | N03AX09 | lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 50.59 | L/PSY,NEU |
| 208.7 | N03AX09 | lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 56.62 | L/PSY,NEU |
| 208.8 | N03AX09 | lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 47.00 | L/PSY,NEU |
| 208.9 | N03AX10 | felbamat | p.o. | 2.40 | GM | 274.54 | L/PSY,NEU |
| 208.10 | N03AX11 | topiramát tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 147.50 | L/PSY,NEU |
| 208.11 | N03AX11 | topiramát tablety (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 119.60 | L/PSY,NEU |
| 208.12 | N03AX11 | topiramát tobolky (do 15 mg včetně v jedné tobolce) | p.o. | 0.30 | GM | 285.00 | P |
| 208.13 | N03AX11 | topiramát tobolky (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolce) | p.o. | 0.30 | GM | 175.75 | P |

Topiramat - léková forma tobolky: předepisuje psychiátr, neurolog pro děti do 15. let, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|-----------|
| 208.14 | N03AX11 | topiramát tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 131.80 | L/PSY,NEU |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|------|--------|----|--------|-----------|
| 208.15 | N03AX12 | gabapentin | p.o. | 1.80 | GM | 100.80 | L/PSY,NEU |
| 208.16 | N03AX16 | pregabalin | p.o. | 300.00 | MG | 119.70 | P |
| 208.17 | N03AX14 | levetiracetam | p.o. | 2.00 | GM | 126.00 | P |

Léčbu levetiracetarem a pregabalinem indikuje neurolog či psychiátr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),
2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Léčba pregabalinem je také indikovaná u pacientů, u kterých nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi v léčbě neuropatické bolesti (tj. nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) po nejméně 4 týdny trvající léčbě látkami první volby (amitriptylin, karbamazepin, gabapentin). Kontrola účinnosti léčby pregabalinem je provedena nejpozději po 4 týdnech; pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále hrazena.

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 209 | Anticholinergní antiparkinsonika | | | | | | |
| 209.1 | N04AA | hydrochlorid diethazinu | p.o. | 0.25 | GM | 7.15 | |
| 209.2 | N04AA02 | biperiden | p.o. | 10.00 | MG | 12.22 | |
| 209.3 | N04AA02 | biperiden | parent. | 10.00 | MG | 56.89 | O |
| 209.4 | N04AA03 | metixen | p.o. | 40.00 | MG | 18.09 | |
| 209.5 | N04AA04 | procyclidin | p.o. | 25.00 | MG | 8.80 | |

03481 KEMADRIN por tbl nob 100x5mg GWE D

03483 KEMADRIN por tbl nob 100x5mg WFD GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|
| 209.6 | N04AA08 | dexetimid | parent. | 0.12 | MG | 1.71 | O |
| 209.7 | N04AC01 | benztropin | p.o. | 2.00 | MG | 3.12 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------|------|----|-------|--|
| 210 | dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů | | | | | | |
| 210.1 | N04BA01 | levodopa | p.o. | 3.50 | GM | 24.64 | |
| 210.2 | N04BA02 | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 32.75 | |
| 210.3 | N04BA02 | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 26.69 | |
| 210.4 | N04BA02 | levodopa/benserazid | p.o. | 0.60 | GM | 22.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 210.5 | N04BA02 | levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 29.62 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

45241 ISICOM 100 MG tbl 100x100mg DET D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 210.6 | N04BA02 | levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 19.31 | |
| 210.7 | N04BA03 | levodopa/karbidopa a entacapon (do 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 35.17 | X |
| 210.8 | N04BA03 | levodopa/karbidopa a entacapon (nad 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 37.85 | X |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---------|-------|----|--------|---------------|
| 211 | antiparkinsonika z ostatních skupin | | | | | | |
| 211.1 | N04BB01 | amantadin | parent. | 0.20 | GM | 4.25 | H |
| 211.2 | N04BB01 | amantadin hydrochlorid | p.o. | 0.20 | GM | 5.52 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.3 | N04BB01 | amantadin sulfát | p.o. | 0.20 | GM | 7.33 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.4 | N04BC03 | dihydroergokriptin | p.o. | 10.00 | MG | 15.30 | X |
| 211.5 | N04BC04 | ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 6.00 | MG | 69.18 | X |
| 211.6 | N04BC04 | ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě | p.o. | 6.00 | MG | 63.17 | X |
| 211.7 | N04BC05 | pramipexol | p.o. | 2.50 | MG | 105.25 | X |
| 211.8 | N04BD01 | selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.49 | L/NEU,PSY,GER |
| 03073 | APO-SELEG | por tbl nob 100x5mg | APT | CND | | | |
| 03074 | APO-SELEG | por tbl nob 50x5mg | APT | CND | | | |
| 211.9 | N04BD01 | selegilin nad 5 mg v 1 tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 5.10 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.10 | N04BX01 | tolkapon | p.o. | 0.30 | GM | 116.72 | X |
| 211.11 | N04BX02 | entacapon | p.o. | 1.00 | GM | 145.00 | X |
| 212 | antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT | | | | | | |
| 212.1 | N04BC02 | pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 159.40 | X |
| 13531 | HIZEST 0.05 MG | por tbInob30x0.05mg | IXP | CZ | | | |
| 13532 | HIZEST 0.05 MG | porttbInob100x0.05mg | IXP | CZ | | | |
| 212.2 | N04BC02 | pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 131.12 | X |
| 13533 | HIZEST 0.25 MG | por tbInob30x0.25mg | IXP | CZ | | | |
| 13534 | HIZEST 0.25 MG | porttbInob100x0.25mg | IXP | CZ | | | |
| 212.3 | N04BC02 | pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 119.66 | X |
| 13535 | HIZEST 1 MG | porttbInob30x1mg | IXP | CZ | | | |
| 13536 | HIZEST 1 MG | porttbInob100x1mg | IXP | CZ | | | |
| 213 | antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika – fenothiaziny, perorální podání | | | | | | |
| 213.1 | N05AA01 | chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 12.19 | |
| 213.2 | N05AA01 | chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 6.53 | |
| 213.3 | N05AA01 | chlorpromazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 62.76 | |
| 213.4 | N05AA02 | levomepromazin | p.o. | 0.30 | GM | 16.94 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|
| 213.5 | N05AA03 | promazin | p.o. | 0.30 | GM | 13.49 | |
| 213.6 | N05AB03 | perfenazin | p.o. | 30.00 | MG | 1.83 | |
| 213.7 | N05AB04 | prochlorperazin | p.o. | 0.10 | GM | 12.42 | |
| 213.8 | N05AB06 | trifluoperazin | p.o. | 20.00 | MG | 6.99 | |
| 213.9 | N05AB08 | thioproperazin | p.o. | 75.00 | MG | 6.70 | |
| 213.10 | N05AC01 | periciazin (pevné lékové formy) | p.o. | 50.00 | MG | 5.72 | L/NEU,PSY,GER |
| 213.11 | N05AC01 | periciazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | MG | 5.19 | L/NEU,PSY,GER |
| 213.12 | N05AC02 | thioridazin | p.o. | 0.30 | GM | 10.03 | |

00325 THIORIDAZIN 100 LÉČIVA drg 20x100mg LEX CZ

| | |
|-----|--|
| 214 | neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|------|-------|----|--------|---|
| 214.1 | N05AD01 | haloperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 6.06 | |
| 10575 | APO-HALOPERIDOL 5 | por tbl nob 100x5mg | APT | CND | | | |
| 98291 | APO-HALOPERIDOL | tbl 100x1mg | APT | CND | | | |
| 214.2 | N05AD01 | haloperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 10.12 | |
| 214.3 | N05AD02 | trifluperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | MG | 3.91 | |
| 214.4 | N05AD02 | trifluperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | MG | 7.72 | |
| 214.5 | N05AD03 | melperon | p.o. | 0.30 | GM | 24.94 | |
| 214.6 | N05AE03 | sertindol | p.o. | 1.00 | DF | 110.50 | P |
| 214.7 | N05AE04 | ziprasidon | p.o. | 80.00 | MG | 110.50 | P |

Ziprasidon a sertindol indikuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

| | |
|-----|---|
| 215 | neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 215.1 | N05AF | oxyprotepin | p.o. | 20.00 | MG | 18.28 | |
| 215.2 | N05AF01 | flupentixol | p.o. | 6.00 | MG | 15.70 | |
| 215.3 | N05AF03 | chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 26.39 | |
| 215.4 | N05AF03 | chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 8.18 | |
| 215.5 | N05AF03 | chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 13.27 | |
| 215.6 | N05AF05 | zuklopenthixol | p.o. | 30.00 | MG | 13.27 | |

57827 CISORDINOL 25 MG por tbl flm 50x25mg LUN DK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 215.7 | N05AG02 | pimozid | p.o. | 4.00 | MG | 10.76 | |
| 215.8 | N05AG03 | penfluridol | p.o. | 6.00 | MG | 6.01 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------|-------|----|--------|-----------|
| 216 | neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy, perorální podání | | | | | | |
| 216.1 | N05AH01 | lozapin | p.o. | 0.10 | GM | 52.20 | L/PSY |
| 216.2 | N05AH02 | klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 57.16 | L/PSY,NEU |
| 216.3 | N05AH02 | klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 50.20 | L/PSY,NEU |
| 216.4 | N05AH02 | klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 46.03 | L/PSY |
| 216.5 | N05AH03 | olanzapin | p.o. | 10.00 | MG | 110.50 | P |

Olanzapin indikuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární afektivní poruchou při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky. Toto omezení se nevtahuje pro prevenci rekurentní bipolární efektivní poruchy.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 216.6 | N05AH04 | quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletě | p.o. | 0.40 | GM | 234.60 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

Quetiapin v dávce do 25 mg v jedné tabletě indikuje neurolog nebo psychiatr u pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 216.7 | N05AH04 | quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.40 | GM | 110.50 | P |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|--------|---|

Quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě indikuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenní nebo manickou epizodou bipolární afektivní poruchy při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 216.8 | N05AL01 | sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.80 | GM | 31.80 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 216.9 | N05AL01 | sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.80 | GM | 18.90 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|-------|-----------|

46743 SULPIROL 200 por tbl nob100x200mg HEX D

46746 SULPIROL 200 por tbl nob100x200mg SFS D

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 216.10 | N05AL03 | tiaprid (pevné lékové formy) | p.o. | 0.40 | GM | 14.00 | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 216.11 | N05AL03 | tiaprid (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.40 | GM | 37.70 | |
|--------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|--------|----|-------|-------|
| 216.12 | N05AL05 | amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletě | p.o. | 400.00 | MG | 74.05 | L/PSY |
|--------|---------|---|------|--------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|
| 216.13 | N05AL05 | amisulprid (pevné lékové formy) do 50 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 16.70 | L/PSY,NEU |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 217 | ostatní antipsychotika, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|
| 217.1 | N05AX08 | risperidon (s obsahem do 1 mg včetně) | p.o. | 5.00 | MG | 30.00 | L/PSY, NEU, GER, INT |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|

42525 RISPEN 1 por tbl film 50x1mg LEX CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|
| 217.2 | N05AX08 | risperidon (s obsahem nad 1 mg) | p.o. | 5.00 | MG | 31.00 | L/PSY, NEU, GER, INT |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|

42527 RISPEN 2 por tbl film 50x2mg LEX CZ

42529 RISPEN 3 por tbl film 50x3mg LEX CZ

42531 RISPEN 4 por tbl film 50x4mg LEX CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|--------|----------------------|
| 217.3 | N05AX08 | risperidon (tekuté lékové formy) | p.o. | 5.00 | MG | 109.25 | L/PSY, NEU, GER, INT |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|--------|----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-------|
| 217.4 | N05AX11 | zotepin | p.o. | 0.20 | GM | 74.05 | L/PSY |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|--------|---|
| 217.5 | N05AX12 | aripiprazol | p.o. | 15.00 | MG | 132.60 | P |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|--------|---|

Aripiprazol indikuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při neúčinnosti či nesnášenlivosti léčby alespoň dvěma antipsychotiky, z toho jedním 2. generace.

| | |
|-----|---------|
| 218 | Lithium |
|-----|---------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 218.1 | N05AN01 | lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | GM | 4.72 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

LITHIUM
02481 SLOVAKOFARMA CARBONICUM
tbl 100x300mg SLO SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 218.2 | N05AN01 | lithium nad 0,3 g v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | GM | 3.14 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | |
|-----|---|
| 219 | antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace – nedepotní přípravky |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-------|---|
| 219.1 | N05AA01 | chlorpromazin | parent. | 0.10 | GM | 25.37 | O |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|-------|---|
| 219.2 | N05AA02 | levomepromazin | parent. | 0.10 | GM | 30.89 | O |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 219.3 | N05AD01 | haloperidol | parent. | 8.00 | MG | 16.72 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|
| 219.4 | N05AD02 | trifluperidol | parent. | 2.00 | MG | 5.52 | O |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|---|
| 219.5 | N05AD03 | melperon | parent. | 0.30 | GM | 50.10 | O |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 219.6 | N05AD08 | droperidol | parent. | 25.00 | MG | 50.10 | O |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|
| 219.7 | N05AE04 | ziprasidon | parent. | 40.00 | MG | 177.00 | H |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|---------|------|----|------|---|
| 219.8 | N05AF | oxyprotepin | parent. | 1.00 | MG | 2.55 | O |
|-------|-------|-------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|-------|----|------|---|
| 219.9 | N05AF03 | chlorprothixen | parent. | 50.00 | MG | 3.03 | O |
|-------|---------|----------------|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|-------|----|-------|---|
| 219.10 | N05AF05 | zuklopenthixol | parent. | 30.00 | MG | 94.25 | O |
|--------|---------|----------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|------|----|-------|---|
| 219.11 | N05AH02 | klozapin | parent. | 0.30 | GM | 86.22 | H |
|--------|---------|----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|
| 219.12 | N05AH03 | olanzapin | parent. | 10.00 | MG | 177.00 | H |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|

32601 ZYPREXA INTRAMUSCULAR inj plv sol 1x10mg LPF D

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 219.13 | N05AL01 | sulpirid | parent. | 0.80 | GM | 71.33 | O/PSY,NEU |
|--------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|
| 219.14 | N05AL03 | tiaprid | parent. | 0.40 | GM | 41.88 | O |
|--------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|

| | |
|-----|---|
| 220 | antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace – depotní přípravky |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|
| 220.1 | N05AB02 | flufenazin | parent. | 1.00 | MG | 3.92 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|

03514 MODITEN DEPOT inj 5x1ml/25mg BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 220.2 | N05AD01 | haloperidol (depotní lékové formy) | parent. | 3.30 | MG | 9.82 | O |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 220.3 | N05AF01 | flupentixol | parent. | 4.00 | MG | 15.16 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 220.4 | N05AF05 | zuklopenthixol (depotní formy) | parent. | 15.00 | MG | 11.78 | O |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 220.5 | N05AG01 | fluspirilen | parent. | 0.70 | MG | 12.39 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 220.6 | N05AX08 | risperidon s obsahem nad 25 mg v jedné ampuli | parent. | 1.80 | MG | 291.13 | P |
| 220.7 | N05AX08 | risperidon s obsahem do 25 mg v jedné ampuli včetně | parent. | 1.80 | MG | 303.26 | P |

Risperidon ve formě depotní injekce je indikován psychiatrem u schizofrenních pacienta s dobrou prognózou, který splňuje všechny níže uvedené podmínky zároveň:

- a) negativním skórem v dotazníku DAI-10 je u něj potvrzena non-adherence k léčbě,
- b) byl opakován hospitalizován pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby,
- c) byl léčen alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alepspoj jedno bylo antipsychotikum atypické.

Léčba pacienta splňujícího výše uvedené je ukončena, pokud relabuje během 12 měsíců od zahájení léčby injekčním risperidonem, nebo pokud léčbu není možné řádně dávkovat pro pokračující nespolupráci pacienta.

| 221 anxiolytika, perorální podání | | | | | | | |
|--|---------|--|------|-------|----|------|---|
| 221.1 | N05BA01 | diazepam | p.o. | 10.00 | MG | 0.68 | |
| 221.2 | N05BA02 | chlordiazepoxid | p.o. | 30.00 | MG | 0.68 | |
| 221.3 | N05BA03 | medazepam | p.o. | 20.00 | MG | 0.68 | |
| 221.4 | N05BA04 | oxazepam | p.o. | 50.00 | MG | 0.68 | |
| 221.5 | N05BA05 | klorazepát draselný | p.o. | 20.00 | MG | 0.68 | |
| 221.6 | N05BA06 | lorazepam | p.o. | 2.50 | MG | 0.68 | |
| 221.7 | N05BA08 | bromazepam | p.o. | 10.00 | MG | 0.68 | |
| 221.8 | N05BA09 | klobazam | p.o. | 20.00 | MG | 0.68 | |
| 221.9 | N05BA11 | prazepam | p.o. | 30.00 | MG | 0.68 | |
| 221.10 | N05BA12 | alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 2.49 | P |

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

59758 FRONTIN 1.0MG tbl 30x1mg EGI H
 59759 FRONTIN 1.0MG tbl 100x1mg EGI H

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 221.11 | N05BA12 | alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 0.68 | |
| 221.12 | N05BA23 | tofisopam | p.o. | 0.15 | GM | 0.68 | |
| 221.13 | N05BB01 | hydroxyzin | p.o. | 75.00 | MG | 0.68 | |
| 221.14 | N05BC01 | meprobamat | p.o. | 1.20 | GM | 0.68 | |
| 221.15 | N05BE01 | buspiron | p.o. | 30.00 | MG | 2.51 | |
| 221.16 | N05BX01 | mefenoxalon | p.o. | 1.20 | GM | 16.38 | |

| 222 anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|--------|---------------|
| 222.1 | N05BA01 | diazepam | parent. | 10.00 | MG | 6.98 | |
| 222.2 | N05BA01 | diazepam (do 5 mg v jednom čípkup.rect.) | p.rect. | 10.00 | MG | 108.16 | L/NEU,PSY,PED |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|----------|---------------|
| 222.3 | N05BA01 | diazepam (nad 5 mg v jednom čípku) | p.rect. | 10.00 | MG | 67.14 | L/NEU,PSY,PED |
| 222.4 | N05BA05 | klorazepát draselný | parent. | 20.00 | MG | 14.66 | |
| 222.5 | N05CA01 | pentobarbital | parent. | 0.10 | GM | 23.32 | H |
| 222.6 | N05CM | dexmedetomidin | parent. | 500.00 | RG | 1 300.00 | H |

223 Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 223.1 | N06AA01 | desipramin | p.o. | 0.10 | GM | 17.11 | |
| 223.2 | N06AA02 | imipramin | p.o. | 0.10 | GM | 9.90 | |
| 223.3 | N06AA04 | klomipramin | p.o. | 0.10 | GM | 14.49 | |

08557 ANAFRANIL 25 por tbl obd 30x25mg NPA CH
 93828 ANAFRANIL SR 75 por tbl ret 20x75mg NPA CH

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|--------|----|-------|--|
| 223.4 | N06AA05 | opipramol | p.o. | 0.15 | GM | 12.02 | |
| 223.5 | N06AA07 | lofepramin | p.o. | 105.00 | MG | 14.66 | |
| 223.6 | N06AA08 | dibenzepin | p.o. | 0.30 | GM | 14.90 | |
| 223.7 | N06AA09 | amitriptylin | p.o. | 75.00 | MG | 2.85 | |
| 223.8 | N06AA10 | nortriptylin | p.o. | 75.00 | MG | 9.02 | |
| 223.9 | N06AA16 | dosulepin | p.o. | 150.00 | MG | 9.78 | |
| 223.10 | N06AA21 | maprotilin | p.o. | 100.00 | MG | 12.28 | |

224 Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|----------------------|------|-------|----|-------|--|
| 224.1 | N06AB03 | fluoxetin | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | |
| 32736 | FLUZAK | por cps dur 10x20mg | SVS | CZ | | | |
| 32737 | FLUZAK | por cps dur 20x20mg | SVS | CZ | | | |
| 32738 | FLUZAK | por cps dur 30x20mg | SVS | CZ | | | |
| 32739 | FLUZAK | por cps dur 50x20mg | SVS | CZ | | | |
| 44397 | APO-FLUOXETINE | cps 30x20mg | APT | CND | | | |
| 44398 | APO-FLUOXETINE | cps 100x20mg | APT | CND | | | |
| 54422 | MAGRILAN | cps 10x20mg | MOE | CY | | | |
| 54423 | MAGRILAN | cps 30x20mg | MOE | CY | | | |
| 64656 | FLUOXIN | por cps dur 20x20mg | SFS | D | | | |
| 64657 | FLUOXIN | por cps dur 50x20mg | SFS | D | | | |
| 64658 | FLUOXIN | por cps dur 100x20mg | SFS | D | | | |
| 92346 | DEPREX | por cps dur 30x20mg | LEX | CZ | | | |
| 95457 | FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG | por cps dur 30x20mg | MCK | D | | | |
| 95458 | FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG | por cps dur 100x20mg | MCK | D | | | |
| 98779 | FLUOXIN | por cps dur 30x20mg | SFS | D | | | |
| 98791 | DEPREX LÉČIVA | por cps dur 30x20mg | LEX | CZ | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 224.2 | N06AB04 | citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 20.00 | MG | 13.50 | |
| 224.3 | N06AB04 | citalopram nad 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | |
| 224.4 | N06AB04 | citalopram, tekuté lékové formy | p.o. | 20.00 | MG | 13.80 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|--------|----|-------|--|
| 224.5 | N06AB05 | paroxetin | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | |
| 224.6 | N06AB06 | sertralin | p.o. | 50.00 | MG | 12.00 | |
| 224.7 | N06AB08 | fluvoxamin (do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 100.00 | MG | 13.50 | |
| 224.8 | N06AB08 | fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 100.00 | MG | 12.00 | |
| 224.9 | N06AB10 | escitalopram | p.o. | 10.00 | MG | 12.00 | |

| | |
|-----|---|
| 225 | Antidepresiva působící inhibičně na monoaminoxidázu a ostatní antidepresiva, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|------------------------|
| 225.1 | N06AF01 | isocarbaxazid | p.o. | 15.00 | MG | 4.30 | L/PSY,SEX,NEU, |
| 225.2 | N06AF04 | tranylcypromin | p.o. | 10.00 | MG | 5.03 | L/PSY,SEX,NEU |
| 225.3 | N06AG02 | moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.30 | GM | 13.50 | L/PSY,SEX,NEU, INT,GER |
| 225.4 | N06AG02 | moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.30 | GM | 12.00 | L/PSY,SEX,NEU, INT,GER |
| 225.5 | N06AX03 | mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 60.00 | MG | 13.50 | |
| 225.6 | N06AX03 | mianserin nad 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 60.00 | MG | 12.00 | |
| 225.7 | N06AX05 | trazodon | p.o. | 0.30 | GM | 12.00 | |
| 225.8 | N06AX05 | trazodon, tablety s řízeným uvolňováním | p.o. | 0.30 | GM | 14.20 | L/PSY,SEX,NEU |

46444 TRITTICO AC 150 tbl ret 60x150mg MCI CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|--------|----|-------|---------------|
| 225.9 | N06AX06 | nefazodon hydrochlorid | p.o. | 400.00 | MG | 18.63 | L/PSY,SEX,NEU |
| 225.10 | N06AX09 | viloxazin | p.o. | 0.20 | GM | 12.80 | L/PSY,SEX,NEU |
| 225.11 | N06AX11 | mirtazapin | p.o. | 30.00 | MG | 13.50 | L/PSY,SEX,NEU |
| 225.12 | N06AX12 | bupropion | p.o. | 200.00 | MG | 14.60 | L/PSY,SEX,NEU |
| 225.13 | N06AX14 | tianeptin | p.o. | 37.50 | MG | 12.00 | |
| 225.14 | N06AX16 | venlafaxin | p.o. | 100.00 | MG | 18.00 | L/NEU,PSY,SEX |
| 225.15 | N06AX17 | milnacipran | p.o. | 100.00 | MG | 18.00 | L/NEU,PSY,SEX |
| 225.16 | N06AX18 | reboxetin | p.o. | 8.00 | MG | 12.00 | |
| 225.17 | V11 | hyperici extractum siccum (LI 160) | p.o. | 900.00 | MG | 6.50 | |
| 225.18 | V11 | hyperici extractum siccum normatum (ostatní) | p.o. | 900.00 | MG | 2.00 | |

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 226 | Antidepresiva, ostatní cesty aplikace |
|-----|---------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|
| 226.1 | N05CD03 | flunitrazepam | parent. | 1.00 | MG | 6.61 | O |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|---|
| 226.2 | N05CD08 | midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | MG | 74.03 | O |
| 226.3 | N05CD08 | midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | MG | 51.03 | O |
| 226.4 | N06AA01 | desipramin | parent. | 0.10 | GM | 96.44 | O |
| 226.5 | N06AA02 | imipramin | parent. | 0.10 | GM | 48.39 | O |
| 226.6 | N06AA04 | klomipramin | parent. | 0.10 | GM | 95.76 | O |

02884 ANAFRANIL inj 10x2ml/25mg NPA CH

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|--------|----|--------|-----------|
| 226.7 | N06AA08 | dibenzepin | parent. | 0.30 | GM | 96.44 | O |
| 226.8 | N06AA09 | amitriptylin | parent. | 75.00 | MG | 30.79 | O |
| 226.9 | N06AA21 | maprotilin | parent. | 100.00 | MG | 108.64 | O |
| 226.10 | N06AB04 | citalopram | parent. | 20.00 | MG | 228.29 | O/PSY,SEX |

227 stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--------------------|
| 227.1 | N06BA04 | methylphenidat | p.o. | 30.00 | MG | 9.00 | L/NEU,PSY,PED, SEX |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--------------------|

83328 RITALIN tbl 30x10mg NPA CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|--------|---|
| 227.2 | N06BA07 | modafinil | p.o. | 300.00 | MG | 320.00 | P |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|--------|---|

Léčba modafinilem je indikovaná ošetřujícím lékařem specializovaného pracoviště pro poruchy spánku, resp. spánkové laboratoře u pacientů:

- a) u kterých je kontraindikována (glaukom, arytmie, závažná hypertenze) léčba methylphenidatem,
- b) nichz není možné dosáhnout dostatečné kompenzace ani vysokými dávkami methylphenidatu (až 60mg denně), tj.: denní usínání je vyřazuje z jinak možného zapojení do pracovního procesu.

Pokud po 3 měsících není dosaženo zásadní změny a uspokojivého výsledku (nemocný je schopen zapojení do pracovního procesu), není léčba modafinilem dále hrazena.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 227.3 | N06BX01 | meklofenoxat | parent. | 0.50 | GM | 83.53 | H |
| 227.4 | N06BX02 | pyritinol | parent. | 0.30 | GM | 57.25 | H |
| 227.5 | N06BX02 | pyritinol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 3.90 | |
| 227.6 | N06BX02 | pyritinol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 17.80 | P |

Pyritinol, tekuté lékové formy, indikuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatrist a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
- 2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,
- 3) vaskulární demence,
- 4) kortikální myoklonus,
- 5) DMO.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 227.7 | N06BX03 | piracetam | parent. | 6.00 | GM | 57.25 | H |
| 227.8 | N06BX03 | piracetam (pevné lékové formy) | p.o. | 2.40 | GM | 3.50 | |
| 227.9 | N06BX03 | piracetam (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.40 | GM | 17.80 | P |

Piracetam, tekuté lékové formy, indikuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatrist a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodě lané CPM,
- 2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,
- 3) vaskulární demence,
- 4) kortikální myoklonus,
- 5) DMO.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|
| 227.10 | N06BX18 | vinpocetin | p.o. | 15.00 | MG | 3.90 | |
| 227.11 | N06BX18 | vinpocetin | parent. | 15.00 | MG | 24.98 | H |
| 227.12 | N06DX01 | memantin | p.o. | 20.00 | MG | 100.00 | P |

Léčbu memantinem ordinuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 17-6 bodů.

Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba memantinem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE pod 6 bodů škály. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|
| 227.13 | N06DX02 | extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy) | p.o. | 120.00 | MG | 5.66 | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|

228 parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání

Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (lachE) ordinuje neurolog, psychiatrist nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně.

Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání lachE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba lachE je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením lachE. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba lachE není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 228.1 | N06DA02 | donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 51.30 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 228.2 | N07AA03 | distigmin | p.o. | 5.00 | MG | 5.79 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

02130 UBRETID 5 MG por tbl nob 50x5mg NYC A

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 228.3 | N06DA02 | donepezil nad 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 100.00 | P |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 228.4 | N06DA03 | rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | DF | 51.30 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 228.5 | N06DA03 | rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.00 | DF | 100.00 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 228.6 | N06DA04 | galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | DF | 51.30 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 228.7 | N06DA04 | galantamin nad 4 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.00 | DF | 100.00 | P |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|--|
| 228.8 | N07AA01 | neostigmin | p.o. | 60.00 | MG | 19.75 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|--------|----|-------|--|
| 228.9 | N07AA02 | pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 180.00 | MG | 19.33 | |
|-------|---------|---|------|--------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|--------|----|-------|-------|
| 228.10 | N07AA02 | pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 180.00 | MG | 17.65 | L/NEU |
|--------|---------|---|------|--------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 229 | | parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---------|--------|----|----------|---|
| 229.1 | N07AA01 | neostigmin | parent. | 2.00 | MG | 18.20 | |
| 00612 | SYNTOSTIGMIN | inj 10x1ml/0.5mg | HBS | SK | | | |
| 229.2 | N07AA02 | pyridostigmin | parent. | 10.00 | MG | 113.20 | |
| 229.3 | N07AA02 | distigmin | parent. | 0.25 | MG | 5.62 | |
| 230 | léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému | | | | | | |
| 230.1 | N07AA30 | ambenonium | p.o. | 60.00 | MG | 18.60 | |
| 58894 | MYTELASE | por tbl nob 50x10mg | SBP | P | | | |
| 230.2 | N07CA01 | betahistin | p.o. | 24.00 | MG | 8.76 | |
| 230.3 | N07CA02 | cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 90.00 | MG | 1.86 | |
| 230.4 | N07CA02 | cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 90.00 | MG | 1.56 | |
| 230.5 | N07CA03 | flunarizin | p.o. | 10.00 | MG | 4.79 | |
| 230.6 | N07CA52 | cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem) | p.o. | 3.00 | DF | 4.79 | |
| 231 | ostatní léčiva používaná u nemoci centrálního nervového systému | | | | | | |
| 231.1 | A11DA | thiamin (vit. B1), prostý | parent. | 75.00 | MG | 5.50 | H |
| 231.2 | A11DA01 | thiamin (vit. B1) | parent. | 50.00 | MG | 5.50 | H |
| 231.3 | A11DB | kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12) | parent. | 10.00 | ML | 93.80 | H |
| 11486 | MILGAMMA N | inj 25x2ml | SLH | D | | | |
| 11487 | MILGAMMA N | inj 100x2ml | SLH | D | | | |
| 11488 | MILGAMMA N | inj 500x2ml | SLH | D | | | |
| 67075 | MILGAMMA N | inj 500x2ml | WGP | D | | | |
| 231.4 | A11HA02 | pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6) | parent. | 0.16 | GM | 16.58 | H |
| 231.5 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně) | parent. | 0.20 | GM | 69.90 | H |
| 231.6 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml) | parent. | 0.20 | GM | 7.58 | H |
| 231.7 | A11HA04 | riboflavin (vitamin B2) | parent. | 20.00 | MG | 6.11 | H |
| 231.8 | N01AB01 | halotan | inhal. | 100.00 | ML | 304.96 | H |
| 231.9 | N01AB06 | isofluran | inhal. | 100.00 | ML | 1 559.92 | H |
| 231.10 | N01AB07 | desfluran | inhal. | 100.00 | ML | 1 125.60 | H |
| 231.11 | N01AB08 | sevofluoran | inhal. | 100.00 | ML | 2 290.62 | H |
| 231.12 | N01AF01 | metohexital | parent. | 0.50 | GM | 142.63 | H |
| 231.13 | N01AF03 | thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.50 | GM | 60.41 | H |
| 231.14 | N01AF03 | thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.50 | GM | 38.85 | H |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|----------|---|
| 231.15 | N01AX03 | ketamin (koncentrace nad 1%) | parent. | 1.00 | GM | 234.04 | O |
| 231.16 | N01AX03 | ketamin (koncentrace do 1% včetně) | parent. | 1.00 | GM | 240.19 | O |
| 231.17 | N01AX04 | propanidid | parent. | 1.00 | GM | 32.11 | O |
| 231.18 | N01AX07 | etomidát | parent. | 50.00 | MG | 162.72 | O |
| 231.19 | N01AX10 | propofol – 2% koncentrace | parent. | 10.00 | ML | 139.00 | O |
| 231.20 | N01AX10 | propofol – koncentrace do 1% včetně | parent. | 10.00 | ML | 87.00 | O |
| 231.21 | N07XX01 | tirilazad | parent. | 150.00 | MG | 5 226.44 | X |

232 Antimalarika

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|------|------|----|-------|---|
| 232.1 | P01BA01 | chlorochin | p.o. | 0.50 | GM | 2.79 | |
| 00098 | DELAGIL | tbl 30x250mg | | IHU | H | | |
| 232.2 | P01BA02 | hydroxychlorochin | p.o. | 0.40 | GM | 17.66 | P |

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- a) systémový lupus erythematoses,
- b) revmatoidní arthritis,
- c) juvenilní chronická arthritis,
- d) diskoidní forma lupus erythematoses.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 232.3 | P01BC02 | meflochin | p.o. | 1.00 | GM | 308.40 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 232.4 | P01BD01 | pyrimethamin | p.o. | 75.00 | MG | 15.93 | |
| 232.5 | P01BD51 | pyrimethamin, kombinace | p.o. | 75.00 | MG | 50.83 | |

233 Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|---------|------|----|----------|---|
| 233.1 | P01CX01 | pentamidin isethionát | parent. | 0.28 | GM | 1 047.13 | X |
| 233.2 | P02CA01 | mebendazol | p.o. | 0.20 | GM | 13.60 | |
| 233.3 | P02CA02 | tiabendazol | p.o. | 3.00 | GM | 125.42 | |
| 233.4 | P02CA03 | albendazol | p.o. | 0.40 | GM | 59.78 | |
| 233.5 | P02CB01 | piperazin | p.o. | 2.00 | GM | 3.96 | |
| 233.6 | P02CE01 | levamizol | p.o. | 0.15 | GM | 29.55 | |
| 233.7 | P02CX01 | pyrvinium | p.o. | 0.30 | GM | 17.69 | |
| 233.8 | P02DA01 | niklosamid | p.o. | 2.00 | GM | 131.19 | |
| 233.9 | P03AB02 | Lindan (lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 2.54 | |
| 233.10 | P03AB02 | Lindan (lékové formy lotia) | lok. | 1.00 | ML | 1.08 | |

92765 SKABICID
97547 JACUTIN

drm eml 1x100gm/gm AVE CZ
eml 1x200ml/600mg HEM D

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|------|--|
| 233.11 | P03AB02 | Lindan (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 | ML | 1.17 | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------|--|
| 233.12 | P03AC | esdepaletherin | lok. | 1.00 | ML | 1.17 | |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 233.13 | P03AC04 | permerthrin | lok. | 1.00 | ML | 1.17 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 234 | nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|
| 234.1 | R01AC01 | natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení) | lok. | 40.00 | MG | 13.09 | L/ALG,TRN,ORL |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|
| 234.2 | R01AC01 | natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení) | lok. | 40.00 | MG | 13.88 | L/ALG,TRN,ORL |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|

12582 ALLERGOCROM spr nas 1x15ml URS D

49932 CROMOHEXAL nas spr sol 1x15ml SFS D

76418 CROMOBENE NOSNÍ SPRAY spr nas 1x15ml MCK D

97615 CROMOHEXAL nas spr sol 1x15ml SFS D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 234.3 | R01AC02 | levokabastin | lok. | 0.60 | MG | 10.80 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 234.4 | R01AC03 | azelastin | lok. | 0.56 | MG | 10.80 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|------|----|------|--|
| 234.5 | R01AD01 | beclomethason dipropionát | lok. | 0.40 | MG | 4.09 | |
|-------|---------|---------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 234.6 | R01AD04 | flunisolid | lok. | 0.15 | MG | 6.10 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 234.7 | R01AD05 | budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetně | lok. | 0.30 | MG | 6.10 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 234.8 | R01AD05 | budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávce | lok. | 0.30 | MG | 6.40 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|---------------|
| 234.9 | R01AD08 | flutikason – léková forma nosní kapky | lok. | 0.20 | MG | 8.20 | L/ALG,TRN,ORL |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|---------------|
| 234.10 | R01AD08 | flutikason – léková forma vodní nosní sprej | lok. | 0.20 | MG | 8.20 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|---|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|---------------|
| 234.11 | R01AD09 | momethason | lok. | 200.00 | RG | 10.00 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------|--------|----|------|---------------|
| 234.12 | R01AD11 | triamcinolon acetonid | lok. | 220.00 | RG | 7.20 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|-----------------------|------|--------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|------|--------|----|------|---------------|
| 234.13 | R01AX03 | ipratropium bromid | lok. | 240.00 | RG | 8.20 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|--------------------|------|--------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 235 | inhaláční sympatomimetika včetně kombinací | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 235.1 | R03AC02 | bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované) | inhal. | 0.80 | MG | 7.23 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 235.2 | R03AC02 | bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 | MG | 3.37 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 235.3 | R03AC02 | freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované) | inhal. | 0.80 | MG | 7.23 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 235.4 | R03AC02 | freonový salbutamol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 | MG | 3.37 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|--------|------|----|------|--|
| 235.5 | R03AC02 | salbutamol (lékové formy k inhalaci) | inhal. | 0.80 | MG | 7.23 | |
|-------|---------|--------------------------------------|--------|------|----|------|--|

83047 VENTODISKS 400

inhplvdos15x8dÁvek GWE F

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|-------|----|-------|---|
| 235.6 | R03AC02 | salbutamol (lékové formy roztoku) | inhal. | 10.00 | MG | 12.86 | |
| 235.7 | R03AC03 | terbutalin (lékové formy aerosolu) | inhal. | 2.00 | MG | 3.52 | |
| 235.8 | R03AC03 | terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 2.00 | MG | 7.23 | |
| 235.9 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové) | inhal. | 0.60 | MG | 3.86 | |
| 235.10 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.60 | MG | 2.74 | |
| 235.11 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 0.60 | MG | 7.23 | |
| 235.12 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | MG | 24.64 | |
| 235.13 | R03AC06 | hexoprenalin (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.50 | MG | 2.74 | |
| 235.14 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.10 | MG | 20.63 | P |

Léčbu inhalačním salmeterolem a formoterolem indikuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod plnou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Léčbu inhalačním salmeterolem a formoterolem indikuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od středního stadia (stadium II) u symptomatických nemocných léčených inhalačními bronchodilatanciemi s krátkodobým účinkem a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|-------|----|-------|-----------|
| 235.15 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.10 | MG | 30.13 | P |
| 235.16 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávce | inhal. | 0.10 | MG | 27.51 | P |
| 235.17 | R03AC13 | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 24.00 | RG | 30.13 | P |
| 235.18 | R03AC13 | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávce | inhal. | 24.00 | RG | 27.51 | P |
| 235.19 | R03AK03 | bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 6.00 | DF | 6.30 | |
| 235.20 | R03AK03 | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 3.00 | DF | 13.65 | |
| 235.21 | R03AK03 | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | ML | 21.66 | |
| 235.22 | R03AK03 | fenoterol kombinace s kromoglykátem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.00 | DF | 1.31 | L/ALG,TRN |
| 235.23 | R03AK03 | freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 6.00 | DF | 5.07 | |
| 235.24 | R03AK04 | salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia | inhal. | 6.00 | DF | 7.70 | L/ALG,TRN |
| 235.25 | R03AK04 | salbutamol v kombinaci s kromoglykátem | inhal. | 8.00 | DF | 12.32 | L/ALG,TRN |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.26 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100 | inhal. | 2.00 | DF | 33.86 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.27 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250 | inhal. | 2.00 | DF | 44.72 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.28 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500 | inhal. | 2.00 | DF | 61.94 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

Léčbu inhalační fixní kombinací (salmeterol/flutikason) indikuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale (jako lék 2. volby), od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod plnou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu v nízké až střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Léčbu inhalační fixní kombinací (salmeterol/flutikason v dávce 50/500µg) indikuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.29 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu, 25/50 | inhal. | 2.00 | DF | 12.28 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.30 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/125 | inhal. | 2.00 | DF | 15.20 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.31 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/250 | inhal. | 2.00 | DF | 20.08 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

Léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol a flutikason indikuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3), tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu ve střední dávce a při dobré spolupráci pacienta.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.32 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6 | inhal. | 2.00 | DF | 22.42 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.33 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6 | inhal. | 2.00 | DF | 28.40 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.34 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12 | inhal. | 2.00 | DF | 51.30 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

Léčbu inhalační fixní kombinací (budesonid/formoterol) indikuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod plnou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu v nízké až střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Léčbu inhalační fixní kombinací (budesonid/formoterol) indikuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 236 | inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 236.1 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do C2215 50 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 12.70 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 236.2 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 8.90 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 236.3 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 50 rg do 100 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 10.80 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 236.4 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 6.35 | |
| 236.5 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 5.20 | |
| 236.6 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 26.80 | |
| 236.7 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 25.40 | |
| 236.8 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 20.60 | |
| 236.9 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 14.95 | |
| 236.10 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 15.80 | |
| 236.11 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované freonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 12.10 | |
| 236.12 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem bezfreonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 21.80 | |
| 236.13 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem freonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 12.80 | |
| 236.14 | R03BA02 | budesonid (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 | MG | 11.70 | |
| 236.15 | R03BA02 | budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml | inhal. | 0.80 | MG | 20.77 | |
| 236.16 | R03BA02 | budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml. | inhal. | 0.80 | MG | 16.81 | |
| 236.17 | R03BA03 | flunisolid (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.00 | MG | 11.70 | |
| 236.18 | R03BA05 | flutikason (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.60 | MG | 11.70 | |
| 236.19 | R03BA08 | ciclesonid | inhal. | 160 | MG | 10.80 | |
| 236.20 | R03BB01 | bromid ipratropia (bezfreonové lékové formy) | inhal. | 0.12 | MG | 6.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 236.21 | R03BB01 | bromid ipratropia (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.12 | MG | 5.38 | |
|--------|---------|---|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---------------|
| 236.22 | R03BB01 | bromid ipratropia (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | ML | 33.34 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 237 | inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, ostatní lékové formy | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.1 | R03BA01 | beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně dávce | inhal. | 0.80 | MG | 20.77 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.2 | R03BA01 | beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 14.40 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.3 | R03BA01 | beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 17.60 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.4 | R03BA02 | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně) | inhal. | 0.80 | MG | 20.77 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.5 | R03BA02 | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně) | inhal. | 0.80 | MG | 17.60 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.6 | R03BA02 | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce) | inhal. | 0.80 | MG | 14.40 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.7 | R03BA03 | flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 1.00 | MG | 20.77 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.8 | R03BA05 | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce) | inhal. | 0.60 | MG | 30.00 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.9 | R03BA05 | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce) | inhal. | 0.60 | MG | 26.75 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.10 | R03BA05 | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce) | inhal. | 0.60 | MG | 22.30 | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 237.11 | R03BB01 | bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 0.12 | MG | 2.21 | |
|--------|---------|--|--------|------|----|------|--|

75847 ATROVENT INHALETTEN cps inh 100x0.2mg BGP D

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|--------|-------|----|-------|---|
| 237.12 | R03BB04 | tiotropium | inhal. | 18.00 | RG | 50.00 | P |
|--------|---------|------------|--------|-------|----|-------|---|

Léčbu tiotropiem indikuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN stadia II., III. a IV. (podle dřívější verze GOLD stadium IIb a III), kteří dodržují léčebný režim včetně zákazu kouření.

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 238 | ostatní inhalační antiastmatika | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|
| 238.1 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu vdechem aktivované) | inhal. | 40.00 | MG | 21.65 | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|-------|----|-------|--|
| 238.2 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu) | inhal. | 40.00 | MG | 17.50 | |
|-------|---------|---|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|
| 238.3 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 80.00 | MG | 21.65 | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 238.4 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insufaci) | lok. | 40.00 | MG | 19.11 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|
| 238.5 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy roztoku) | inhal. | 80.00 | MG | 13.49 | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|--------|------|----|-------|-----------|
| 238.6 | R03BC03 | nedokromil | inhal. | 8.00 | MG | 25.14 | L/ALG,TRN |
|-------|---------|------------|--------|------|----|-------|-----------|

56242 TILADE MINT aer 2x(112x2mg/dÁv) FPR GB

| | |
|-----|---------------------------------|
| 239 | antiastmatika, perorální podání |
|-----|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|-------|----|------|--|
| 239.1 | R03CA02 | efedrin | p.o. | 50.00 | MG | 1.42 | |
|-------|---------|---------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|-------|----|------|--|
| 239.2 | R03CB03 | orciprenalin | p.o. | 60.00 | MG | 6.55 | |
|-------|---------|--------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 239.3 | R03CC02 | salbutamol (pevné lékové formy) | p.o. | 12.00 | MG | 6.19 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 239.4 | R03CC02 | salbutamol (tekuté lékové formy) | p.o. | 12.00 | MG | 13.10 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 239.5 | R03CC03 | terbutalin | p.o. | 15.00 | MG | 6.19 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 239.6 | R03CC05 | hexoprenalin | p.o. | 1.50 | MG | 6.19 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 239.7 | R03CC08 | prokaterol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | MG | 6.15 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

94493 LONTERMIN tbl 20x0.05mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 239.8 | R03CC08 | prokaterol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | MG | 15.45 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 239.9 | R03CC13 | klenbuterol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.04 | MG | 6.36 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 239.10 | R03CC13 | klenbuterol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.04 | MG | 21.26 | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 240 | antiastmatika, ostatní cesty aplikace |
|-----|---------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|----|------|---|
| 240.1 | R03CA02 | efedrin | parent. | 50.00 | MG | 5.27 | O |
|-------|---------|---------|---------|-------|----|------|---|

00447 EPHEDRIN BIOTIKA inj 10x1ml/50mg HBS SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|------|---|
| 240.2 | R03CB03 | orciprenalin | parent. | 0.50 | MG | 7.28 | O |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 240.3 | R03CC03 | terbutalin | parent. | 0.50 | MG | 19.84 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|---|
| 240.4 | R03CC05 | hexoprenalin | parent. | 5.00 | RG | 19.84 | O |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|---|

| | |
|-----|---|
| 241 | ostatní antiastmatika, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 241.1 | R03DA04 | teofyllin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.40 | GM | 4.40 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 241.2 | R03DA04 | teofyllin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.40 | GM | 4.12 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 241.3 | R03DA04 | teofyllin (retardované lékové formy první skupiny) | p.o. | 0.40 | GM | 2.88 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 241.4 | R03DA05 | aminofyllin | p.o. | 0.60 | GM | 4.40 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 241.5 | R03DA05 | aminofyllin (retardované lékové formy do 150 mg včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 9.92 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 241.6 | R03DA05 | aminofyllin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 4.79 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 241.7 | R03DA05 | aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg) | p.o. | 0.60 | GM | 4.73 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

91741 AMINOPHYLLINUM RETARD LEK por tbl ret 20x350mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|----|----|-------|---|
| 241.8 | R03DC01 | zafirlukast | p.o. | 40 | MG | 41.50 | P |
|-------|---------|-------------|------|----|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 241.9 | R03DC03 | montelukast | p.o. | 1.00 | DF | 45.00 | P |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofilyny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripcí antileukotrienů indikována.

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy,
- b) námahou indukované astma,
- c) aspirinové astma,
- d) astma s prokázanou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku.

Nedoje-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:

- a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy,
- b) námahou indukované astma,
- c) aspirinové astma.

Nedoje-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 242 | ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|--|
| 242.1 | R03DA05 | aminofylin | p.rect. | 0.60 | GM | 6.35 | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 242.2 | R03DA05 | aminofylin | parent. | 0.60 | GM | 29.23 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

93129 AMINOPHYLLINUM LEK inj 10x10ml/250mg LEK SLO

96371 AMINOPHYLLINUM LEK inj 50x10ml/250mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 243 | Expektorancia kromě kombinací, perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 243.1 | R05CB01 | acetylcystein | p.o. | 0.50 | GM | 2.25 | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 243.2 | R05CB02 | bromhexin | p.o. | 24.00 | MG | 2.08 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 243.3 | R05CB03 | karbocystein | p.o. | 1.50 | GM | 3.60 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 243.4 | R05CB06 | ambroxol | p.o. | 0.15 | GM | 4.50 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|--|

43950 AMBROXOL AL 30 tbl 20x30mg APA D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|------|--|
| 243.5 | R05CB15 | erdostein | p.o. | 600.00 | MG | 3.12 | |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 244 | Expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|--------|------|----|-------|--|
| 244.1 | R05CB01 | acetylcystein | inhal. | 1.60 | GM | 12.07 | |
|-------|---------|---------------|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------|--|--|----------|-------|
| 244.2 | R05CB01 | acetylcystein | parent. | 0.50 | GM | 16.76 | |
| 88941 | ACC INJEKT | injsol100x3ml/300mg | HEX | D | | | |
| 244.3 | R05CB02 | bromhexin | inhal. | 24.00 | MG | 3.47 | |
| 244.4 | R05CB02 | bromhexin | parent. | 24.00 | MG | 40.37 | |
| 244.5 | R05CB06 | ambroxol | parent. | 0.15 | GM | 226.02 | |
| 244.6 | R05CB06 | ambroxol (koncentrat k infuzi) | parent. | 1.00 | DF | 336.70 | H |
| 244.7 | R05CB13 | alfadornáza | inhal. | 2.50 | MG | 1 069.40 | P |
| Léčbu | alfadornázou | předepisuje | ošetrující lékař | na doporučení specializovaného pracoviště, | které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta: | | |
| a) | při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu, | | | | | | |
| b) | při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu. | | | | | | |
| 244.8 | R05CB15 | erdostein | inhal. | 450.00 | MG | 8.31 | |
| 245 | antitusika ze skupiny derivátů opioidů | | | | | | |
| 245.1 | R05DA01 | ethylmorphin do 15 mg včetně | p.o. | 50.00 | MG | 6.02 | |
| 44590 | DIOLAN 15MG | tbl 10x15mg(blister) | SLO | SK | | | |
| 245.2 | R05DA01 | ethylmorphin nad 15 mg | p.o. | 50.00 | MG | 5.36 | |
| 245.3 | R05DA04 | kodein | p.o. | 0.10 | GM | 12.80 | |
| 246 | ostatní antitusika | | | | | | |
| 246.1 | R05DA08 | folkodin | p.o. | 50.00 | MG | 3.67 | |
| 246.2 | R05DA09 | dextromethorphan | p.o. | 90.00 | MG | 3.67 | |
| 246.3 | R05DA20 | kombinace antitusik | p.o. | 3.00 | DF | 3.67 | |
| 246.4 | R05DB03 | kllobutinol | p.o. | 120.00 | MG | 6.50 | |
| 246.5 | R05DB03 | kllobutinol | parent. | 120.00 | MG | 112.03 | H |
| 246.6 | R05DB05 | pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípkup včetně) | p.rect. | 100.00 | MG | 139.11 | L/PED |
| 246.7 | R05DB05 | pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku) | p.rect. | 100.00 | MG | 63.40 | L/PED |
| 246.8 | R05DB13 | butamirát (pevné lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 1.04 | |
| 246.9 | R05DB13 | butamirát (tekuté lékové formy-kapky) | p.o. | 25.00 | MG | 10.63 | |
| 94859 | TUSSIN | gtt 1x10ml | IVX | CZ | | | |
| 246.10 | R05DB13 | butamirát (tekuté lékové formy-sirup) | p.o. | 25.00 | MG | 3.83 | |
| 246.11 | R05DB18 | prednoxiazin | p.o. | 300.00 | MG | 1.96 | |
| 246.12 | R05DB19 | dropropizin | p.o. | 25.00 | MG | 0.88 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|
| 246.13 | R05DB27 | levodropizin (tekuté lékové formy - kapky) | p.o. | 120.00 | MG | 4.13 | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|
| 246.14 | R05DB27 | levodropizin (tekuté lékové formy - sirup) | p.o. | 120.00 | MG | 4.60 | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 246.15 | R05FB02 | butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 10.56 | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 247 | nesedativní antihistaminika | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|
| 247.1 | R06AA07 | difenylpyralin | p.o. | 10.00 | MG | 7.72 | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|--|
| 247.2 | R06AE06 | oxatomid | p.o. | 60.00 | MG | 5.85 | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 247.3 | R06AE07 | cetirizin | p.o. | 10.00 | MG | 5.85 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | |
|---------------|----------------------|-----|-----|
| 02926 LETIZEN | por tbl film 20x10mg | KRK | SLO |
| 02927 LETIZEN | por tbl film 50x10mg | KRK | SLO |
| 03898 CEREX | por tbl film 20x10mg | SFS | D |
| 03899 CEREX | por tbl film 50x10mg | SFS | D |
| 99600 ZODAC | por tbl film 90x10mg | LEX | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 247.4 | R06AE09 | levocetirizin | p.o. | 5.00 | MG | 5.85 | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 247.5 | R06AX13 | loratadin | p.o. | 10.00 | MG | 5.85 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 247.6 | R06AX27 | desloratadin | p.o. | 5.00 | MG | 5.85 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 248 | sedativní antihistaminika pro perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|------|-------|----|------|--|
| 248.1 | R06AA | embramin | p.o. | 50.00 | MG | 1.32 | |
|-------|-------|----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 248.2 | R06AA02 | difenhydramin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.20 | GM | 8.36 | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 247.3 | R06AA02 | difenhydramin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.20 | GM | 8.54 | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 248.4 | R06AA04 | klemastin | p.o. | 2.00 | MG | 6.56 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 248.5 | R06AB03 | dimetinden (pevné lékové formy) | p.o. | 4.00 | MG | 5.85 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 248.6 | R06AB03 | dimetinden (tekuté lékové formy) | p.o. | 4.00 | MG | 8.54 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|--|
| 248.7 | R06AB56 | dexbromfeniramin, kombinace | p.o. | 2.00 | DF | 8.50 | |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 248.8 | R06AD02 | prometazin (pevné lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 4.04 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 248.9 | R06AD02 | prometazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 8.54 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|------|-------|----|------|--|
| 248.10 | R06AD03 | thiethylperazin | p.o. | 13.00 | MG | 3.31 | |
|--------|---------|-----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------|------|------|----|------|--|
| 248.11 | R06AK | kombinace antihistaminik | p.o. | 2.00 | DF | 1.08 | |
|--------|-------|--------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|------|------|----|------|--|
| 248.12 | R06AX | bisulepin | p.o. | 4.00 | MG | 4.25 | |
|--------|-------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|-----|----|--|--|
| 02479 DITHIADEN | | tbl 20x2mg | | LEX | CZ | | |
|-----------------|--|------------|--|-----|----|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 248.13 | R06AX01 | bampipin | p.o. | 0.10 | GM | 5.85 | |
|--------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 248.14 | R06AX02 | ciproheptadin | p.o. | 12.00 | MG | 5.85 | |
|--------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|------|--|
| 248.15 | R06AX09 | azatadin | p.o. | 2.00 | MG | 5.85 | |
| 248.16 | R06AX11 | astemizol | p.o. | 10.00 | MG | 5.85 | |
| 248.17 | R06AX12 | terfenadin | p.o. | 0.12 | GM | 5.85 | |
| 248.18 | R06AX17 | ketotifen | p.o. | 2.00 | MG | 5.85 | |
| 248.19 | R06AX18 | akrivastin | p.o. | 24.00 | MG | 5.85 | |
| 248.20 | R06AX25 | mizolastin | p.o. | 10.00 | MG | 5.85 | |
| 248.21 | R06AX26 | fexofenadin | p.o. | 120.00 | MG | 5.85 | |

249 antihistaminika, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|---|
| 249.1 | R06AA04 | klemastin | parent. | 2.00 | MG | 32.44 | O |
| 249.2 | R06AD02 | prometazin | parent. | 25.00 | MG | 7.48 | O |
| 249.3 | R06AD03 | thiethylperazin | p.rect. | 13.00 | MG | 21.65 | |

09847 TORECAN sup 6x6.5mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 249.4 | R06AD03 | thiethylperazin | parent. | 13.00 | MG | 27.52 | O |
| 249.5 | R06AX | bisulepin | parent. | 4.00 | MG | 26.28 | O |
| 249.6 | R06AX | medosulepin/vápník | parent. | 2.00 | DF | 30.79 | O |

250 ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|--------|----|-------|--|
| 250.1 | R05CA03 | guaifenesin | parent. | 0.90 | GM | 16.57 | |
| 250.2 | R05CB05 | mesna | inhal. | 600.00 | MG | 38.39 | |

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-----------|---|
| 250.3 | R07AA01 | kolfosceril palmitát | parent. | 160.00 | MG | 19 083.10 | T |
| 250.4 | R07AA02 | přirozené fosfolipidy (zvířecího původu) | parent. | 160.00 | MG | 19 083.10 | T |
| 250.5 | R07AA30 | beraktant | parent. | 160.00 | MG | 19 083.10 | T |

251 Oftalmologika – antibiotika

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 251.1 | S01AA | neomycin/polymyxin/fenylefrin | lok. | 1.00 | ML | 19.55 | L/OPH |
| 251.2 | S01AA01 | chloramfenikol (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 2.79 | |
| 251.3 | S01AA01 | chloramfenikol (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 4.64 | |
| 251.4 | S01AA11 | gentamicin | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.5 | S01AA12 | tobramycin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.6 | S01AA12 | tobramycin (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 3.21 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 251.7 | S01AA13 | acidum fusidicum | lok. | 1.00 | ML | 6.42 | |
| 251.8 | S01AA24 | kanamycin | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.9 | S01AA25 | azidamfenikol | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.10 | S01AA30 | neomycin/bacitracin | lok. | 1.00 | GM | 6.27 | |

01076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 1x5gm LEX CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 251.11 | S01AA30 | neomycin/polymyxin | lok. | 1.00 | ML | 19.55 | L/OPH |
| 251.12 | S01AX11 | ofloxacin | lok. | 1.00 | ML | 14.40 | L/OPH |
| 251.13 | S01AX13 | ciprofloxacin | lok. | 1.00 | ML | 14.40 | L/OPH |
| 251.14 | S01AX17 | lomefloxacin k lokálnímu podání | lok. | 1.00 | ML | 14.40 | L/OPH |

252 Oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 252.1 | S01AB | sulfathiazol | lok. | 1.00 | GM | 3.42 | |
| 252.2 | S01AB04 | sulfacetamid | lok. | 1.00 | ML | 6.70 | |

93577 SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA gtt oph 12x0.5ml ZPF PL

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 252.3 | S01AX | jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 2.62 | |
| 252.4 | S01AX | jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 4.46 | |

253 Oftalmologika – antivirotyka

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 253.1 | S01AD02 | trifluorothimidin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 53.23 | L/OPH |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

65513 TRIHERPINE oph gtt sol 1x5ml NAH CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 253.2 | S01AD02 | trifluorothimidin (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 73.91 | L/OPH |
| 253.3 | S01AD03 | aciklovir | lok. | 1.00 | GM | 73.91 | L/OPH |

254 Oftalmologika – kortikosteroidy

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 254.1 | S01BA01 | dexamethason (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 3.47 | |
| 254.2 | S01BA01 | dexamethason (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 3.62 | |
| 254.3 | S01BA02 | hydrokortison | lok. | 1.00 | GM | 6.04 | |
| 254.4 | S01BA03 | kortison | lok. | 1.00 | ML | 19.57 | L/OPH |

00757 CORTISON SPOFA gtt 1x3ml/15mg SPX CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 254.5 | S01BA04 | prednizolon (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |
| 254.6 | S01BA04 | prednizolon (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 17.00 | L/OPH |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|-------|-------|
| 254.7 | S01BA07 | fluorometholon | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |
|-------|---------|----------------|------|------|----|-------|-------|

| | |
|-----|---|
| 255 | Oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 255.1 | S01BC01 | indometacin | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|--|
| 255.2 | S01BC02 | oxyfenbutazon | lok. | 1.00 | GM | 14.66 | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 255.3 | S01BC03 | diklofenak | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

58230 UNICLOPHEN UNIMED PHARMA gtt oph 1x10ml 0.1% UPA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|
| 255.4 | S01BC04 | flurbiprofen | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|

| | |
|-----|---|
| 256 | oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 256.1 | S01AA20 | antibiotika v kombinaci s jinými léčivy | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 256.2 | S01AA20 | neomycin/bacitracin/hydrokortison | lok. | 1.00 | GM | 6.92 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

01077 OPHTHALMO-FRAMYKON COMP. unguentum oph 1x5gm LEX CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 256.3 | S01CA | chloramfenikol/dexamethason | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH |
|-------|-------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 256.4 | S01CA01 | dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 256.5 | S01CA01 | dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.6 | S01CA01 | dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 256.7 | S01CA01 | oxytetracyklin/dexamethason | lok. | 1.00 | GM | 17.60 | L/OPH |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.8 | S01CA02 | prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.9 | S01CA02 | prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.10 | S01CA05 | betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.11 | S01CA05 | betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|
| 256.12 | S01CA05 | gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH,ORL |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|
| 256.13 | S01CA05 | gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH,ORL |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.14 | S01CA07 | fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 19.55 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.15 | S01CA07 | fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 24.44 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 257 | antiglaukomatika ze skupiny sympathomimetik a parasympathomimetik | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 257.1 | S01EA01 | epinefrin | lok. | 1.00 | ML | 26.65 | L/OPH |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 257.2 | S01EA02 | dipivefrin | lok. | 1.00 | ML | 26.65 | L/OPH |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|
| 257.3 | S01EA04 | klonidin | lok. | 1.00 | ML | 10.70 | L/OPH |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|

13726 ARUCCLONIN 1/16% gttoph1x10ml/6.25mg MNN D
 49501 ARUCCLONIN 1/16% gttoph1x10ml/6.25mg CHV D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|
| 257.4 | S01EA05 | brimonidin | lok. | 1.00 | ML | 59.80 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukolem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 257.5 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 29.00 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 257.6 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 5.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 257.7 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%) | lok. | 1.00 | ML | 6.17 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 257.8 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 9.70 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-------|
| 257.9 | S01EB02 | karbachol (koncentrace do 1% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 8.50 | L/OPH |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|-------|
| 257.10 | S01EB02 | karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 6.06 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|-------|
| 257.11 | S01EB02 | karbachol (koncentrace nad 1,5%) | lok. | 1.00 | ML | 6.60 | L/OPH |
|--------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 257.12 | S01EB06 | neostigmin | lok. | 1.00 | ML | 13.88 | L/OPH |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 258 | antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 258.1 | S01ED01 | timolol (koncentrace do 0,25% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 12.80 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|

01760 TIMOLOL-POS 0.25% gtt oph 3x5ml URS D

03479 ARUTIMOL 0.25% oph gtt sol 3x5ml CUA D

12729 TIMOHEXAL 0.1% gtt oph 1x5ml/5mg HEX D

12730 TIMOHEXAL 0.25% gtt oph1x5ml/12.5mg HEX D

12732 TIMOHEXAL 0.1% gtt oph 3x5ml/5mg HEX D

12733 TIMOHEXAL 0.25% gtt oph3x5ml/12.5mg HEX D

44546 TIMO-COMOD 0.25% gtt oph 1x10ml/25mg URS D

70474 ARUTIMOL 0.25% oph gtt sol 3x5ml CHV D

87113 TIMOLOL-POS 0.25% gtt oph 1x5ml URS D

96021 OFTENSIN 0.25% gtt oph 1x5ml ZPF PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 258.2 | S01ED01 | timolol (koncentrace nad 0,25%) | lok. | 1.00 | ML | 14.49 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 258.3 | S01ED02 | betaxolol | lok. | 1.00 | ML | 20.00 | L/OPH |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-------|
| 258.4 | S01ED03 | levobunolol | lok. | 1.00 | ML | 20.00 | L/OPH |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 258.5 | S01ED04 | metipranolol | lok. | 1.00 | ML | 13.20 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 258.6 | S01ED05 | carteolol | lok. | 1.00 | ML | 20.00 | L/OPH |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

258.7 S01ED51 timolol v kombinaci s dorzolamidem lok. 1.00 ML 81.46 P

Dorsolamid/timolol je indikován u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem, oční hypertenzí, pseudoexfoliativním glaukem nebo ostatními sekundárními glaukomy. Léčba je indikována očním lékařem v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky.

258.8 S01ED51 timolol v kombinaci s latanoprostem lok. 1.00 ML 220.60 P

Latanoprost/timolol v kombinaci indikuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí, při neúčinnosti beta-blokátorů a není-li operační výkon indikován.

259 ostatní antiglaukomatika

259.1 S01EB51 pilokarpin v kombinaci s timololem lok. 1.00 ML 21.07 L/OPH

259.2 S01EC01 acetazolamid p.o. 0.75 GM 6.53

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 259.3 | S01EC01 | acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním) | (p.o.) | 0.75 | GM | 29.33 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

259.4 S01EC02 diklofenamid p.o. 0.10 GM 6.26

259.5 S01EC03 dorzolamid lok. 1.00 ML 59.80 P

Léčba dorzolamidem je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

259.6 S01EC04 brinzolamid lok. 1.00 ML 59.80 P

Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

259.7 S01EE01 latanoprost lok. 1.00 ML 184.00 P

259.8 S01EE02 unoproston lok. 1.00 ML 94.98 P

259.9 S01EE03 bimatoprost lok. 1.00 ML 153.33 P

259.10 S01EE04 travoprost lok. 1.00 ML 184.00 P

Latanoprost, unoproston, bimatoprost a travoprost indikuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí vedle beta-blokátorů, alfa agonistů a inhibitorů karboanhydrázy a není-li operační výkon indikován.

260 mydriatika a cykloplegika

260.1 S01FA01 atropin (koncentrace do 0,5% včetně) lok. 1.00 ML 4.83

260.2 S01FA01 atropin (koncentrace nad 0,5%) lok. 1.00 ML 5.46

| | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|
| 260.3 | S01FA04 | cyklopentolát | lok. | 1.00 |
|-------|---------|---------------|------|------|

ISSUE DATE: 1/2019 EXPIRE DATE: 1/2020

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

© 2013 Pearson Education, Inc.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|------|---------------|
| 261.2 | S01GX01 | natrium kromoglykát (lékové formy očních lok. a nosních kapek) | | 1.00 | ML | 5.23 | L/OPH,ALG,ORL |
|-------|---------|---|--|------|----|------|---------------|

54241 ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) oph 10ml+nas 15ml URS D
 57944 CROMOHEXAL COMBI oph10ml+nas15ml sol SFS D
 83651 CROMOHEXAL COMBI oph 10ml+nas 15ml HEX D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|------|--|
| 261.3 | S01GX01 | natrium kromoglykát (lékové formy očních lok. kapek) | | 1.00 | ML | 4.06 | |
|-------|---------|---|--|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-----------|
| 261.4 | S01GX02 | levokabastin | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH,ALG |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 261.5 | S01GX03 | kyselina spaglumová | lok. | 1.00 | ML | 14.66 | L/OPH,ALG |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-----------|
| 261.6 | S01GX05 | iodoxamid | lok. | 1.00 | ML | 14.66 | L/OPH,ALG |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|------------|
| 261.7 | S01GX06 | emedastin | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH, ALG |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|------------|
| 261.8 | S01GX07 | azelastin | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH, ALG |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|------------|
| 261.9 | S01GX08 | ketotifen | lok. | 1.00 | ML | 25.00 | L/OPH, ALG |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|------------|
| 261.10 | S01GX09 | olopatadin | lok. | 1.00 | ML | 25.00 | L/OPH, ALG |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|--------|------------|
| 261.11 | S01GX10 | epinastin | lok. | 5.00 | ML | 125.00 | L/OPH, ALG |
|--------|---------|-----------|------|------|----|--------|------------|

262 anestetika lokální a jiná oftalmologika

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|------|------|----|-------|-------|
| 262.1 | S01HA | místní anestetika | lok. | 1.00 | ML | 11.83 | L/OPH |
|-------|-------|-------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|
| 262.2 | S01HA02 | oxybuprokain | lok. | 1.00 | ML | 11.52 | L/OPH |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|

20053 BENOXI 0.4 % UNIMED PHARMA oph gtt sol 1x10ml UPA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|----------|---|
| 262.3 | S01KA01 | kyselina hyaluronová | lok. | 1.00 | ML | 1 376.58 | Z |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|------|------|----|------|--|
| 262.4 | S01XA | jodid draselný a sodný | lok. | 1.00 | ML | 4.89 | |
|-------|-------|------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 262.5 | S01XA | tolazolin (koncentrace 10%) | lok. | 1.00 | GM | 14.91 | L/OPH |
|-------|-------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 262.6 | S01XA01 | guajazulen | lok. | 1.00 | GM | 3.98 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|------|--|
| 262.7 | S01XA02 | retinol | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
|-------|---------|---------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|------|--|
| 262.8 | S01XA04 | jodid draselný | lok. | 1.00 | ML | 4.89 | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 262.9 | S01XA11 | nandrolon | lok. | 1.00 | ML | 11.20 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 262.10 | S01XA20 | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky | lok. | 1.00 | ML | 3.03 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 262.11 | S01XA20 | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (vložka lékové formě gelu) | lok. | 1.00 | GM | 3.03 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|------|--|
| 262.12 | S02DA30 | kombinace fenazon a lidokain | lok. | 1.00 | GM | 3.80 | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|------|--|

263 ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|-------|
| 263.1 | S02AA11 | polymyxin B | lok. | 1.00 | ML | 2.64 | L/ORL |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|------------|
| 263.2 | S02BA | kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci | lok. | 1.00 | GM | 22.92 | L/ORL, PED |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|------------|

84575 OTOBACID N

aur gtt sol 1x6gm

ASH D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 263.3 | S02CA03 | hydrokortizon a antiinfekciva v kombinaci | lok. | 1.00 | ML | 27.37 | L/ORL |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 264 | terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|
| 264.1 | V01AA | II. generace (IC a IR do 100 j. včetně, p.o. JSA, JSK, SQ, SU, STU), pro subling. podání, úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 308.40 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|----------|-------|
| 264.2 | V01AA | II. generace (IC a IR do 300 j. včetně), prop.o. subling. podání, úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 1 233.04 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|
| 264.3 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), p.o. udržovací dávka | p.o. | 1.00 | DF | 498.16 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|
| 264.4 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), p.o. úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 285.74 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|

47393 H-AL POLLENS PER OS por gttsol6x9ml-jsk SVF CZ

54545 H-AL POLLENS PER OS por gttsol6x9ml-jsk SVF CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|
| 264.5 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,STU), p.o. pro subling. podání, udržovací dávka | p.o. | 1.00 | DF | 616.52 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 265 | terapeutické extrakty alergenů nestandardizované perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------|------|------|----|--------|-------|
| 265.1 | V01AA | I. generace (PNU), udržovací dávka | p.o. | 1.00 | DF | 415.47 | L/ALG |
|-------|-------|------------------------------------|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|
| 265.2 | V01AA | I. generace (PNU), úvodní dávka, hmyzí | p.o. | 1.00 | DF | 165.28 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|

47405 H-AL INSECTS PER OS por gttsol6x9ml-pnu

47406 H-AL INSECTS PER OS por gttsol6x9ml-pnu

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 265.3 | V01AA | I. generace (PNU), úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 88.46 | L/ALG |
|-------|-------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 266 | terapeutické extrakty alergenů standardizované ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|-------|
| 266.1 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), parent. depotní, udržovací dávka | parent. | 1.00 | TDD | 5.96 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|---|
| 266.2 | V01AA | II. generace (SQ), depotní, udržovací dávka – hmyzí alergeny (včela, vosa) | parent. | 1.00 | TDD | 8.14 | P |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|---|

Hmyzí alergeny (včela, vosa) jsou indikovány pro pacienty s alergií na hmyzí bodnutí prokázanou přítomností specifických IgE protilátek.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|----------|-------|
| 266.3 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), parent. depotní, úvodní dávka | parent. | 1.00 | BA | 1 233.60 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|----------|---|
| 266.4 | V01AA | II. generace (SQ), depotní, úvodní dávka, parent. hmyzí alergeny (včela, vosa) | parent. | 1.00 | BA | 3 498.00 | P |
|-------|-------|--|---------|------|----|----------|---|

Hmyzí alergeny (včela, vosa) jsou indikovány pro pacienty s alergií na hmyzí bodnutí prokázanou přítomností specifických IgE protilátek.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 266.5 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), parent. vodné, udržovací dávka | parent. | 1.00 | DF | 749.06 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|-----|-----|
| 47699 | ALBEY 120MCG(VESPULA) | inj sic 1x12org+sol | HST | USA |
| 47701 | ALBEY 120MCG(APIS MELLIF) | inj sic 1x120rg+sol | HST | USA |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 266.6 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), vodné, úvodní dávka | parent. | 1.00 | DF | 228.70 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | |
|-----|---|
| 267 | terapeutické extrakty alergenů nestandardizované ostatní cesty aplikace |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 267.1 | V01AA | I. generace (PNU), depotní, udržovací dávka | parent. | 1.00 | BA | 265.93 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|
| 267.2 | V01AA | I. generace (PNU), depotní, úvodní dávka | parent. | 1.00 | DF | 38.50 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|

83554 H-AL POLLENS(POLLIN.MIXT.)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ

83558 H-AL POLLENS(JAR.SM.CAS.)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ

83560 H-AL POLLENS(SM.PODZIMN)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ

83562 H-AL POLLENS(SMĚS TRAV I)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 267.3 | V01AA | I. generace (PNU), vodné, udržovací dávka | parent. | 1.00 | DF | 442.69 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|
| 267.4 | V01AA | I. generace (PNU), vodné, úvodní dávka | parent. | 1.00 | DF | 69.48 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 268 | základní antidota a fágové lyzaty |
|-----|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|--|------|---|
| 268.1 | V03AB | obedoxim | parent. | | | Plně | K |
|-------|-------|----------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|------|---|
| 268.2 | V03AB | trimedoxim + atropin | parent. | | | Plně | K |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|--|------|---|
| 268.3 | V03AB03 | edetáty | parent. | | | Plně | K |
|-------|---------|---------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--|--|------|---|
| 268.4 | V03AB06 | thiosulfát | parent. | | | Plně | K |
|-------|---------|------------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|--|--|------|---|
| 268.5 | V03AB08 | dusitan sodný | parent. | | | Plně | K |
|-------|---------|---------------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|---|
| 268.6 | V03AB14 | protamin | parent. | 1.00 | ML | 6.01 | K |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|
| 268.7 | V03AB15 | naloxon | parent. | 0.40 | MG | 11.83 | K |
|-------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|

94763 NALOXONE WZF POLFA inj 10x1ml/0.4mg WZF PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 268.8 | V03AB16 | ethanol (koncentrace 10%) | parent. | 100.00 | ML | 20.43 | K |
|-------|---------|---------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 268.9 | V03AB19 | fysostigmin | parent. | 1.00 | MG | 10.31 | K |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 268.10 | V03AB24 | digitalisový antitoxin | parent. | 80.00 | MG | 32 726.64 | K |
|--------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 268.11 | V03AB25 | flumazenil | parent. | 0.50 | MG | 754.48 | K |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

| | |
|-----|---|
| 269 | antidota používaná při otravě organofosfáty |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|--|
| 269.1 | A03BA01 | atropin (1 mg a více v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 7.83 | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 269.2 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 15.15 | |
|-------|---------|-----------------------------|---------|------|----|-------|--|

00392 ATROPIN BIOTIKA 0.5MG inj 10x1ml/0.5mg HBS SK

| | |
|-----|--|
| 270 | antidota používaná při otravě některými těžkými kovy |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 270.1 | V03AC01 | deferoxamin | parent. | 1.00 | GM | 386.74 | K |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

01445 DESFERAL

inj plv sol10x500mg

NPA CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 270.2 | V03AC02 | deferipron | p.o. | 5.25 | GM | 473.76 | K |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

271 antidota používaná při otravě kyanidy

272 antidota používaná při léčbě cytostatiky perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|------|------|----|--------|-----------|
| 272.1 | V03AF01 | mesna | p.o. | 1.20 | GM | 290.85 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------|------|------|----|--------|-----------|

05883 UROMITEXAN TABLETS 400MG tbl obd 10x400mg HOD D

45307 UROMITEXAN TABLETS 400 MG por tbl flm10x400mg TEM D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|
| 272.2 | V03AF03 | kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 60.00 | MG | 111.91 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|
| 272.3 | V03AF03 | kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 60.00 | MG | 115.42 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|

273 antidota používaná při léčbě cytostatiky ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|
| 273.1 | V03AF01 | mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.20 | GM | 29.72 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 273.2 | V03AF01 | mesna (nad 200 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.40 | GM | 48.39 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-----------|
| 273.3 | V03AF02 | dexrazoxan | parent. | 0.50 | GM | 4 329.50 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|-----------|
| 273.4 | V03AF03 | kalcium folinát | parent. | 60.00 | MG | 234.23 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|-----------|

11184 LEUCOVORIN-TEVA inj 1x5ml/50mg PHM NL

11185 LEUCOVORIN-TEVA inj 1x10ml/100mg PHM NL

11188 LEUCOVORIN-TEVA inj 1x30ml/300mg PHM NL

12441 LEUCOVORIN CA LACHEMA 20 inj sol 10x2ml/20mg PVL CZ

12442 LEUCOVORIN CA LACHEMA 50 inj sol 5x5ml/50mg PVL CZ

58033 CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG inj sol1x10ml/100mg EBP A

91561 LEUCOVORIN CA LACHEMA 25 inj plv sol 10x25mg PVL CZ

96966 CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG inj sol 5x3ml/30mg EBP A

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|
| 273.5 | V03AF05 | amifostin | parent. | 1.70 | GM | 19 500.00 | X |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|------------|
| 273.6 | V03AF06 | natrium folinát | parent. | 60.00 | GM | 234.23 | B/ONK, HEM |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|
| 273.7 | V03AF07 | rasburikaza | parent. | 1.00 | DF | 2 500.00 | H |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|

274 testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|-------|
| 274.1 | V04CD01 | metyrapon | p.o. | 3.00 | GM | 386.77 | K/END |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|-------|

01359 METOPIRONE cps 50x250mg NPA CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 274.2 | V04CJ02 | protirelin | parent. | 0.20 | MG | 215.75 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|------|----|--------|---|
| 274.3 | V04CH01 | inulin | parent. | 5.00 | GM | 489.33 | O |
|-------|---------|--------|---------|------|----|--------|---|

275 tuberkulinový test

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 275.1 | V04CF01 | tuberkulin | parent. | 0.60 | RG | 277.44 | H |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 68918 | TUBERCULIN PPD RT 23 SSI | inj 10x1.5ml/0.6rg | SST | DK |
| 68919 | TUBERCULIN PPD RT 23 SSI | inj 1x5ml/2rg | SST | DK |
| 68920 | TUBERCULIN PPD RT 23 SSI | inj 10x5ml/2rg | SST | DK |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 276 | testy pro alergické choroby |
|-----|-----------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|
| 276.1 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička) | intrader. | 1.00 | BA | 134.61 | O/ALG |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------|-----|----|
| 47427 | D-AL POLLENS | inj sol 1x5ml-jsk | SVF | CZ |
| 47428 | D-AL POLLENS | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 47429 | D-AL POLLENS | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 47430 | D-AL INSECTS | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 47431 | D-AL FOODS | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 47432 | D-AL DUSTS | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 47433 | D-AL(MIT,MYCO,DMX,BACTO) | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 47434 | D-AL DUSTS | inj sol 1x5ml-pnu | SVF | CZ |
| 54551 | D-AL POLLENS | inj sol 1x5ml-jsk | SVF | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|
| 276.2 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička) | PRICK test | 1.00 | BA | 522.52 | O/ALG |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|
| 276.3 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola) | PRICK test | 1.00 | BA | 363.86 | O/ALG |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|
| 276.4 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava) | intrader. | 1.00 | BA | 495.05 | O/ALG |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|

| | |
|-----|--|
| 277 | ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům perorální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|--------|----|-------|---|
| 277.1 | V03AE02 | sevelamer do 403 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 400.00 | MG | 20.70 | P |
|-------|---------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|--------|----|-------|---|
| 277.2 | V03AE02 | sevelamer nad 403 mg v jedné tabletě | p.o. | 400.00 | MG | 18.60 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|--------|----|-------|---|

Léčbu sevelamerem indikuje nefrolog se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou komplikací renální osteopatie na pracovištích, kde jsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody a vazba na chirurgické pracoviště provádějící parathyreoidektomie, a to pouze pacientům, kteří splňují alespoň jedno z následujících kriterií:

- a) hyperfosfatemie vyšší než 2,5mmol/l a hyperkalcémie (Ca více než 2,7mmol/l) při terapii kalcium karbonátem a to i přes použití dialyzačního roztoku s obsahem kalcia 1,25 mmol/l,
- b) nekontrolovatelná hyperfosfatemie (více než 3,2 mmol/l); či opakováně zjištovaná hodnota více než 2,5 mmol/l při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčba - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a spolupráci pacienta,
- c) parathyreoidektomie - k překlenutí období od indikace do operačního výkonu,
- d) tzv. fosfokalciový produkt více než 6,0 mmol/l exp.2 při splnění podmínek uvedených výše,
- e) prokázaná extraoseální kalcifikace (periartikulární, v jiných lokalizacích).

Kontroly účinnosti podávání sevelameru jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatemie vyšší než 2,5mmol/l.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|
| 277.3 | V04CX | jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2) | p.o. | 1.00 | DF | 20.91 | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------|----------------|-----|---|
| 46684 | CO2 GRANULAT GUERBET | gra 10 (sÁČky) | GMG | F |
|-------|----------------------|----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|----|----------|---|
| 277.4 | V04CX | urea | p.o. | 1.00 | DF | 1 270.85 | H |
|-------|-------|------|------|------|----|----------|---|

| | |
|-----|--|
| 278 | ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům ostatní cesty aplikace |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|------|----|----------|---|
| 278.1 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | 1.00 | ML | 2 866.09 | X |
|-------|-------|-----------------|------|------|----|----------|---|

| | | | | |
|-------|--------------|---------------------|-----|---|
| 90502 | TISSUCOL KIT | glu 0.5ml(3x+2xsol) | BXG | A |
| 90503 | TISSUCOL KIT | glu 1ml(3x+2xsolv.) | BXG | A |
| 90504 | TISSUCOL KIT | glu 2ml(3x+2xsolv.) | BXG | A |
| 90505 | TISSUCOL KIT | glu 5ml(3x+2xsolv.) | BXG | A |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|-----------|-------|----|--------|------|
| 278.2 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | 1.00 | C2 | 177.24 | X |
| 278.3 | V03AX | antistafylokokový fág. lyzát | lok. | 20.00 | ML | 321.60 | |
| 278.4 | V04CE01 | galaktóza | parent. | 1.00 | DF | 903.92 | O |
| 278.5 | V04CG03 | histamin | parent. | 10.00 | MG | 10.07 | O |
| 278.6 | V04CG30 | kofein a benzoát sodný | parent. | 0.10 | GM | 5.47 | O |
| 278.7 | V04CK01 | sekretin | parent. | 29.00 | RG | 919.90 | O |
| 278.8 | V04CM01 | gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.10 | MG | 225.63 | O |
| 278.9 | V04CM01 | gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli) | parent. | 0.10 | MG | 680.30 | O |
| 278.10 | V04CX | jiná diagnostika (diagnostika buněčně imunity) | intrader. | 1.00 | ML | 114.51 | O |
| 278.11 | V04CX | jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace) | parent. | 1.00 | ML | 34.56 | O |
| 278.12 | V04CX | jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace) | parent. | 1.00 | ML | 126.50 | O |
| 278.13 | V04CX | jiná diagnostika (sulfanum ceruleum) | subkut. | 50.00 | MG | 251.00 | O |
| 279 | | výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny | | | | | |
| 279.1 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát) | p.o. | 1.00 | GM | 5.14 | L/J4 |
| 279.2 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 11.45 | L/J4 |
| 279.3 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 12 měsíců) | p.o. | 1.00 | GM | 20.86 | L/J4 |
| 279.4 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné) | p.o. | 1.00 | GM | 12.17 | L/J4 |
| 279.5 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát) | p.o. | 1.00 | GM | 5.33 | L/J4 |
| 279.6 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin (práškové formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.16 | L/J4 |
| 279.7 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin pro děti mladší 12 měsíců (práškové formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 20.86 | P |

Přípravky, které jsou předepisovány na specializovaném pracovišti pro léčbu dědičných poruch metabolismu, jsou u nestabilních pacientů hrazeny do 18 měsíců věku.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|------|----|-------|------|
| 279.8 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.17 | L/J4 |
| 279.9 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin (dávkované formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.16 | L/J4 |
| 279.10 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - cyklus močoviny (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.11 | L/J4 |
| 279.11 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - cyklus močoviny (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 15.89 | L/J4 |
| 279.12 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - aminokyseliny s rozvětvenými řetězci (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.38 | L/J4 |
| 279.13 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - aminokyseliny s rozvětvenými řetězci (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.96 | L/J4 |
| 279.14 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - metylmalonová a propionová acidémie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.38 | L/J4 |
| 279.15 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - metylmalonová a propionová acidémie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.96 | L/J4 |
| 279.16 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - leucin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.99 | L/J4 |
| 279.17 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - leucin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.82 | L/J4 |
| 279.18 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - glutarová acidémie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.90 | L/J4 |
| 279.19 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - glutarová acidémie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 15.93 | L/J4 |
| 279.20 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - homocystinurie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.38 | L/J4 |
| 279.21 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - homocystinurie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.96 | L/J4 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|------|
| 279.22 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - lysin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.12 | L/J4 |
| 279.23 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - lysin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.82 | L/J4 |
| 279.24 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - tyrosin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.73 | L/J4 |
| 279.25 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - tyrosin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.38 | L/J4 |

33188 MILUPA TYR 2 por plv sol 1x500gm MLP D

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|------|
| 279.26 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - neketotická hyperglycinémie, na obsah aminokyselin | p.o. | 1.00 | GM | 40.59 | L/J4 |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|------|

280 kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|---------|--------|----|--------|------|
| 280.1 | A11JA | kombinace vitamínů | parent. | 10.00 | ML | 116.07 | H |
| 280.2 | V06DA | sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 80.00 | GM | 87.40 | Z |
| 280.3 | V06DA | sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 500.00 | ML | 74.25 | Z |
| 280.4 | V06DB | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
| 280.5 | V06DB | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
| 280.6 | V06DC | kombinace sacharidů | p.o. | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
| 280.7 | V06DX | kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia | p.o. | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
| 280.8 | V06DX | MCT olej | p.o. | 100.00 | ML | 204.52 | L/J4 |
| 280.9 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa bez tuku, zvláštní použití (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 109.25 | Z |
| 280.10 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa bez tuku, zvláštní použití (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 74.25 | Z |
| 280.11 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, standartní (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
| 280.12 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, standartní (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
| 280.13 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, zvláštní použití (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|--|--------|----|---------|------|
| 280.14 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, p.o. zvláštní použití (tekuté formy) | | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
| 280.15 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, p.o. (ketogenní dieta) | | 100.00 | GM | 393.33 | Z |
| 280.16 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, standartní p.o. (práškové formy) | | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
| 280.17 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, standartní p.o. (tekuté formy) | | 500.00 | ML | 153.75 | Z |
| 280.18 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, zvláštní p.o. použití (práškové formy) | | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
| 280.19 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, zvláštní p.o. použití (tekuté formy) | | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
| 280.20 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace sacharidů (práškové formy) | | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
| 280.21 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace sacharidů (tekuté formy) | | 500.00 | ML | 79.38 | H |
| 280.22 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace hydrofilních polysacharidů (práškové formy) | | 100.00 | GM | 73.56 | Z |
| 280.23 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny (práškové formy) | | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
| 280.24 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - MCT olej | | 100.00 | ML | 191.19 | L/J4 |
| 280.25 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - GTO olej | | 100.00 | ML | 204.52 | L/J4 |
| 280.26 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - LORENZO olej | | 100.00 | ML | 1024.51 | L/J4 |

33172 MILUPA BASIC-F

por plv sol 1x600gm

MLP D

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|--|--------|----|--------|------|
| 280.27 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu sacharidů | | 100.00 | GM | 426.49 | L/J4 |
| 280.28 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu tuků | | 100.00 | GM | 112.02 | L/J4 |
| 280.29 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu bílkovin | | 100.00 | GM | 199.94 | L/J4 |
| 280.30 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné p.o. poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu cholesterolu | | 100.00 | GM | 555.55 | L/J4 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--------|----|--------|------|--|
| 281 | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy | | | | | | | |
| 281.1 | V06DD | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy | p.o. | 5.00 | DF | 90.13 | L/J7 | |
| 88115 | KETOSTERIL | tbl obd 100 | FRE | D | | | | |
| 88116 | KETOSTERIL | tbl obd 300=3x100 | FRE | D | | | | |
| 88117 | KETOSTERIL | tbl obd 1500=15x100 | FRE | D | | | | |
| 281.2 | V06XX | arginin | p.o. | 1.00 | GM | 12.60 | L/J4 | |
| 281.3 | V06XX | citrulin | p.o. | 1.00 | GM | 57.40 | L/J4 | |
| 281.4 | V06XX | cystin | p.o. | 1.00 | GM | 35.33 | L/J4 | |
| 281.5 | V06XX | glutamin | p.o. | 1.00 | GM | 18.00 | L/J4 | |
| 281.6 | V06XX | isoleucin | p.o. | 1.00 | GM | 60.60 | L/J4 | |
| 281.7 | V06XX | karnitin | p.o. | 1.00 | GM | 183.14 | L/J4 | |
| 281.8 | V06XX | valin | p.o. | 1.00 | GM | 35.08 | L/J4 | |
| 282 | náhrady mléka | | | | | | | |
| 282.1 | V06DF | náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu | p.o. | 100.00 | GM | 10.25 | L/J4 | |
| 282.2 | V06 | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamin y (jednotlivé aminokyseliny) | p.o. | 100.00 | GM | 345.00 | P | |
| 282.3 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamin y (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy) | p.o. | 100.00 | GM | 2.25 | P | |
| Terapie intolerance laktózy, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost. | | | | | | | | |
| 282.4 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamin y (mléčné bílkoviny kravského mléka) | p.o. | 100.00 | GM | 26.50 | P | |
| Přípravky ordinuje dětský lékař a neonatolog, dále předepisuje praktický lékař pro děti a dorost jako kompletní výživu kojenců nedonošených a kojenců s nízkou porodní hmotností od narození do dosažení hmotnosti 3500 g. | | | | | | | | |
| 282.5 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamin y (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy) | p.o. | 100.00 | GM | 24.45 | P | |

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, malabsorpce, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 282.6 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/ vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzaty) | p.o. | 100.00 | GM | 21.66 | P |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 282.7 | V06XX | náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka | p.o. | 100.00 | GM | 26.50 | P |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

Přípravky ordinuje dětský lékař a neonatolog, dále předepisuje praktický lékař pro děti a dorost jako kompletní výživu kojenců nedonošených a kojenců s nízkou porodní hmotností od narození do dosažení hmotnosti 3500 g.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 282.8 | V06XX | náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem | p.o. | 100.00 | GM | 21.66 | P |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, malabsorpce, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|------|---|
| 282.9 | V06XX | náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a bílkoviny kravského mléka | p.o. | 100.00 | GM | 2.25 | P |
|-------|-------|---|------|--------|----|------|---|

Terapie intolerance laktózy, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 282.10 | V06XX | náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem | p.o. | 100.00 | GM | 24.45 | P |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, malabsorpce, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----|--------|---|
| 282.11 | V06XX | speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin | p.o. | 100.00 | GM | 345.00 | P |
|--------|-------|---|------|--------|----|--------|---|

Náhrady mléka, speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin. Přípravky jsou ordinovány v případě neúspěchu terapie přípravky obsahujícími extenzivní hydrolyzáty bílkovin v následujících indikacích:

- a) těžké potravinové alergie, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anaflaktického charakteru),
- b) potravinové alergie s projevy poškození střevní sliznice),
- c) multiproteinové alergie,
- d) syndrom krátkého střeva,
- e) malabsorbce při přechodu z parentérální na enterální výživu.

Ve výše uvedených případech předepisuje dětem nejvýše do 3 let věku lékař se specializací v oboru dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo alergologie a klinická imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|------|
| 282.12 | V06XX | speciální kojenecká výživa s hydrolyzátem sojové bílkoviny a vepřového kolagenu | p.o. | 100.00 | GM | 140.00 | L/J4 |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|------|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----|-------|------|
| 282.13 | V06XX | náhrady mléka s obsahem sojové bílkoviny | p.o. | 100.00 | GM | 10.25 | L/J4 |
|--------|-------|---|------|--------|----|-------|------|

283 | Rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny várií

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|------|--|
| 283.1 | V07AB | voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | ML | 2.69 | |
|-------|-------|---|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|-------|----|------|--|
| 283.2 | V07AB | voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 3.32 | |
|-------|-------|--|---------|-------|----|------|--|

00387 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10ml-amp.pl. BTA SK

00388 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 50x10ml-amp.pl. BTA SK

55807 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj100x10ml-amp.pl. BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|--------|----|-------|--|
| 283.3 | V07AB | voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi | parent. | 100.00 | ML | 13.98 | |
|-------|-------|---|---------|--------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|-------|----|-------|---|
| 284 | vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky | | | | | | |
| 284.1 | V08AA01 | kyselina diatrizoová | parent. | 10.00 | ML | 45.00 | K |
| 284.2 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 300 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 41.06 | K |
| 284.3 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 380 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 44.97 | K |
| 284.4 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 410 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 87.40 | K |
| 284.5 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová | p.o. | 10.00 | ML | 59.19 | K |
| 284.6 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 54.73 | K |
| 284.7 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více) | parent. | 10.00 | ML | 66.00 | K |

32937 TELEBRIX 35 inj sol 1x200ml GUT F
 92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285 | vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látky | | | | | | |
| 285.1 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 184.90 | K |
| 285.2 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 220.90 | K |
| 285.3 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K |
| 285.4 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 122.70 | K |
| 285.5 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 256.70 | K |
| 285.6 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.50 | K |
| 285.7 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
| 285.8 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 207.20 | K |
| 285.9 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K |
| 285.10 | V08AB03 | kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 200.58 | K |
| 285.11 | V08AB03 | kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 186.90 | K |
| 285.12 | V08AB04 | iopamidol | p.o. | 10.00 | ML | 59.19 | K |
| 285.13 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 242.54 | K |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|-----|
| 285.14 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 299.78 | K |
| 285.15 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.92 | K |
| 285.16 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 169.67 | K |
| 285.17 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 365.98 | K |
| 285.18 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 224.93 | K |
| 285.19 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 181.10 | K |
| 285.20 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 122.70 | K |
| 285.21 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.40 | K |
| 285.22 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.60 | K |
| 285.23 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 165.80 | K |
| 285.24 | V08AB06 | iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 429.71 | K/P |
| 285.25 | V08AB06 | iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 534.28 | K/P |

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,
- b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 285.26 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 95.60 | K |
| 285.27 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 122.70 | K |
| 285.28 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 256.70 | K |
| 285.29 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.40 | K |
| 285.30 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
| 285.31 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 149.50 | K |
| 285.32 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 207.20 | K |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.33 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.42 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.34 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 193.90 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.35 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 302.90 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.36 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 253.90 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 285.37 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 321.70 | K |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|

59544 HEXABRIX 320 inj sol 1x50ml GUT F

59545 HEXABRIX 320 inj sol 25x50ml GUT F

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.38 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 258.50 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 285.39 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 92.70 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.40 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 109.70 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.41 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 126.00 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.42 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.50 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.43 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.44 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 207.20 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.45 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.46 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 228.70 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.47 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 175.90 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.48 | V08AB11 | lobitridol (koncentrace 300 mg nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.49 | V08AB11 | lobitridol (koncentrace 350 mg nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 286 | vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|-------|----|-------|---|
| 286.1 | V08AC | kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 74.25 | K |
|-------|-------|---|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 286.2 | V08AC | kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 37.39 | K |
|-------|-------|--|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 286.3 | V08AC04 | adipiodon | parent. | 10.00 | ML | 39.35 | K |
| 286.4 | V08AD | iopydol + iopyron | parent. | 10.00 | ML | 300.70 | K |
| 286.5 | V08AD01 | ethylestery jodovaných mastných kyselin | parent. | 10.00 | ML | 476.14 | K |

59494 LIPIODOL ULTRA-FLUIDE inj sol 1x10ml GUT F

| | |
|-----|---|
| 287 | RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 287.1 | V08BA01 | RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon) | p.rect. | 100.00 | GM | 45.00 | K |
| 287.2 | V08BA01 | síran barnatý | p.o. | 100.00 | GM | 32.15 | K |
| 287.3 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy HD) | p.o. | 100.00 | GM | 36.73 | K |
| 287.4 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy pasty) | p.o. | 100.00 | GM | 94.58 | K |
| 287.5 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy pro CT) | p.o. | 7.50 | GM | 147.52 | K |

62399 E-Z-CAT sus 1x225ml EZE USA
 78269 E-Z-CAT sus 1x225ml EZE CND

| | |
|-----|--|
| 288 | paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|----------|---|
| 288.1 | V08CA01 | dimeglumin gadopentetat | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.2 | V08CA02 | meglumin gadoterat | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.3 | V08CA03 | gadodiamid | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.4 | V08CA04 | gadoteridol | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.5 | V08CA05 | mangafodipir | parent. | 10.00 | ML | 916.70 | K |
| 288.6 | V08CA08 | dimeglumin gadobenat | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.7 | V08CA09 | gadobutrol | parent. | 10.00 | ML | 2 518.00 | K |
| 288.8 | V08CB03 | oxid železa, nanočástice, s obsahem dopadu 0,9 ml včetně | parent. | 1.00 | DF | 5 945.93 | H |

02251 RESOVIST inj sol 1x0.9ml-stř SAG D

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|---|
| 288.9 | V08CB03 | oxid železa, nanočástice, s obsahem nad 0,9 ml | parent. | 1.00 | DF | 6 700.00 | H |
| 288.10 | V08DA01 | mikročástice albuminu s oktafluoropanem | parent. | 1.00 | DF | 2 857.50 | H |
| 288.11 | V08DA02 | mikročástice galaktózy | parent. | 1.00 | GM | 914.00 | H |
| 288.12 | V08CA | dinatrii gadoxetas | parent. | 1.00 | ML | 560.00 | K |

| | |
|-----|--|
| 289 | Individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku |
|-----|--|

Úhrada za jednotku individuálně připravovaného radiofarmaka.

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|
| 289.1 | V09 | individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku | parent. | 1 | MBq | plně | K/NM |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|

V09 Technecistan sodný inj. (^{99m}Tc)**290 Individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii**

Úhrada za jednotku individuálně připravovaného radiofarmaka.

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|
| 290.1 | V10 | individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii | parent. | 1 | MBq | plně | K/NM |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|

V10 Jodid sodný inj. (¹³¹I)

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|-----|------|-----|
| 290.2 | V10 | Ibritumomab tiuxetan ⁹⁰ Y inj. | parent. | 1 | MBq | plně | K/P |
|-------|-----|---|---------|---|-----|------|-----|

Individuálně připravované radiofarmakum pro terapii Ibritumomab tiuxetan ⁹⁰Y inj. indikuje hematolog - hematoonkolog u pacientů s fungující krvetvorbou, k léčbě CD20 pozitivního folikulárního B non Hodgkinského lymfomu v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých pacientů.

291 Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik)

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|
| 291.1 | V20 | kyselina salicylová v lékových formách mastí, krémů | lok. | | | | plně |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|

292 Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|
| 292.1 | V20 | karbethopendecinum bromid, lékové formy očních kapek nebo očních vod | lok. | | | | plně |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|
| 292.2 | V20 | karbethopendecinum bromid, lékové formy očních mastí | lok. | | | | plně |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|

293 Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik - anodyn (opioidů)

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|
| 293.1 | V20 | morfín | rect. | | | | plně |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|------|--|--|--|------|
| 293.2 | V20 | morfín | p.o. | | | | plně |
|-------|-----|--------|------|--|--|--|------|

294 Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|
| 294.1 | V20 | natrium tetraboricum v lékové formě vaginálních globulí | vag. | | | | plně |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|

295 Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávicího ústrojí

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|
| 295.1 | V20 | pepsin | p.o.. | | | | plně |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|

296 Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|------|--|--|--|------|
| 296.1 | V20 | argenti diacetylannas albuminatum | lok. | | | | plně |
|-------|-----|-----------------------------------|------|--|--|--|------|

Z prostředků veřejného zdravotního pojistění se plně hradí individuálně připravované léčivé přípravky s výjimkou následujících individuálně připravovaných léčivých přípravků, které jsou hrazeny ve výši 20 % jejich ceny pro konečného spotřebitele:

- a) analgetické a antipyretické směsy, včetně směsi s kodeinem a etylmorphinem,
- b) čaje,
- c) vitamíny v perorálních lékových formách,
- d) kloktadla,
- e) expektorancia a antitusika,
- f) antihemoroidalia,
- g) hypnotika, sedativa,
- h) individuálně připravované léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce,
- i) lokální antiflogistika a derivancia,
- j) individuálně připravované léčivé přípravky, jejichž jedinou součástí jsou nehrazené hromadně vyráběné léčivé přípravky.

Je-li součástí individuálně připravovaného léčivého přípravku hromadně vyráběný léčivý přípravek, hradí se tato součást individuálně připravovaného léčivého přípravku podle úhrady stanovené touto vyhláškou v příslušné skupině léčivých látek.

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 297 | erytrocytární přípravky | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|----|----------|-----|--|--|--|
| 297.1 | V22 | Erytrocyty bez „buffy coatu“ parent v resuspenzním roztoku | 1 | TU | 1.758,00 | B/P | | | |
|-------|-----|---|---|----|----------|-----|--|--|--|

Léčivé přípravky s obsahem erytrocytů bez „buffy coatu“ v resuspenzním roztoku jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---|----|----------|-----|--|--|--|
| 297.2 | V22 | Erytrocyty bez „buffy coatu“ parent v resuspenzním roztoku zpracované promytím | 1 | TU | 2.344,00 | B/P | | | |
|-------|-----|--|---|----|----------|-----|--|--|--|

Léčivé přípravky s obsahem erytrocytů bez „buffy coatu“ v resuspenzním roztoku zpracované promytím jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány u pacientů s:

- a) paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH),
- b) deficitem IgA,
- c) přecitlivělostí na plazmatické bílkoviny.

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---|----|----------|-----|--|--|--|
| 297.3 | V22 | Erytrocyty bez „buffy coatu“ parent v resuspenzním roztoku zpracované ozářením | 1 | TU | 1.898,00 | B/P | | | |
|-------|-----|--|---|----|----------|-----|--|--|--|

Léčivé přípravky s obsahem erytrocytů bez „buffy coatu“ v resuspenzním roztoku zpracované ozářením jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD) u pacientů:

- a) imunosuprimovaných, včetně pacientů před a po transplantaci,
- b) u novorozenců a nedonošených dětí.

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|----|----------|-----|--|--|--|
| 297.4 | V22 | Erytrocyty bez „buffy coatu“ parent v resuspenzním roztoku zpracované promytím a ozářením | 1 | TU | 2.484,00 | B/P | | | |
|-------|-----|---|---|----|----------|-----|--|--|--|

Léčivé přípravky s obsahem erytrocytů bez „buffy coatu“ v resuspenzním roztoku zpracované promytím a ozářením jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD) u pacientů:

- a) imunosuprimovaných, večně pacientů před a po transplantaci,
- b) u novorozenců a nedonošených dětí,
- a zároveň postižených:
 1. paroxysmální noční hemoglobinurii (PNH), nebo
 2. deficitem IgA, nebo
 3. přecitlivělostí na plazmatické bílkoviny.

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|---------|---|----|----------|-----|--|--|
| 297.5 | V22 | erytrocyty deleukotizované | parent. | 1 | TU | 2.577,00 | B/P | | |
|-------|-----|----------------------------|---------|---|----|----------|-----|--|--|

Léčivé přípravky s obsahem deleukotizovaných erytrocytů jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány u pacientů s:

- a) nehemolytickou potransfuzní reakcí:
 1. s opakoványmi febrilními nehemolytickými reakcemi, anebo
 2. při průkazu cytotoxických HLA protilátek.
- b) rizikem alloimunizace:
 1. při chronických substitucích transfuzními přípravky,
 2. před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)
- c) rizikem infekcí (CMV u CMV seronegativních příjemců):
 1. před a po orgánových transplantacích,
 2. u imunosuprimovaných pacientů,
 3. u nedonošených dětí a novorozenců,
 4. při intrauterinních transfuzích,
 5. u těhotných žen,
 6. u dětí po operacích srdce a velkých cév.

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|----|----------|-----|--|--|
| 297.6 | V22 | erytrocyty deleukotizované zpracované promytím | parent. | 1 | TU | 3.163,00 | B/P | | |
|-------|-----|---|---------|---|----|----------|-----|--|--|

Léčivé přípravky s obsahem deleukotizovaných erytrocytů jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány u pacientů s:

- a) nehemolytickou potransfuzní reakcí:
 1. s opakoványmi febrilními nehemolytickými reakcemi, anebo
 2. při průkazu cytotoxických HLA protilátek.
- b) rizikem alloimunizace:
 - 1.při chronických substitucích transfuzními přípravky,
 - 2.před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)

c) rizikem infekcí (CMV u CMV seronegativních příjemců):

- 1.před a po orgánových transplantacích,
 - 2.u imunosuprimovaných pacientů,
 - 3.u nedonošených dětí a novorozenců,
 - 4.při intrauteriných transfuzích,
 - 5.u těhotných žen,
 - 6.u dětí po operacích srdce a velkých cév,
pokud jsou zároveň postiženi:
- i.) paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH), nebo
 - ii.) deficitem IgA, nebo
 - iii.) přecitlivělostí na plazmatické bílkoviny.

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|
| 297.7 | V22 | erytrocyty deleukotizované zpracované ozářením | parent. | 1 | TU | 2.717,00 | B/P |
|-------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|

Léčivé přípravky s obsahem deleukotizovaných erytrocytů jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány u pacientů s:

a) nehemolytickou postransfuzní reakcí:

1. s opakovánými febrilními nehemolytickými reakcemi, anebo
2. při průkazu cytotoxických HLA protilátek.

b) rizikem alloimunizace:

- 1.při chronických substitucích transfuzními přípravky,
- 2.před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)

c) rizikem infekci (CMV u CMV seronegativních příjemců):

1. před a po orgánových transplantacích,
 2. u imunosuprimovaných pacientů,
 3. u nedonošených dětí a novorozenců,
 4. při intrauteriných transfuzích,
 5. u těhotných žen,
 6. u dětí po operacích srdce a velkých cév,
a pouze pokud jsou indikovány z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD)
u pacientů:
- i.) imunosuprimovaných, včetně pacientů před a po transplantaci,
 - ii.) u novorozenců a nedonošených dětí.

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|----|----------|-----|
| 297.7 | V22 | erytrocyty deleukotizované zpracované promytím a ozářením | parent. | 1 | TU | 3.303,00 | B/P |
|-------|-----|---|---------|---|----|----------|-----|

Léčivé přípravky s obsahem deleukotizovaných erytrocytů jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče a jsou indikovány u pacientů s:

a) nehemolytickou postransfuzní reakcí:

- 1.s opakovánými febrilními nehemolytickými reakcemi, anebo
- 2.při průkazu cytotoxických HLA protilátek.

b) rizikem alloimunizace:

- 1.při chronických substitucích transfuzními přípravky,
- 2.před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)

c) rizikem infekci (CMV u CMV seronegativních příjemců):

1. před a po orgánových transplantacích,
 - 2.u imunosuprimovaných pacientů,
 - 3.u nedonošených dětí a novorozenců,
 - 4.při intrauteriných transfuzích,
 - 5.u těhotných žen,
 - 6.u dětí po operacích srdce a velkých cév,
a pouze pokud jsou indikovány z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD)
u pacientů:
- i.) imunosuprimovaných, včetně pacientů před a po transplantaci,
 - ii.) u novorozenců a nedonošených dětí,
pokud jsou tyto zároveň postiženy:
- 1a. paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH), nebo
 - 1b. deficitem IgA, nebo
 - 1c. přecitlivělostí na plazmatické bílkoviny.

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|----|--------|-----|
| 297.3 | V22 | erytrocyty pro autotransfuzi včetně plazmy | parent. | 1 | ks | 754,00 | B/P |
|-------|-----|--|---------|---|----|--------|-----|

Léčivé přípravky s obsahem erytrocytů pro autotransfuzi včetně plazmy jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

| | |
|-----|-------------------------|
| 298 | trombocytární přípravky |
|-----|-------------------------|

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|----|-----------|-----|---|
| 298.1 | V22 | trombocyty minim. 300×10^9 PLT | parent. | 1 | ks | 12.437,00 | B/P | * |
|-------|-----|---|---------|---|----|-----------|-----|---|

Léčivé přípravky s obsahem trombocytů (minim. 300×10^9 PL) jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|----|-----------|-----|----|
| 298.2 | V22 | trombocyty minim. 300×10^9 PLT deleukotizované | Parent. | 1 | Ks | 13.585,00 | B/P | *) |
|-------|-----|--|---------|---|----|-----------|-----|----|

Léčivé přípravky s obsahem trombocytů (minim. 300×10^9 PL, deleukotizované) jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

Deleukotizované trombocyty jsou indikovány v případě:

- 1) Výskytu nehemolytických potransfuzních reakcí
 - a) u pacientů s opakoványmi febrilními nehemolytickými reakcemi po transfuzi,
 - b) při průkazu cytotoxických HLA protilátek.
- 2) Rizika alloimunizace:
 - b) u pacientů chronicky substituovaných transfuzními přípravky,
 - c) před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)
- 3) Rizika infekcí, především CMV u CMV seronegativních příjemců:
 - a) před a po orgánových transplantacích,
 - b) u ostatních imunosuprimovaných pacientů,
 - d) u nedonošených dětí a novorozenců,
 - e) u intrauterinních transfuzí,
 - f) u těhotných žen,
 - g) u dětí po operacích srdce a velkých cév.

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|----|----------|---|----|
| 298.3 | V22 | trombocyty pro autotransfuzi separátorový odběr | Parent. | 1 | Ks | 5.233,00 | Z | *) |
|-------|-----|--|---------|---|----|----------|---|----|

*)

K trombocytárním přípravkům lze účtovat v rámci individuálního zpracování dohodnuté náklady ve výši 586,- Kč za promytí u:

- a) feto-maternální aloimmunní trombocytopenie (FMAIT),
- b) deficitu IgA,
- c) přecitlivělosti na plazmatické bílkoviny.

K trombocytárním přípravkům lze účtovat v rámci individuálního zpracování dohodnuté náklady ve výši 140,- Kč za ozáření přípravku z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):

- a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,
- b) u novorozenců a nedonošených dětí.

K trombocytárním přípravkům lze účtovat v rámci individuálního zpracování dohodnuté náklady ve výši 634,- Kč za HLA typizaci z důvodů:

- a) prevence HLA imunizace u nemocných zařazených do transplantačního programu nebo odkázaných na dlouhodobou substituční léčbu trombocyty,
- b) vyhledávání přípravků pro nemocné refrakterní na náhodně vybírané trombocyty.

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 299 | přípravky z plazmy | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------|---------|---|----|--------|-----|----|
| 299.1 | V22 | plazma pro klinické použití | Parent. | 1 | TU | 830,00 | B/P | *) |
|-------|-----|-----------------------------|---------|---|----|--------|-----|----|

Léčivé přípravky s obsahem plazmy pro klinické použití jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

Podání plazmy v doporučené úvodní dávce je 10 až 20 ml/kg tělesné hmotnosti příjemce (jedna transfuzní jednotka 1T.U. odpovídá $220 \text{ ml} \pm 40 \text{ ml}$ plazmy) je indikováno v případě:

- 1) krvácení nebo kombinovaná koagulační porucha potvrzena screeningovými laboratorními testy při:
 - a) diseminované intravaskulární koagulaci (DIC), pokud je kontraindikováno podání koncentrátu izolovaných koagulačních faktorů,
 - b) získaném nedostatku koagulačních faktorů z poruch jejich tvorby (např. při hepatopatií), pokud není indikováno podání koncentrátu izolovaných koagulačních faktorů,
 - c) těžkém, život ohrožujícím krvácení při deficitu K vitamINU event. při působení antagonistů vitaminu K, pokud je kontraindikováno podání koncentrátu izolovaných koagulačních faktorů,
 - d) masivních transfuzích nebo při hrazení masivních krevních ztrát koloidními a krystaloidními roztoky jako náhrada koagulačních faktorů (na 3 – 4 transfuzní jednotky erytrocytů 1 jednotka plazmy, na 2000 ml náhradních roztoků 1 jednotka mražené plazmy),
 - e) nemoci z popálení na přechodu do 2. fáze,
- 2) krvácení nebo příprava na chirurgický výkon u nemocných s vrozeným deficitem koagulačních faktorů v případě, že není dostupná léčba koncentráty příslušného koagulačního faktoru,
- 3) mikroangiopatické trombocytopenie (trombotická trombocytopenická purpura, hemolytickouremický syndrom, HELP syndrom a další podobné stavby) a to přímo, nebo jako substituce při výměnné plazmaferéze,
- 4) hemolytické chorobě novorozence, a to pro resuspenzi erytrocytů v rámci výměnné transfuze.

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------------|---------|---|----|----------|---|----|
| 299.2 | V22 | kryoprotein (z 1 litru plazmy) | Parent. | 1 | ks | 3.320,00 | Z | *) |
|-------|-----|--------------------------------|---------|---|----|----------|---|----|

Léčivé přípravky s obsahem kryoproteinu (z 1 litru plazmy) jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

*)

K přípravkům z plazmy lze účtovat v rámci individuálního zpracování dohodnuté náklady ve výši 140,- Kč za ozáření přípravku z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):

- a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,
- b) u novorozenců a nedonošených dětí.

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|---------|---|----|-----------|-----|---|--|--|
| 300 | leukocytární přípravky | | | | | | | | | |
| 300.1 | V22 | leukocyty min. 5×10^9 /jedn. – pro separátový odběr | Parent. | 1 | Ks | 14.074,00 | B/P | * | | |

Léčivé přípravky s obsahem leukocytů (minim. 5×10^9 /jedn. – pro separátový odběr) jsou hrazeny pouze pokud jsou použity při poskytování zdravotní péče.

*)

K leukocytárním přípravkům lze účtovat v rámci individuálního zpracování dohodnuté náklady ve výši 140,- Kč za ozáření přípravku z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):

- a) u imunosuprimovaných pacientů a u příjemců před a po transplantaci,
- b) u novorozenců a nedonošených dětí.“.

2. V příloze č. 2 se u symbolu „P“ v bodu 3 slova „U“ nebo „B“ nahrazují slovy „U“, „O“ nebo „B“.

3. V příloze č. 2 se slova „DIA diabetologie“ nahrazují slovy „DIA diabetologie nebo vnitřní lékařství“.

4. V příloze č. 2 se slova „END endokrinologie“ nahrazují slovy „END endokrinologie nebo vnitřní lékařství“.

5. V příloze č. 2 se slova „GER geriatrie“ nahrazují slovy „GER geriatrie nebo vnitřní lékařství“.

6. V příloze č. 2 se slova „GIT gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie“ nahrazují slovy „GIT gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo vnitřní lékařství“.

7. V příloze č. 2 se slova „HEM hematologie a transfúzní lékařství“ nahrazují slovy „HEM hematologie a transfúzní lékařství nebo vnitřní lékařství“.

8. V příloze č. 2 se slova „KAR kardiologie, dětská kardiologie“ nahrazují slovy „KAR kardiologie, dětská kardiologie nebo vnitřní lékařství“.

9. V příloze č. 2 se slova „TRN tuberkulóza a respirační nemoci, dětská pneumologie“ nahrazují slovy „TRN tuberkulóza a respirační nemoci, dětská pneumologie nebo vnitřní lékařství“.

10. V příloze č. 2 se slova „URN urologie, dětská urologie“ nahrazují slovy „URN urologie, dětská urologie nebo vnitřní lékařství“.

11. V příloze č. 2 se za symbol „NEU neurologie, dětská neurologie“ vkládá nový symbol „NM nukleární medicína“.

12. V příloze č. 2 se za symbol „PSY psychiatrie,

dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie“ vkládá nový symbol „RAD radiační onkologie“.

13. V příloze č. 2 se za symbol „SEX sexuologie“ vkládá nový symbol „STO zubní lékařství“.

14. V příloze č. 2 se za symbol „J7 specializované pracoviště – dialyzační jednotka“ vkládá nový symbol „J9 poradna pro hyperlipoproteinemi a lékař se specializací v oboru vnitřního lékařství“.

Čl. II

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 109/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek.
2. Vyhláška č. 117/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhláška č. 199/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vyhláška č. 295/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 53/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky

- plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 144/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 421/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 184/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 435/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Vyhláška č. 271/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Vyhláška č. 509/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.
12. Vyhláška č. 191/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 – **Adminis-trace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíránych výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Brno, telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši označené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyučtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částelek (první záloha na rok 2005 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Brno, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, 516 205 207, 519 205 207, objednávky jednotlivých částelek (dobírky) – 516 205 174, 519 305 174, objednávky-knihkupeci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktaviana Kocián, Příkop 6, tel.: 545 175 080; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 432 244; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadiónu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podjštědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrďák, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisa č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** TYPOS, a. s. Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), SEVT a. s., Slezská 126/6; **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinova nám. 17; **Praha 7:** Donáška tisku, V Hájích 6; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9, Jana Honková – YAHO – i – centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel. +fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezdečkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíránych výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslech 516 205 207, 519 305 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.